

الاضطرابات العقلية والسلوكية في
التصنيف الدولي للأمراض - 11

د. أنور الحمادي

ICD-11

الاضطرابات العقلية والسلوكية في التصنيف الدولي
للأمراض – الطبعة الحادية عشر


ICD - 11

GGKEY:TWGTNZ32PHB

د. أنور الحمادي

2021





المحتويات

4.....	المحتويات
53.....	مقدمة
67.....	طريقة الاستعمال
68.....	الاضطرابات العقلية، السلوكية، أو اضطرابات النماء العصبية 06
69.....	اضطرابات النماء العصبية
70.....	اضطرابات النماء الذهني 6A00
70.....	اضطراب النماء الذهني، خفيف 6A00.0
71.....	اضطراب النماء الذهني، معتدل 6A00.1
71.....	اضطراب النماء الذهني، شديد 6A00.2
72.....	اضطراب النماء الذهني، عميق 6A00.3
73.....	اضطراب النماء الذهني، مرحلي 6A00.4
73.....	اضطرابات النماء الذهني، غير محددة 6A00.Z
74.....	اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية 6A01
74.....	اضطراب صوت الكلام النمائي 6A01.0
75.....	اضطراب طلاقة الكلام النمائي 6A01.1
76.....	اضطراب اللغة النمائي 6A01.2
76.....	اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة الاستقبالية والتعبيرية 6A01.20
78.....	اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة التعبيرية خصوصاً 6A01.21
79.....	اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة العملية خصوصاً 6A01.22

80	اضطراب اللغة النمائي مع ضعفٍ محدد في اللغة 6A01.23
81	اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية المحددة الأخرى 6A01.Y
81	اضطراب كلام أو لغة تطوري غير محدد 6A01.Z
82	اضطراب طيف التوحد 6A02
	اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة
83	الوظيفية 6A02.0
	اضطراب طيف التوحد مع اضطراب النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة الوظيفية
83	6A02.1
84	اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.2
84	اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.3
85	اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.4
85	اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.5
86	اضطراب طيف التوحد محدد آخر 6A02.Y
86	اضطراب طيف التوحد غير محدد 6A02.Z
87	اضطراب التعلم النمائي 6A03
87	اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في القراءة 6A03.0
88	اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في التعبير المكتوب 6A03.1
89	اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في الرياضيات 6A03.2
89	اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ محدد آخر في التعلم 6A03.3
90	اضطراب التعلم التطوري، غير محدد 6A03.Z
91	اضطراب التناسق الحركي النمائي 6A04
92	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة 6A05
93	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المهيمن نقص الانتباه 6A05.0
93	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المهيمن فرط الحركة - الاندفاعية 6A05.1
94	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المشترك 6A05.2
94	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، تظاهر محدد آخر 6A05.Y
94	اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، تظاهر غير محدد 6A05.Y

95	اضطراب الحركة النمطي 6A06
96	اضطراب الحركة النمطي دون أذية للذات 6A06.0
96	اضطراب الحركة النمطي مع أذية للذات 6A06.1
97	اضطراب الحركة النمطي، غير محدد 6A06.Z
98	اضطراب العرة أو عرات أولية 8A05.0
98	متلازمة توريت 8A05.00
99	اضطراب العرة الحركية المزمن 8A05.01
99	اضطراب العرة الصوتية المزمن 8A05.02
100	عرات حركية وجيزة 8A05.02
100	اضطراب العرة أو عرات أولية محددة أخرى 8A05.Y
100	اضطراب العرة أو عرات أولية، غير محددة 8A05.Z
101	متلازمة النماء العصبي الثانوية 6E60
101	متلازمة الكلام أو اللغة الثانوية 6E60.0
102	متلازمة النماء العصبي الثانوية المحددة أخرى 6E60.Y
103	متلازمة النماء العصبي الثانوية، غير محددة 6E60.Z
103	اضطرابات النماء العصبية محددة أخرى 6A0Y
103	اضطرابات النماء العصبية، غير محددة 6A0Z
105	الفُصام والاضطرابات الذهانية الأولية
106	الفُصام 6A20
108	الفُصام، النوبة الأولى 6A20.00
109	الفُصام، النوبة الأولى، عرضي حالياً 6A20.00
110	الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً 6A20.01
111	الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة كاملة 6A20.02
112	الفُصام، النوبة الأولى، غير محدد 6A20.0Z
113	الفُصام، نوبات متعددة 6A20.1
114	الفُصام، نوبات متعددة، عرضي حالياً 6A20.10

115.....	الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً 6A20.11
116.....	الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة كاملة 6A20.12
117.....	الفُصام، نوبات متعددة، غير محدد 6A20.1Z
118.....	الفُصام، مستمر 6A20.2
119.....	الفُصام، مستمر، عرضي حالياً 6A20.20
120.....	الفُصام، مستمر، في هدأة جزئياً 6A20.21
121.....	الفُصام، مستمر، في هدأة كاملة 6A20.22
122.....	الفُصام، مستمر، غير محدد 6A20.2Z
123.....	الفُصام، محدد آخر 6A20.Y
124.....	الفُصام، غير محدد 6A20.Z
125.....	الفُصام الوجداني 6A21
126.....	الفُصام الوجداني، النوبة الأولى 6A21.0
127.....	الفُصام الوجداني، النوبة الأولى، عرضي حالياً 6A21.00
128.....	الفُصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً 6A21.01
129.....	الفُصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة كاملة 6A21.02
130.....	الفُصام الوجداني، النوبة الأولى، غير محدد 6A21.0Z
130.....	الفُصام الوجداني، نوبات متعددة 6A21.1
131.....	الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، عرضي حالياً 6A21.10
132.....	الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً 6A21.11
133.....	الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة كاملة 6A21.12
134.....	الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، غير محدد 6A21.1Z
135.....	الفُصام الوجداني، مستمر 6A21.2
136.....	الفُصام الوجداني، مستمر، عرضي حالياً 6A21.20
137.....	الفُصام الوجداني، مستمر، في هدأة جزئياً 6A21.21
138.....	الفُصام الوجداني، مستمر، في هدأة كاملة 6A21.22
139.....	الفُصام الوجداني، مستمر، غير محدد 6A21.2Z
140.....	الفُصام الوجداني، محدد آخر 6A21.Y

141.....	6A21. Z غير محدد، الفصام الوجداني،
142.....	6A22 النمط الفصامي الاضطراب
144.....	6A23 الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز
145.....	6A23 نوبة أولى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
146.....	6A23.00 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
147.....	6A23.01 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
148.....	6A23.02 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
149.....	6A23.0Z غير محدد الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
150.....	6A23.1 نوبات متعددة الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
151.....	6A23.10 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
152.....	6A23.11 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
153.....	6A23.12 عرضي حالياً الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
154.....	6A23.1Z غير محدد الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
155.....	6A23.Y محدد آخر الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
156.....	6A23. Z غير محدد الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز،
157.....	6A24 الاضطراب التوهي
158.....	6A24.0 عرضي حالياً الاضطراب التوهي،
159.....	6A24.1 عرضي حالياً الاضطراب التوهي،
160.....	6A24.2 عرضي حالياً الاضطراب التوهي،
161.....	6A24.Z غير محدد الاضطراب التوهي،
162.....	6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
163.....	6A25.0 الاضطرابات الذهانية الأولية الأعراض الإيجابية في
164.....	6A25.1 الاضطرابات الذهانية الأولية الأعراض السلبية في
165.....	6A25.2 الاضطرابات الذهانية الأولية الأعراض الاكتئابية في
166.....	6A25.3 الاضطرابات الذهانية الأولية أعراض الهوس في
167.....	6A25.4 الاضطرابات الذهانية الأولية الأعراض النفسية الحركية في

168.....	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.4
169.....	الاضطرابات الذهانية المُحدّثة بالمواد
169.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول 6C40.6
171.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع هلاوس 6C40.60
173.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أوهام 6C40.61
175.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة 6C40.62
177.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول، غير محدد 6C40.6Z
179.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالحشيش 6C41.6
181.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكابابينويد الصناعي 6C42.6
182.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالأفيون 6C43.6
184.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6
186.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6
188.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60
189.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61
190.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62
192.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z
194.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.6
	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس
196.....	6C46.60
	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع أوهام
198.....	6C46.61
	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع أعراض
200.....	مختلطة 6C46.62
	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
202.....	6C46.6Z
204.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6
205.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60

206.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61
207.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
208.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z
209.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.5
211.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.6
213.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.6
215.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.5
217.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
219.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6
221.....	متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية 6E61
222.....	متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع هلاوس 6E61.0
223.....	متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام 6E61.1
224.....	متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام وهلاوس 6E61.2
225.....	متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أعراض غير محددة 6E61.3
225.....	فُصام محدد آخر، أو الاضطرابات الذهانية الأولية 6A2.Y
226.....	الفُصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية، غير محددة 6A2.Y
227.....	كاتاتونيا
228.....	كاتاتونيا مصاحبة لمرض عقلي آخر 6A40
229.....	كاتاتونيا مُحدثة بمواد ذات تأثير نفسي، متضمنة الأدوية 6A41
230.....	متلازمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69
231.....	كاتاتونيا، غير محددة 6E4Z
232.....	اضطرابات المزاج
233.....	ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة
234.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I
235.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I، النوبة الحالية هوس، دون أعراض ذهانية 6A60.0

236.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، مع أعراض ذهانية 6A60.1
237.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية تحت هوس ، 6A60.2
238.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، خفيف 6A60.3
239.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، معتدل دون أعراض ذهانية 6A60.4
240.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، معتدل مع أعراض ذهانية 6A60.5
241.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، شديد دون أعراض ذهانية 6A60.6
242.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، شديد مع أعراض ذهانية 6A60.7
243.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، غير محدد الشدة 6A60.8
244.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة ، دون أعراض ذهانية 6A60.6
245.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة ، مع أعراض ذهانية 6A60.A
246... 6A60.B	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة هوس أو تحت هوس 6A60.B
246.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة اكتئاب 6A60.C
247.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة مختلطة 6A60.D
248.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة غير محددة 6A60.E
249.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة كاملة 6A60.F
249.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I محدد آخر 6A60.Y
249.....	اضطراب ثنائي القطب نمط I ، غير محدد 6A60.Z
251.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II.....
251.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية تحت هوس ، 6A61.0
252.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، خفيف 6A61.1
254.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، معتدل دون أعراض ذهانية 6A61.2
255.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، معتدل مع أعراض ذهانية 6A61.3
256.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، شديد دون أعراض ذهانية 6A61.4
258.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، شديد مع أعراض ذهانية 6A61.5
259.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب ، غير محدد الشدة 6A61.6
260.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة تحت هوس 6A61.7
261.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة اكتئاب 6A61.8

262.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية ، أقرب نوبة غير محددة 6A61.9
263.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة كاملة 6A61.A
263.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II محدد آخر 6A61.Y
263.....	اضطراب ثنائي القطب نمط II ، غير محدد 6A61.Z
265.....	اضطرابٌ دَوْرَوِيَّةُ المَزَاج 6A62
266.....	ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة محدد آخر 6A6Y
266.....	ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة ، غير محدد 6A6Z
268.....	الاضطرابات الاكتئابية.....
268.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة 6A70
269.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، خفيف 6A70.0
270.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، معتدل دون أعراض ذهانية 6A70.1
271.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، معتدل مع أعراض ذهانية 6A70.2
272.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، شديد دون أعراض ذهانية 6A70.3
274.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، شديد مع أعراض ذهانية 6A70.4
275.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، غير محدد الشدة 6A70.5
276.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة جزئية 6A70.6
277.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة كاملة 6A70.7
277.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة محدد آخر 6A70.Y
277.....	اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، غير محدد 6A70.Z
278.....	اضطراب اكتئابي متكرر 6A71
279.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، النوبة الحالية خفيفة 6A71.0
280.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية 6A71.1
281.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، معتدل مع أعراض ذهانية 6A71.2
282.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، شديد دون أعراض ذهانية 6A71.3
284.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، شديد مع أعراض ذهانية 6A71.4
285.....	اضطراب اكتئابي متكرر ، غير محدد الشدة 6A71.5

287	اضطراب اكتئابي متكرر ، حالياً في هدأة جزئية 6A71.6
287	اضطراب اكتئابي متكرر ، حالياً في هدأة كاملة 6A71.7
288	اضطراب اكتئابي متكرر محدد آخر 6A71.Y
288	اضطراب اكتئابي متكرر ، غير محدد 6A71.Z
290	اضطراب سوء المزاج 6A72
291	اضطراب الاكتئاب والقلق المختلط 6A73
291	اضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث GA34.41
292	اضطراب اكتئابي محدد آخر 6A7Y
292	اضطراب اكتئابي ، غير محدد 6A7Z
293	أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج 6A80
294	أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0
294	هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1
295	نوبة اكتئاب حالية متواصلة 6A80.2
296	نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية 6A80.3
296	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4
297	الدوران السريع 6A80.5
298	اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس ، دون أعراض ذهانية 6E20
299	اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0
	اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس ، دون أعراض ذهانية محددة
299	أخرى 6E20.Y
	اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس ، دون أعراض ذهانية ، غير محددة 6E20.Z
300	اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس ، مع أعراض ذهانية 6E21
301	اضطرابات المزاج المُحدثة بالمواد
301	اضطراب مزاج مُحدَث بالكحول 6C40.70
303	اضطراب مزاج مُحدَث بالحشيش 6C41.70
304	اضطراب مزاج مُحدَث بالكاباينويد الصناعي 6C42.70

305.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالأفيون 6C43.70
307.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70
309.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين 6C45.70
311.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.70
313.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.70
314.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.60
315.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.70
317.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.70
318.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.70
320.....	متلازمة مزاج ثانوية 6E62
321.....	متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض اكتئابية 6E62.0
322.....	متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض هوس 6E62.1
323.....	متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض مختلطة 6E62.2
324.....	متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض غير محددة 6E62.3
324.....	اضطراب مزاج محدد آخر 6A7Y
324.....	اضطراب مزاج، غير محدد 6A7Z
326.....	اضطرابات القلق والاضطرابات ذات الصلة بالخوف
327.....	اضطراب القلق المعمم 6B00
328.....	اضطراب الهلع 6B01
329.....	رهاب الساح 6B02
330.....	الرهاب المحدد 6B03
331.....	اضطراب القلق الاجتماعي 6B04
332.....	اضطراب قلق الانفصال 6B05
333.....	الصمت الانتقائي 6B06
334.....	اضطرابات القلق المُحدثة بالمواد
334.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالكحول 6C40.71

336.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالحشيش 6C41.71
338.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالكابايينويد الصناعي 6C42.71
339.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالأفيون 6C43.71
341.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71
342.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالكوكائين 6C45.71
344.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالمنتجات متضمنة الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.71
346.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71
347.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالكافيين 6C48.40
348.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.61
349.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.71
351.....	اضطراب قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.71
352.....	اضطراب قلق مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمنة PCP أو الكيتامين 6C4D.61
354.....	اضطراب قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71
356.....	اضطراب قلق مُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71
358.....	داء المراق (توهم المرض) 6B23
359.....	داء المراق (توهم المرض) مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B23.0
359.....	داء المراق (توهم المرض) مع فقر إلى غياب البصيرة 6B23.1
360.....	داء المراق (توهم المرض)، غير محدد 6B23.Z
361.....	متلازمة قلق ثانوية 6E63
362.....	اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف محدد آخر 6B0Y
362.....	اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، غير محدد 6B0Z
364.....	الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة 6B23
365.....	اضطراب الوسواس القهري 6B20
366.....	اضطراب الوسواس القهري مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B20.0
366.....	اضطراب الوسواس القهري مع فقر إلى غياب البصيرة 6B20.1
366.....	اضطراب الوسواس القهري، غير محدد 6B20.Z

367.....	اضطراب صورة الجسد 6B21.....
368.....	اضطراب صورة الجسد مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B21.0.....
368.....	اضطراب صورة الجسد مع فقر إلى غياب البصيرة 6B21.1.....
368.....	اضطراب صورة الجسد، غير محدد 6B21.Z.....
369.....	الاضطراب المرجعي الشهي 6B22.....
369.....	الاضطراب المرجعي الشهي مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B22.0.....
370.....	الاضطراب المرجعي الشهي مع فقر إلى غياب البصيرة 6B22.1.....
370.....	الاضطراب المرجعي الشهي، غير محدد 6B22.Z.....
371.....	داء المراق (توهم المرض) 6B23.....
372.....	اضطراب الاكتناز 6B24.....
372.....	اضطراب الاكتناز مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B24.0.....
373.....	اضطراب الاكتناز مع فقر إلى غياب البصيرة 6B24.1.....
373.....	اضطراب الاكتناز، غير محدد 6B24.Z.....
374.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25.....
374.....	هوس نتف الأشعار 6B25.0.....
375.....	اضطراب كشط الجلد 6B25.1.....
375.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y.....
375.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد، غير محدد 6B25.Z.....
376.....	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة المحدثة بالمواد.....
376.....	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.72.....
378.....	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكائينون 6C46.72.....
380.....	متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحَدَّث بالكائينون الصناعي 6C47.72.....
381.....	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72.....

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات	
تأثير نفسي 6C4G.72.....	383
اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بمواد محددة متعددة 6C4F.72.....	385
متلازمة وسواس قهري ثانوية أو متلازمة ذات صلة 6E64.....	387
متلازمة توريت 8A05.00.....	388
اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة محدد آخر 6B2Y.....	388
اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة، غير محدد 6B2Z.....	388
الاضطرابات المرتبطة مع الكرب تحديداً.....	390
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة 6B40.....	391
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة المعقد 6B41.....	392
اضطراب الفجيرة المديد 6B42.....	393
اضطراب التأقلم 6B43.....	394
اضطراب التعلق التفاعلي 6B44.....	395
اضطراب التعلق التفاعلي المتحلل 6B45.....	396
الاضطرابات المحددة الأخرى المرتبطة مع الكرب تحديداً 6B4Y.....	397
الاضطرابات المرتبطة مع الكرب تحديداً، غير محدد 6B4Z.....	397
الاضطرابات التفارقية.....	399
اضطراب العرض العصبي التفارقي 6B60.....	400
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات بصرية 6B60.0.....	400
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات سمعية 6B60.1.....	401
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع دوخة أو دوار 6B60.2.....	401
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلال حسي آخر 6B60.3.....	401
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلاجات غير صرعية 6B60.4.....	402
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الكلام 6B60.5.....	402
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع شلل جزئي أو ضعف 6B60.6.....	403
اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات المشية 6B60.7.....	403

404.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة 6B60.8
404.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رمع عضلي 6B60.81
405.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رعاش 6B60.82
405.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع عسر التوتر العضلي 6B60.83
406.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع تشنج الوجه 6B60.84
407.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع باركنسونية 6B60.85
407.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة، محدد آخر 6B60.8Y
407.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة، غير محدد 6B60.8Z
408.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع أعراض معرفية 6B60.9
408.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، محدد آخر 6B60.Y
408.....	اضطراب العرض العصبي التفارقي، غير محدد 6B60.Z
409.....	النسوة التفارقية 6B61
410.....	اضطراب الغَيْبَةِ 6B62
411.....	اضطراب غَيْبَةِ الحياة 6B63
412.....	اضطراب الهوية التفارقي 6B64
413.....	اضطراب الهوية التفارقي الجزئي 6B65
414.....	اضطراب تبدد الشخصية - تبدد الواقع 6B66
415.....	متلازمة تفارق ثانوية 6E65
416.....	اضطراب تفارقي محدد آخر 6B6Y
416.....	اضطراب تفارقي، غير محدد 6B6Z
418.....	اضطرابات التغذية والأكل
418.....	فقد الشهية العصبي 6B80
420.....	فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ 6B80.0
421.....	فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، النمط المقيد 6B80.00
	فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، نمط الشراهة - التطهير 6B80.01
421.....	

422.....	فقد الشبهة العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ، غير محدد 6B80.0Z
422.....	فقد الشبهة العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير 6B80.0
423.....	فقد الشبهة العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ، النمط المقيد 6B80.10
423.....	فقد الشبهة العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ، نمط الشراهة - التطهير 6B80.11
424.....	فقد الشبهة العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ، غير محدد 6B80.1Z
425.....	فقد الشبهة العصبي ، مع تعافٍ ووزن طبيعي للجسم 6B80.2
426.....	فقد الشبهة العصبي محدد آخر 6B8Y
427.....	فقد الشبهة العصبي ، غير محدد 6B8Z
428.....	الشه العصبي 6B81
429.....	اضطراب الشراهة عند الأكل 6B82
430.....	اضطراب تناول الطعام المقيد – التجني 6B83
431.....	شهوة أكل المواد الغريبة (بيكا) 6B84
432.....	اضطراب الاجترار والقلس 6B85
433.....	اضطراب تغذية وأكل محدد آخر 6B8Y
433.....	اضطراب تغذية وأكل ، غير محدد 6B8Z
435.....	اضطرابات الإفراغ.....
435.....	سلس البول 6C00
437.....	سلس البول الليلي 6C00.0
437.....	سلس البول النهاري 6C00.1
438.....	سلس البول الليلي - النهاري 6C00.2
438.....	سلس البول ، غير محدد 6C00.Z
439.....	سلس البراز 6C01
439.....	سلس البراز المصحوب بالإمساك والقيض 6C01.0
440.....	سلس البراز المصحوب دون إمساك وقيض 6C01.1
441.....	سلس البراز ، غير محدد 6C01.Z
441.....	اضطراب إفراغ ، غير محدد 6C0Z

443.....	اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية.....
443.....	اضطراب الضائقة الجسدي 6C20.....
445.....	اضطراب الضائقة الجسدي الخفيف 6C20.0.....
445.....	اضطراب الضائقة الجسدي المعتدل 6C20.1.....
446.....	اضطراب الضائقة الجسدي الشديد 6C20.2.....
446.....	اضطراب الضائقة الجسدي، غير محدد 6C20.Z.....
447.....	الانزعاج من الكمال الجسدي 6C21.....
447.....	اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية محددة أخرى 6C2Y.....
447.....	اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية، غير محددة 6C2Z.....
449.....	الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات الإدمانية.....
449.....	الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد.....
450.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول.....
451.....	نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0.....
453.....	نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16.....
454.....	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي 6C40.16.....
456.....	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر 6C40.16.....
457.....	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد 6C40.1Z.....
459.....	الاعتماد على الكحول 6C40.2.....
461.....	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر 6C40.20.....
462.....	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي 6C40.21.....
464.....	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة 6C40.22.....
465.....	الاعتماد على الكحول، هدأة مستدامة جزئية 6C40.23.....
467.....	الاعتماد على الكحول، هدأة مستدامة كاملة 6C40.24.....
468.....	الاعتماد على الكحول، غير محدد 6C40.2Z.....
470.....	الانسحاب بالكحول 6C40.3.....
472.....	سحب الكحول 6C40.4.....

473	6C40.40 سحب الكحول، غير مختلط
474	6C40.41 سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية
475	6C40.42 سحب الكحول، مع اختلاجات
476	6C40.43 سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
477	6C40.4Z سحب الكحول، غير محدد
478	6C40.5 الهذيان المُحدث بالكحول
480	6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول
482	6C40.60 اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع هلاوس
484	6C40.61 اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أوهام
486	6C40.62 اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة
488	6C40.6Z اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول، غير محدد
489	6C40.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
491	6C40.70 اضطراب مزاج مُحدَث بالكحول
493	6C40.71 اضطراب قلق مُحدَث بالكحول
495	6D72.10 اضطراب النسوة بسبب استعمال الكحول
497	6D84.0 خرف بسبب استعمال الكحول
499	6C40.Y اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكحول
500	6C40.Z اضطرابات بسبب استعمال الكحول، غير محددة
502	6C41 الاضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش
503	6C41.0 نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
504	6C41.1 نمط ضار من استعمال الحشيش
506	6C41.1 نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
507	6C41.11 نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
508	6C41.1Z نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
509	6C41.2 الاعتماد على الحشيش
510	6C41.20 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
512	6C41.21 الاعتماد على الحشيش، هدأة كاملة مبكرة

513.....	الاعتماد على الحشيش، هداة مستدامة جزئية 6C41.22
514.....	الاعتماد على الحشيش، هداة مستدامة كاملة 6C41.23
515.....	الاعتماد على الحشيش، غير محدد 6C41.2Z
516.....	الانسمام بالحشيش 6C41.3
517.....	سحب الحشيش 6C41.4
518.....	الهذيان المُحدث بالحشيش 6C41.5
519.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالحشيش 6C41.6
521.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالحشيش 6C41.7
522.....	اضطراب مزاج مُحدث بالحشيش 6C41.70
523.....	اضطراب قلق مُحدث بالحشيش 6C41.71
525.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الحشيش 6C41.Y
526.....	اضطرابات بسبب استعمال الحشيش، غير محددة 6C41.Z
527.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصناعي 6C42
528.....	نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي 6C42.0
529.....	نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي 6C42.1
530.....	نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، نوبي 6C42.10
531.....	نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، مستمر 6C42.11
532.....	نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، محدد آخر 6C42.1Y
533.....	نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، غير محدد 6C42.1Z
534.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي 6C42.2
535.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، الاستعمال الحالي 6C42.20
536.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هداة كاملة مبكرة 6C42.21
537.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هداة مستدامة جزئية 6C42.22
538.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هداة مستدامة كاملة 6C42.23
539.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي محدد آخر 6C42.2Y
540.....	الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، غير محدد 6C42.2Z

541.....	الانسمام بالكاناينويد الصناعي 6C42.3
542.....	سحب الكاناينويد الصناعي 6C42.4
543.....	الهذيان المُحدث بالكاناينويد الصناعي 6C42.5
544.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاناينويد الصناعي 6C42.6
545.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاناينويد الصناعي 6C42.7
545.....	اضطراب مزاج مُحدث بالكاناينويد الصناعي 6C42.70
546.....	اضطراب قلق مُحدث بالكاناينويد الصناعي 6C42.71
548.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال الأفيون 6C43
549.....	نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1
550.....	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي 6C43.10
551.....	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر 6C43.11
553.....	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد 6C43.1Z
554.....	الاعتماد على الأفيون 6C43.2
555.....	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي 6C43.20
556.....	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة 6C43.21
557.....	الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة جزئية 6C43.22
558.....	الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة كاملة 6C43.23
559.....	الاعتماد على الأفيون، غير محدد 6C43.2Z
560.....	الانسمام بالأفيون 6C43.3
561.....	سحب الأفيون 6C43.4
562.....	الهذيان المُحدث بالأفيون 6C43.5
564.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالأفيون 6C43.6
566.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالأفيون 6C43.7
567.....	اضطراب مزاج مُحدث بالأفيون 6C43.70
568.....	اضطراب قلق مُحدث بالأفيون 6C43.71
569.....	نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0
571.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الأفيون 6C43.Y

572.....	اضطرابات بسبب استعمال الأفيون، غير محددة 6C43.Z
573.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44
574.....	نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0
575.....	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C41.1
577.....	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي 6C44.1
578.....	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر 6C44.11
579.....	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.1Z
580.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2
581.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي 6C44.20
582.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة 6C44.21
583.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة جزئية 6C44.22
584.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة كاملة 6C44.23
585.....	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.2Z
586.....	الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.3
588.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.4
589.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير مختلط 6C44.40
590.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية 6C44.41
591.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اختلاجات 6C44.42
592.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات 6C44.43
593.....	سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.4Z
594.....	الهذيان المُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5
595.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6
597.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7
598.....	اضطراب مزاج مُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70
599.....	اضطراب قلق مُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71
601.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.Y

602.....	اضطرابات بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محددة 6C44.Z
603.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين 6C45
604.....	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
606.....	نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C41.1
607.....	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي 6C45.1
609.....	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر 6C45.11
610.....	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد 6C45.1Z
612.....	الاعتماد على الكوكائين 6C45.2
613.....	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي 6C45.20
615.....	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة 6C45.21
617.....	الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة جزئية 6C45.22
618.....	الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة كاملة 6C45.23
619.....	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد 6C45.2Z
620.....	الانسحاب بالكوكائين 6C45.3
622.....	سحب الكوكائين 6C45.4
623.....	الهلوسات المُحدث بالكوكائين 6C45.5
624.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكوكائين 6C45.6
626.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60
627.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61
628.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62
629.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z
631.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين 6C45.7
632.....	اضطراب مزاج مُحدث بالكوكائين 6C45.70
633.....	اضطراب قلق مُحدث بالكوكائين 6C45.71
635.....	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدث بالكوكائين 6C45.72
637.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدث بالكوكائين 6C45.73
638.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكوكائين 6C45.Y

639.....	اضطرابات بسبب استعمال الكوكائين، غير محددة 6C45.Z
6C46	الاضطرابات الناتجة عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون
641.....	
6C46.0	نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون
643.....	
6C41.1	نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون 6C41.1... 645
	نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، نوبي
647.....	6C46.10
	نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، مستمر
649.....	6C46.11
	نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، غير محدد
651.....	6C46.1Z
653.....	6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون
	الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، الاستعمال الحالي
655.....	6C46.20
	الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، هدأة كاملة مبكرة
657.....	6C46.21
	الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، هدأة مستدامة جزئية
659.....	6C46.22
	الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، هدأة مستدامة كاملة
661.....	6C46.23
	الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون، غير محدد 6C46.2Z
663.....	
664.....	6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون
667.....	6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون
669.....	6C46.5 الهذيان المُحدث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.6..671	
اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس	
6C46.60.....	673
اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أوهام	
6C46.61.....	675
اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض	
6C46.62.....	677
اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير	
6C46.6Z.....	679
اضطرابات أخرى مُحدثةً بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.7..681	
اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.70	
.....	682
اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.71	
.....	685
اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين	
والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.72.....	687
اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون	
6C46.73.....	689
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين	
والميتكاثينون 6C46.Y.....	691
اضطرابات بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير	
6C46.Z.....	692
الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.....	694
نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0.....	695
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C41.1.....	696
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، نوبي 6C47.10.....	698
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، مستمر 6C47.11.....	699

701.....	نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.1Z
702.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2
703.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي، الاستعمال الحالي 6C47.20
705.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة كاملة مبكرة 6C47.21
706.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة جزئية 6C47.22
707.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة كاملة 6C47.23
709.....	الاعتماد على الكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.2Z
710.....	الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3
711.....	سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4
711.....	الهذيان المُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.5
713.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.6
714.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60
715.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61
716.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
717.....	اضطراب ذهاني مُحدث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z
718.....	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاثينون الصناعي 6C47.7
718.....	اضطراب مزاج مُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.70
719.....	اضطراب قلق مُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.71
720.....	متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحدثة بالكاثينون الصناعي 6C47.72
721.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.73
722.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.Y
723.....	اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصناعي، غير محددة 6C47.Z
724.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين 6C48
725.....	نوبة من الاستعمال الضار للكافيين 6C48.0
726.....	نمط ضار من استعمال الكافيين 6C41.1
727.....	نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي 6C48.10

727.....	نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر 6C48.11
728.....	نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد 6C48.1Z
729.....	الانسمام بالكافيين 6C48.2
730.....	سحب الكافيين 6C48.4
731.....	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكافيين 6C48.4
732.....	اضطراب قلق مُحدّث بالكافيين 6C48.40
733.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين 6C48.Y
734.....	اضطرابات بسبب استعمال الكافيين، غير محددة 6C48.Z
735.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهلوسات 6C49
736.....	نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
737.....	نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C41.1
738.....	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي 6C49.10
739.....	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر 6C49.11
741.....	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد 6C49.1Z
741.....	الاعتماد على المهلوسات 6C49.2
743.....	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي 6C49.20
744.....	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21
745.....	الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة جزئية 6C49.22
746.....	الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة كاملة 6C49.23
747.....	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد 6C49.2Z
748.....	الانسمام بالمهلوسات 6C49.3
750.....	الهذيان المُحدّث بالمهلوسات 6C49.4
751.....	اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهلوسات 6C49.5
752.....	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.7
753.....	اضطراب مزاج مُحدّث بالمهلوسات 6C49.60
755.....	اضطراب قلق مُحدّث بالمهلوسات 6C49.61
756.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهلوسات 6C49.Y

757.....	اضطرابات بسبب استعمال المهلوسات، غير محددة 6C49.Z
759.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين 6C4A
760.....	نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
761.....	نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C41.1
762.....	نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي 6C4A.1
763.....	نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر 6C4A.11
764.....	نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد 6C4A.1Z
765.....	الاعتماد على النيكوتين 6C4A.2
766.....	الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي 6C4A.20
767.....	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة 6C4A.21
768.....	الاعتماد على النيكوتين، هدأة مستدامة جزئية 6C4A.22
769.....	الاعتماد على النيكوتين، هدأة مستدامة كاملة 6C4A.23
770.....	الاعتماد على النيكوتين، غير محدد 6C4A.2Z
770.....	الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3
772.....	سحب النيكوتين 6C4A.4
773.....	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين 6C4A.Y
774.....	اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين، غير محددة 6C4A.Z
775.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B
776.....	نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
777.....	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C41.1
778.....	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.1
780.....	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C4B.11
781.....	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z
782.....	الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2
783.....	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20
784.....	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C4B.21

785.....	6C4B.22	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة مستدامة جزئية
786.....	6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة مستدامة كاملة
787.....	6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، غير محدد
788.....	6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطائرة
789.....	6C4B.4	سحب المستنشقات الطائرة
790.....	6C4B.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالمستنشقات الطائرة
792.....	6C4B.7	اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمستنشقات الطائرة
793.....	6C4B.70	اضطراب مزاج مُحدَث بالمستنشقات الطائرة
794.....	6C4B.71	اضطراب قلق مُحدَث بالمستنشقات الطائرة
796.....	6C4B.Y	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المستنشقات الطائرة
797.....	6C4B.Z	اضطرابات بسبب استعمال المستنشقات الطائرة، غير محددة
798.....	6C4C	الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها
799.....	6C4C.0	نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها
801.....	6C41.1	نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها
803.....	6C4C.1	نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي
804	6C4C.11	نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر
	6C4C.1Z	نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد
805.....		
806.....	6C4C.2	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها
807.	6C4C.20	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي
808.	6C4C.21	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة
	6C4C.22	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة مستدامة جزئية
809.....		
	6C4C.23	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة مستدامة كاملة
810.....		
811.....	6C4C.2Z	الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد
812.....	6C4C.3	الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها

814.....	سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.4
815.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.6
816.....	اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.7
817.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.70
819.....	اضطراب قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.71
	اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها
820.....	6C4C.Y
	اضطرابات بسبب استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محددة 6C4C.Z
821.....	
823.....	الاضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D
824.....	نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين C4D.06
825.....	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.1
827.....	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، نوبي 6C4D.10
828.....	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، مستمر 6C4D.11
829....	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد 6C4D.1Z
830.....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.2
831.....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، الاستعمال الحالي 6C4D.20
832.....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة كاملة مبكرة 6C4D.21
833....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة جزئية 6C4D.22
834....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة كاملة 6C4D.23
835.....	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد 6C4D.2Z
836.....	الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3
837.....	الهديان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4
838.....	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين 6C4D.5
840.....	اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6
841.....	اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين 6C4D.60

- 842.....6C4D.61 اضطراب قلق مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 844..6C4D.Y اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين
- 845..6C4D.Z اضطرابات بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، غير محددة
- 846.....6C4E الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6C4E
- 847.....6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 849.....6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 850.....6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 851.....6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 853.....6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 854.....6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 856.....6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 857.....6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 859.....6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة جزئية
- 860.....6C4E.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة
- 862.....6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 864.....6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 865.....6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 866.....6C40.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 867.....6C40.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية
- 868.....6C40.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 869.....6C40.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
- 870.....6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 871.....6C4E.5 الهذيان المُحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 872.....6C4E.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 874.....6C4E.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 875.....6C4E.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 877.....6C4E.71 اضطراب قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي	6C4E.72	879
اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي	6C4E.73	881
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي	6C4E.Y	882
اضطرابات بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محددة	6C4E.Z	884
الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية	6C4F	886
نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.0	887
نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.1	889
نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي	6C4F.10	890
نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر	6C4F.11	891
نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد	6C4F.1Z	893
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.2	894
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي	6C4F.20	895
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة	6C4F.21	896
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة جزئية	6C4F.22	897
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة	6C4F.23	899
الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد	6C4F.2Z	900
الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.3	901
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.4	903
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط	6C40.40	904
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية	6C40.41	905
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات	6C40.42	906
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات	6C40.43	907
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد	6C40.4Z	908
الهذيان المُحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.5	908
اضطراب ذهاني مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي	6C4F.6	910

- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7.....911
- اضطراب مزاج مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70.....912
- اضطراب قلق مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71.....914
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72.....915
- اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73.....917
- اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.Y.....918
- اضطرابات بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محددة 6C4F.Z.....919
- الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.....921
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0.....923
- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1.....924
- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي 6C4G.10.....926
- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر 6C4G.11.....928
- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4G.1Z.....929
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2.....930
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي 6C4G.20.....932
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة 6C4G.21.....933
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة جزئية 6C4G.22.....935
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة 6C4G.23.....936
- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4G.2Z.....938
- الانسحاب بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.3.....939
- سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.4.....941
- سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C4G.40.....942
- سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية 6C4G.41.....943

944.....	6C40.42 مع اختلاجات نفسي، سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
945.....	6C40.43 سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
946.....	6C40.4Z سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
947.....	6C4G.5 الهذيان المُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
949.....	6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
951.....	6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
952.....	6C4G.70 اضطراب مزاج مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
954.....	6C4G.71 اضطراب قلق مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
956.....	6C4G.72 اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
958.....	6C4G.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
960.....	6C4G.Y اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
961.....	6C4G.Z اضطرابات بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محددة
964.....	6C50 الاضطرابات الناتجة عن السلوكيات الإدمانية
964.....	6C50 اضطراب المقامرة
966.....	6C50.0 اضطراب المقامرة، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت
967.....	6C50.1 اضطراب المقامرة، الشكل المسيطر عبر الإنترنت
968.....	6C50.Z اضطراب المقامرة، غير المحدد
968.....	6C51 اضطراب اللعب
969.....	6C51.0 اضطراب اللعب، الشكل المسيطر عبر الإنترنت
970.....	6C51.1 اضطراب اللعب، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت
971.....	6C50.Z اضطراب اللعب، غير المحدد

971.....	اضطراب ناتج عن السلوكيات الإدمانية محدد آخر 6C5Y
971.....	اضطراب ناتج عن السلوكيات الإدمانية، غير محدد 6C5Z
973.....	اضطرابات التحكم بالدافع
974.....	هوس الحرائق 6C70
975.....	هوس السرقة 6C71
976.....	اضطراب السلوك الجنسي القهري 6C72
977.....	الاضطراب الانفجاري المتقطع 6C73
978.....	اضطرابات التحكم بالدافع المُحدّثة بمادة
978.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين 6C45.73
	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكائينون
978.....	6C46.73
978.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكائينون الصناعي 6C47.73
979.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73
979.....	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.73
979.....	اضطراب المقاومة 6C50
979.....	اضطراب المقاومة، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت 6C50.0
979.....	اضطراب المقاومة، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C50.1
980.....	اضطراب المقاومة، غير المحدد 6C50.Z
980.....	اضطراب اللعب 6C51
980.....	اضطراب اللعب، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C51.0
980.....	اضطراب اللعب، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت 6C51.1
980.....	اضطراب اللعب، غير المحدد 6C50.Z
981.....	متلازمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66
981.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25
981.....	هوس نتف الأشعار 6B25.0
981.....	اضطراب كشط الجلد 6B25.1

982.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y
982.....	اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد، غير محدد 6B25.Z
982.....	اضطرابات التحكم بالدافع محددة أخرى 6C7Y
982.....	اضطرابات التحكم بالدافع، غير محدد 6C7Z
984.....	السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية
984.....	اضطراب التحدي المعارض 6C90
985.....	اضطراب التحدي المعارض نمط التهيج - الغضب 6C90.0
985.....	اضطراب التحدي المعارض دون تهيج مزمن - غضب 6C90.1
986.....	اضطراب التحدي المعارض، غير محدد 6C90
986.....	اضطراب المسلك الاجتماعي 6C91
987.....	اضطراب المسلك الاجتماعي، بدء في الطفولة 6C91.0
987.....	اضطراب المسلك الاجتماعي، بدء في المراهقة 6C91.1
988.....	اضطراب المسلك الاجتماعي، غير محدد 6C91.Z
988.....	السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية محددة أخرى 6C9Y
988.....	السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية، غير محدد 6C9Z
990.....	اضطرابات الشخصية والسمات ذات الصلة
990.....	اضطراب الشخصية 6D10
991.....	اضطراب الشخصية الخفيف 6D10.0
992.....	اضطراب الشخصية المعتدل 6D10.1
993.....	اضطراب الشخصية الشديد 6D10.2
994.....	اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة 6D10.Z
994.....	سمات أو أنماط شخصية بارزة 6D11
995.....	الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية 6D11.0
996.....	الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية 6D11.1
997.....	الاجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.2

998.....	التحلل في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.3
999.....	الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.4
1000	النمط الحدي 6D11.5
1001	تغير الشخصية الثانوي 6E68
1003	اضطرابات الولع الجنسي
1004	اضطراب الاستعراء 6D30
1004	اضطراب التلصص 6D31
1005	اضطراب الولع بالأطفال 6D32
1005	اضطراب السادية الجنسي القسري 6D33
1006	اضطراب التحرش 6D34
1007	اضطراب الولع الجنسي الآخر الذي يشمل أفراداً غير موافقين 6D35
1008	اضطراب الولع الجنسي الذي يشمل السلوك الانفرادي أو الأفراد الموافقين 6D36
1008	اضطراب الولع الجنسي، غير محدد 6D3Z
1010	الاضطرابات المُفتعلة
1011	الاضطراب المفتعل المفروض على الذات 6D50
1012	الاضطراب المفتعل المفروض على الغير 6D51
1012	الاضطراب المفتعل، غير محدد 6D5Z
1014	الاضطرابات المعرفية العصبية
1015	الهذيان 6D70
1016	الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0
1017	الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1
1018	الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)
1018	الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)
1018	الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)
1018	الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)

1018	الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5).....
1018	الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون (6C46.5).....
1019	الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5).....
1019	الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4).....
1019	الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5).....
1019	الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5).....
1019	الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4).....
1019	الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5).....
1019	الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5).....
1019	الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5).....
1020	الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2.....
1020	الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أو لا يمكن تحديدها 6D70.3.....
1021	الاضطراب العصبي المعرفي الخفيف 6D71.....
1022	اضطراب النساءساوة 6D72.....
1023	اضطراب النساءساوة ناتج عن أمراض مصنفة في مكان آخر 6D72.....
1024	اضطراب النساءساوة ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D72.1.....
1025	اضطراب النساءساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10.....
1025	اضطراب النساءساوة الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6D72.11.....
	اضطراب النساءساوة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية
1027	6D72.12.....
1028	اضطراب النساءساوة الناتج عن استعمال المستنشقات الطيارة 6D72.13.....
1029	اضطراب النساءساوة الناتج عن عوامل مرضية مسببة غير معروفة أو غير محددة 6D72.2.....
1029	اضطراب نساوة محدد آخر 6D72Y.....
1029	اضطراب النساءساوة، غير محدد 6D72Z.....
1030	الخرف.....
1031	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر 6D80.....

1032	6D80.0	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء باكراً
1034	6D80.1	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء متأخراً
1035	6D80.2	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر ، نمط مختلط مع داء وعائي دماغي
1036	6D80.3	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر ، نمط مختلط مع عوامل مرضية غير وعائية
1037	6D80.Z	الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر ، بدء غير محدد أو غير معروف
1039	6D81	الخَرَف الناتج عن داء وعائي
1041	6D82	الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي
1043	6D83	الخَرَف الجبهي الصدغي
1045	6D84	الخَرَف ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية
1047	6D84.0	الخَرَف بسبب استعمال الكحول
1049	6D84.1	الخَرَف الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
1051	6D84.2	الخَرَف الناتج عن استعمال المستنشقات الطيارة
1053	6D84.Y	الخَرَف الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
1055	6D85	الخَرَف الناتج عن داء مصنف في مكان آخر
1057	6D85.0	الخَرَف الناتج عن داء باركنسون
1058	6D85.1	الخَرَف الناتج عن داء هنتنغتون
1059	6D85.2	الخَرَف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى
1061	6D85.3	الخرف الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية
1063	6D85.4	الخرف الناتج عن التصلب اللويحي
1065	6D85.5	الخرف الناتج عن داء بريون
1066	6D85.6	الخرف الناتج عن استسقاء الدماغ مع الضغط الطبيعي
1068	6D85.7	الخَرَف الناتج عن إصابة الرأس
1070	6D85.8	الخرف الناتج عن البلاجرا
1071	6D85.9	الخرف الناتج عن متلازمة داون
1073	6D85.Y	الخرف الناتج عن داء محدد آخر مضمن في مكان آخر
1074	6D86	الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
1075	6D86.0	الأعراض الذهانية في الخرف

1075	أعراض المزاج في الخرف 6D86.1
1076	أعراض القلق في الخرف 6D86.2
1076	التبُّدُّل في الخرف 6D86.3
1077	الهيّاج أو العدوانية في الخرف 6D86.4
1077	التحلل في الخرف 6D86.5
1077	التجول في الخرف 6D86.6
1078	الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف المحددة الأخرى 6C86.Y
1078	الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف، غير محددة 6C86.Z
1079	خَرَف، غير معروف أو غير محدد السبب 6D8Z
1081	متلازمة معرفية عصبية ثانوية 6E67
1082	الهذيان 6D70
1082	الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0
1082	الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1
1082	الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)
1082	الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)
1082	الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)
1082	الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)
1082	الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)
1082	الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)
1083	الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)
1083	الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)
1083	الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5)
1083	الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)
1083	الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيّتامين (6C4D.4)
1083	الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)
1083	الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)

- 1083الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5).....
- 1083الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2.....
- 1083الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أو لا يمكن تحديدها 6D70.3.....
- 1084اضطراب معرفي عصبي محدد أخرى 6E0Y.....
- 1084اضطراب معرفي عصبي، غير محدد 6E0Z.....
- 1086الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس.....
1087. 6E20.اضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.....
- 1088اكتئاب ما بعد الولادة 6E20.0 NOS.....
- اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية محدد آخر
- 10886E20.Y.....
- اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محدد
- 10896E20.Z.....
- 1089الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21.....
- 1090الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، غير المحددة 6E2Z.....
- 1092 .. 6E40.العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر 6E40.....
- 1093 .. 6E40.0.العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر 6E40.....
- 10936E40.1.العوامل النفسية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر 6E40.....
- سمات الشخصية أو أسلوب التأقلم الذي يؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر
- 10946E40.2.....
- السلوكيات الصحية سيئة التكيف التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر
- 10946E40.3.....
- الاستجابة الفيزيولوجية المرتبطة بالكرب والتي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر
- 10956E40.4.....
- العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر المحددة
- 10956E40.Y.الأخرى 6E40.....

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر، غير محددة 6E40.Z.....	1095
المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر ... 1097	
متلازمة النماء العصبي الثانوية 6E60.....	1097
متلازمة الكلام أو اللغة الثانوية 6E60.0.....	1097
متلازمة النماء العصبي الثانوية المحددة أخرى 6E60.Y.....	1098
متلازمة النماء العصبي الثانوية، غير محددة 6E60.Z.....	1098
متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية 6E61.....	1098
متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع هلاوس 6E61.0.....	1098
متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام 6E61.1.....	1098
متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام وهلاوس 6E61.2.....	1098
متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أعراض غير محددة 6E61.3.....	1098
متلازمة مزاج ثانوية 6E62.....	1098
متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض اكتئابية 6E62.0.....	1099
متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض هوس 6E62.1.....	1099
متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض مختلطة 6E62.2.....	1099
متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض غير محددة 6E62.3.....	1099
متلازمة قلق ثانوية 6E63.....	1099
متلازمة وسواس قهري ثانوية أو متلازمة ذات صلة 6E64.....	1099
متلازمة تفارق ثانوية 6E65.....	1099
متلازمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66.....	1099
متلازمة معرفية عصبية ثانوية 6E67.....	1099
الهذيان 6D70.....	1100
الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0.....	1100
الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1.....	1100
الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5).....	1100

1100	الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)
1100	الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)
1100	الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)
1100	الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)
1100	الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)
1101	الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)
1101	الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)
1101	الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5)
1101	الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)
1101	الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4)
1101	الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)
1101	الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)
1101	الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5)
1101	الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2
1102	الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أو لا يمكن تحديدها 6D70.3
1102	تغير الشخصية الثانوي 6E68
1102	متلازمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69
	المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر محددة
1102	أخرى 6E6Y
	المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر، غير
1103	محددة 6E6Z
1105	اضطرابات النوم واليقظة
1105	اضطراب الأرق
1105	اضطراب الأرق المزمن 7A00
1106	اضطراب الأرق قصير الأمد 7A01
1107	اضطرابات الأرق، غير محددة 7A0Z

1108	اضطرابات فرط النعاس
1108	النَّوْمُ الاثْنِيَّايِي 7A20
1108	النَّوْمُ الاثْنِيَّايِي، النمط I 7A20.1
1108	النَّوْمُ الاثْنِيَّايِي، النمط II 7A20.0
1109	النَّوْمُ الاثْنِيَّايِي، غير محدد 7A20.Z
1109	فرط النوم مجهول السبب 7A21
1109	متلازمة كلاين ليفين 7A22
1110	فرط النوم بسبب حالة طبية 7A23
1110	فرط النوم بسبب دواء أو مادة 7A24
1111	فرط النوم المُصاحب لاضطراب عقلي 7A25
1111	متلازمة النوم غير الكافي 7A26
1111	اضطرابات فرط النوم محددة أخرى 7A2Y
1112	اضطرابات فرط النوم، غير محدد 7A2Z
1113	اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم
1113	انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي 7A40.0
1113	انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي لحديثي الولادة 7A40.1
1114	انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي للخدج 7A40.2
1114	انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب حالة طبية مع تنفس تشاين ستوكس 7A40.3
1114	انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب حالة طبية دون تنفس تشاين ستوكس 7A40.4
1115	انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب التنفس الدوري على ارتفاعات عالية 7A40.5
1115	انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب دواء أو مادة 7A40.6
1115	انقطاع النفس خلال النوم المركزي الناشئ عن علاج 7A40.7
1115	انقطاع النفس خلال النوم المركزي محدد آخر 7A40.Y
1116	انقطاع النفس خلال النوم المركزي، غير محدد 7A40.Z
1117	انقطاع النفس خلال النوم الانسدادي 7A41
1118	اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم 7A42

1118	متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة 7A42.0
1119	نقص التهوية المرتبط بالنوم السنخي المركزي الخلقي 7A42.1
1119	البداية المتأخرة لنقص التهوية المركزية مع تشوهات تحت المهاد 7A42.2
1119	نقص التهوية السنخي المركزي مجهول السبب 7A42.3
1120	نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب دواء أو مادة 7A42.4
1120	نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5
1121	نقص الأكسجة المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.6
1121	اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A42.Y
1121	اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم، غير محددة 7A42.Z
1122	نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5
1122	اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A4Y
1122	اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم، غير محددة 7A4Z
1123	اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي
1123	اضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر 7A60
1124	اضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتقدم 7A61
1124	اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير المنتظم 7A62
1125	اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير نموذج 24 ساعة 7A63
1125	اضطراب وتيرة النوم واليقظة بنمط ورديات العمل 7A64
1126	اضطراب وتيرة النوم واليقظة، نمط توائي الطيران 7A65
1126	اضطراب وتيرة النوم واليقظة، غير محدد 7A6Z
1127	اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم
1127	متلازمة تلملم الساقين 7A80
1127	اضطراب حركة الطرف الدورية 7A81
1128	اضطراب تشنجات الساق ذا الصلة بالنوم 7A82
1128	صرير الأسنان ذا الصلة بالنوم 7A83
1129	اضطراب الحركة الإيقاعي ذا الصلة بالنوم 7A84
1129	رمع النوم الحميد في الطفولة 7A85

1129	الرمع العضلي النخاعي عند بداية النوم 7A86
1130	اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب حالة طبية 7A87
1130	اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب مادة أو دواء 7A88
1130	اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.0
1131	اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم محددة أخرى 7A8Y
1131	اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم، غير محددة 7A8Z
1132	حالات النوم المضطرب (حَطَلُ نَوْمٍ)
1132	اضطرابات التَّيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة 7B00
1132	التَّيقُّظ التخليطي 7B00.0
1132	اضطراب المشي أثناء النوم 7B00.1
1133	رعب النوم 7B00.2
1133	اضطراب الأكل ذا الصلة بالنوم 7B00.3
1133	اضطرابات التَّيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة محددة أخرى 7B00.Y
1133	اضطرابات التَّيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة، غير محددة 7B00.Z
1134	حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة 7B01
1134	اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.0
1135	شلل النوم المعزول المتكرر 7B01.1
1135	اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.2
1135	حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة محددة أخرى 7B01.Y
1136	حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة، غير محددة 7B01.Z
1137	حالات النوم المضطرب الأخرى 7B02
1137	متلازمة تفجر الرأس ما قبل النوم 7B02.0
1137	هلاوس ذات صلة بالنوم 7B02.1
1137	حالات النوم المضطرب بسبب حالة طبية 7B02.1
1138	حالات النوم المضطرب بسبب مادة أو دواء 7B02.2
1138	سلس البول الليلي 6C00.0

1138 حالات النوم المضطرب محددة أخرى 7B0Y
1138 حالات النوم المضطرب، غير محددة 7B0Z
1139 اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي محددة أخرى 7B2Y
1140 اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي، غير محددة 7B2Z
1143 الاختلالات الجنسية
1143 اختلال تدني الرغبة الجنسية HA00
1145 اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، معمم HA00.0
1146 اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، ظرفي HA00.1
1147 اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، معمم HA00.2
1148 اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، ظرفي HA00.3
1149 اختلال تدني الرغبة الجنسية، غير محدد HA00.Z
1150 اختلال الاستثارة الجنسية HA01
1151 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي HA01.0
1152 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، معمم HA01.00
1153 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، ظرفي HA01.01
1154 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، معمم HA01.02
1155 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، ظرفي HA01.03
1156 اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، غير محدد HA01.0Z
1157 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري HA01.1
1158 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، معمم HA01.10
1159 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، ظرفي HA01.11
1160 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، معمم HA01.12
1161 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، ظرفي HA01.13
1162 اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، غير محدد HA01.1Z
1163 اختلال الاستثارة الجنسية محدد أخرى HA01.Y
1164 اختلال الاستثارة الجنسية، غير محدد HA01.Z

1165	اختلالات النشوة الجنسية HA02
1166	فقد النشوة HA02.0
1167	فقد النشوة، دائم، معمم HA02.01
1168	فقد النشوة، دائم، ظرفي HA02.11
1169	فقد النشوة، مكتسب، معمم HA02.02
1170	فقد النشوة، مكتسب، ظرفي HA02.03
1171	فقد النشوة، غير محدد HA02.0Z
1172	اختلال النشوة الجنسية محدد أخرى HA02.Y
1173	اختلال النشوة الجنسية، غير محدد HA02.Z
1174	اختلالات القذف HA03
1175	القذف المبكر عند الذكر HA03.0
1176	القذف المبكر عند الذكر، دائم، معمم HA03.00
1177	القذف المبكر عند الذكر، دائم، ظرفي HA03.01
1178	القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، معمم HA03.02
1179	القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، ظرفي HA03.03
1180	القذف المبكر عند الذكر، غير محدد HA03.0Z
1181	القذف المتأخر عند الذكر HA03.1
1182	القذف المتأخر عند الذكر، دائم، معمم HA03.10
1183	القذف المتأخر عند الذكر، دائم، ظرفي HA03.11
1184	القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، معمم HA03.12
1185	القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، ظرفي HA03.13
1186	القذف المتأخر عند الذكر، غير محدد HA03.1Z
1187	اختلالات القذف المحددة الأخرى HA03.Y
1188	اختلالات القذف، غير محددة HA03.Z
1189	الخلل الجنسي المرتبط بهبوط أعضاء الحوض GC42
1189	تناقص الإحساس بسبب الرخاوة المهبلية أو الداخلية GC42.0

1189	الجماع المعوق GC42.1
1190	اختلال جنسي محدد آخر HA0Y
1191	اختلال جنسي، غير محدد HA0Z
1193	لا توافق الجندر.....
1193	لا توافق الجندر عند المراهقة والبلوغ HA60
1194	لا توافق الجندر عند الأطفال HA61
1194	لا توافق الجندر، غير محدد HA6Z
1195	الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية المحددة الأخرى 6E8Y
1195	الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية غير المحددة 6E8Z

مقدمة

إن ICD-11 في الصيغة الحالية ليس بكتاب، وإنما عبارة عن تصنيف تشعي بُني للعودة إليه عن طريق الويب، وهذا التصنيف التشعي يجعل الانتقال بين مختلف الفئات أسهل لمستخدم المتصفح بما يتيح من مرونة العرض والوصول، وإمكانية البحث الموجودة ضمناً في التصنيف، ولذا كان تحويل هذا العمل المستند على الويب إلى كتاب؛ شيئاً يتضمن صعوبة من ناحية التطبيق العملي لإمكانيات المتصفح والويب وجعلها ممكنة لدى القارئ بما يضمن أقل الاختلاف بين الصيغتين.

ولكن وبما أن اللغة الوحيدة التي أُتيح بها ICD-11 هي الإنكليزية، فليس من السهل على من يُعنى بالأمر ولا يتقن الإنكليزية أن يصل لمبتغاه، لذا أخذت على عاتقي ومنذ صدور الطبعة 11 من التصنيف الدولي للأمراض أن أنقل هذا العمل الضخم للعربية وحدي، فناعة مني بأنه لن تتكفل أي جهة ذات شأن بهذا العمل.

وكان مما ساعدني في هذا، قياسي منذ سنوات مضت بتعريب الدليل التشخيصي الخامس DSM-5 والذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي عام 2013 ونشرته الدار العربية للعلوم، حيث سهّل هذا من سرعة وصولي إلى الأسلوب الأنسب للقيام بالترجمة والتحرير، واختيار المصطلحات والتعابير التي أظن أنها تتلاءم والاستعمال المعاصر، فجاز لي القول أنني الطبيب الوحيد في هذا العالم العربي من شرقه إلى غربه والذي وضع التشخيص والتصنيف الحديث للاضطرابات العقلية في متناول القارئ العربي. وأرغب في القول أن ما دفعني لهذا ليس طمعاً في ربح، فمن نشر كتاباً في السابق يعلم أن هذا مجلبة للخسران، وإنما كان هذا وسابقه استجابة لتحدي ذاتي فقط لا أكثر.

ولا بد من الإشارة أنه لا يوجد حقوق نشر للتصنيف الدولي للأمراض ICD-11 كحال DSM-5، فالعمل منشور لمن يريد على موقع منظمة الصحة العالمية.

ما هو التصنيف الدولي للأمراض ICD-11؟

التصنيف الدولي للأمراض ICD-11 هو المعيار الدولي للتسجيل، والإبلاغ، والتحليل، والتفسير والمقارنة للوفيات وبيانات المرض. وتعد الطبعة 11 ثمرةً لتعاون غير مسبوق بين الأطباء وخبراء الإحصاء والتصنيف وخبراء تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها قابلة للاستخدام من قبل هذه المجموعات ومن قبل المبرمجين كذلك. يسمح ICD-11 للبلدان بإحصاء وتحديد مشكلاتها الصحية الأكثر إلحاحاً باستخدام معلومات حديثة وذات صلة سريرية بالتصنيف.

لقد جرى تطوير ICD-11 من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) ويجري تحديثه بانتظام. وقد امتد تطويره على مدى عقد من العمل، وشارك فيه أكثر من 300 متخصص من 55 دولة والذين انقسموا إلى 30 مجموعة عمل. بعد إصدار ألفا التجريبي في أيار 2011 ثم مسودة بيتا في أيار 2012، صدرت نسخة مستقرة من ICD-11 في 18 يونيو 2018، والتي اعتمدت رسمياً من قبل جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية خلال جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين في 25 أيار 2019.

التحسينات في التصنيف الدولي للأمراض

تحسّن ICD-11 كثيراً عن المراجعات السابقة، فهو يعكس التطورات الحاسمة في العلوم والطب، ومواءمة التصنيف لأحدث المعارف عن علاج الأمراض والوقاية منها. كما يوجد محتوى سريري مفيد أكثر من ICD-10.

من السمات المهمة لـ ICD-11 سهولة ودقة الترميز المحسّنان، مما يتطلب تدريب المستخدم بشكلٍ أقل من أي وقت مضى، جنباً إلى جنب مع توفر مزاياه عبر الإنترنت ودون وصولٍ للويب. كما أن ICD-11 جاهز للصحة الرقمية، وللإستخدام في تكنولوجيا المعلومات المتعددة البيئات، مع واجهة برمجة تطبيقات جديدة. وتم تقديمه مع مجموعة من خدمات الويب بما في ذلك الدعم متعدد اللغات والمدمج مع دليل المستخدم.

تتيح منصة الاقتراحات لجميع الأطراف المهمة اقتراح تغييرات أو إضافات على ICD-11 ومشاهدتها ومناقشتها بشفافية. تضمن أداة الترجمة في ICD-11 ترجمة متسقة دولياً وإضافة مصطلحات مترجمة للاستخدام المحلي. وتم تضمين جميع مفاهيم التسجيل والإبلاغ في الرعاية الأولية.

لقد عُينت رموز ICD-11 للحالات الصحية والحوادث، مما ينتج عنه بيانات يمكن استخدامها بواسطة الحكومات لتصميم سياسات صحية عامة فعالة، وقياس تأثيرها، أو استخدامها للتسجيل السريري.

ولأول مرة، أصبح التصنيف الدولي للأمراض إلكترونياً بالكامل، حيث يوفر حالياً الوصول إلى 17000 فئة تشخيصية، مع أكثر من 100000 مؤشر طبي تشخيصي. تفسر خوارزمية البحث المعتمدة على الفهرس أكثر من 1.6 مليون مصطلح. ICD-11 سهل الاستعمال ويمكن استخدامه عند الاتصال أو عدم الاتصال بالإنترنت، باستخدام برنامج "محتوي" مجاني. وفي النهاية سيحل ICD-11 محل التصنيف الدولي العاشر للأمراض كمعيار عالمي لترميز المعلومات الصحية وأسباب الوفاة.

يحتوي ICD-11 على عشرات الآلاف من الكيانات، التي تسمى أيضاً الفئات أو العقد؛ حيث يمكن أن يكون الكيان أي شيء له صلة بالرعاية الصحية؛ لكنه عادة ما يمثل مرضاً أو عاملاً ممرضاً، ولكنه قد يكون أيضاً عرضاً منفرداً أو شذوذاً (تطورياً) في الجسم. توجد أيضاً فصول تتعلق بالاتصال بالخدمات الصحية والظروف الاجتماعية للمريض والأسباب الخارجية للأذيات أو الوفاة. تسمى كل مجموعة من كيانات ICD-11 تبعاً للمكون الأساس؛ من هذا اللب المشترك يمكن اشتقاق مجموعات فرعية مختلفة؛ على سبيل المثال؛ التصنيف الدولي للأمراض ICD-O هو تصنيف مشتق مُحسّن للاستخدام في علم الأورام. المشتق الأولي للأساس يسمى ICD-11 MMS، وهذا هو النظام الذي يشار إليه عموماً باسم ICD-11 MMS وتشير MMS إلى (إحصائيات الوفيات والمراضة، Mortality and Morbidity Statistics). يمكن الاطلاع على ICD-11 MMS عبر الإنترنت على موقع منظمة الصحة العالمية على الرابط التالي: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>

سيدخل هذا التصنيف رسمياً حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، وهو الوقت الذي قد تبدأ فيه الدول باستعمال ICD-11 للإبلاغ عن إحصاءات المراضة والوفيات. ويعود لكل دولة اختيار موعد اعتماد الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، وقد أقرت منظمة الصحة العالمية بأنه "من غير المحتمل أن تتكيف العديد من البلدان مع ذلك بسرعة"، أي البدء في استخدام الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض بحلول وقت إطلاقه. ومن المتوقع ألا يطبق في الولايات المتحدة حتى عام 2027.

الهيكلية

يعد ICD-11 مجموعة متعددة الأبعاد من عشرات الآلاف من الكيانات المترابطة، وتسمى أيضاً الفئات أو العقد. كل عقدة ضمن الأساس لها معرف كيان فريد. يمكن أن تحتوي العقدة على عدة عقد فرعية وأصلية. على سبيل المثال؛ يمكن تصنيف ذات الرئة على أنها انتان رئوي، ولكنها أيضاً عدوى بكتيرية أو فيروسية، أي حسب الموقع أو المسببات؛ وبالتالي، فإن عقدة ذات الرئة (معرف الكيان 142052508) (لها والدان: انتانات الرئة (معرف الكيان 15779102) ومرض معدي أو طفيلي محدد (رقم الكيان .

1435254666) تحتوي عقدة ذات الرئة بدورها على طفلين مختلفين، بما في ذلك ذات الرئة الجرثومية (معرف الكيان. 1323682030) وذات الرئة الفيروسية (معرف الكيان. 1024154490)

ICD-11 MMS

ICD-11 MMS هو المشتق الرئيسي من المكون الأساسي، وهذا التصنيف هو الذي يشار إليه ويُعرف باسم "ICD-11". يأخذ ICD-11 MMS شكل تسلسل هرمي يتكون من عشرات الآلاف من الكيانات. يمكن أن تكون الكيانات فصولاً أو كتلاً أو فئات. الفصل هو كيان المستوى الأعلى من التسلسل الهرمي؛ يحتوي MMS على 28 فصلاً أدرجت أدناه. تم استخدام الكتلة لتجميع الفئات أو الكتل ذات الصلة معاً. يمكن أن تكون الفئة أي شيء متعلق بالرعاية الصحية. تحتوي كل فئة على رمز فريد أبجدي رقمي يسمى رمز ICD-11، أو رمز ICD فقط. لا تحتوي الفصول والكتل أبداً على رموز ICD-11، وبالتالي لا يمكن تشخيصها. رمز ICD-11 ليس هو نفسه معرف الكيان.

الفصول في ICD-11

- 1- 1H0Z1 – A00 أمراض معدية أو طفيلية معينة
- 2- 2F9Z2 – A00 الأورام
- 3- 3C0Z3 – A00 أمراض الدم أو الأعضاء المكونة للدم
- 4- 4B4Z4 – A00 أمراض الجهاز المناعي
- 5- 5D465 – A00 أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي
- 6- 6E8Z6 – A00 الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية
- 7- 7B2Z7 – A00 اضطرابات النوم واليقظة
- 8- 8E7Z8 – A00 أمراض الجهاز العصبي
- 9- 9E1Z9 – A00 أمراض الجهاز البصري
- 10- AA00 – AC0Z – A00 أمراض الأذن أو الخشاء
- 11- BA00 – BE2Z – A00 أمراض جهاز الدوران
- 12- CA00 – CB7Z – A00 أمراض الجهاز التنفسي
- 13- DA00 – DE2Z – A00 أمراض الجهاز الهضمي

EA00 – EM0Z	أمراض الجلد	-14
FA00 – FC0Z	أمراض الجهاز العضلي الهيكلي أو النسيج الضام	-15
GA00 – GC8Z	أمراض الجهاز البولي التناسلي	-16
HA00 – HA8Z	حالات متعلقة بالصحة الجنسية	-17
JA00 – JB6Z	الحمل أو الولادة أو النفاس	-18
KA00 – KD5Z	ظروف معينة تنشأ في فترة ما حول الولادة	-19
LA00 – LD9Z	التشوهات التنموية	-20
MA00 – MH2Y	الأعراض والعلامات أو النتائج السريرية غير المصنفة في مكان آخر	-21
NA00 – NF2Z	إصابة أو تسمم أو عواقب أخرى معينة لأسباب خارجية	-22
PA00 – PL2Z	الأسباب الخارجية للمرض أو الوفيات	-23
QA00 – QF4Z	العوامل التي تؤثر على الحالة الصحية أو الاتصال بالخدمات الصحية	-24
RA00 – RA26	رموز لأغراض خاصة	-25
SA00 – SJ3Z	الفصل التكميلي حالات الطب التقليدي - الوحدة الأولى	-26
VA00 – VC50	الفصل التكميلي لتقييم الأداء	-27
X... – X...	رموز التوسيع	-28

يحتوي ICD-11 MMS أيضاً على فئات متبقية أو عقد متبقية. هذه هي الفئات "الأخرى المحددة" و "غير المحددة"، وهي فئات متنوعة يمكن استخدامها لترميز الحالات التي لا تتناسب مع أي من كيانات MMS الأكثر تحديداً. في متصفح ICD-11، يتم عرض العقد المتبقية بلون كستنائي. الفئات المتبقية ليست مضمنة في الأساس، وبالتالي فهي الفئات الوحيدة التي تحتوي على معرفات كيانات مشتقة: معرفاتهم هي نفسها العقد الأصلية، مع وضع علامة " / MMS /" محددة أخرى " أو " / MMS /" غير محددة " في النهاية. تنتهي رموز ICD الخاصة بهم دائماً بـ Y للفئات "المحددة الأخرى"، أو Z للفئات "غير المحددة" على عكس رموز ICD-10، لا تحتوي رموز ICD-11 MMS مطلقاً على الأحرف I أو O، وذلك لمنع الخلط مع الرقمين 1 و 0.

التغييرات

يوجد أدناه ملخص للتغييرات الملحوظة في ICD-11 مقارنة مع ICD-11:

يحتوي ICD-11 خمسة فصول جديدة. حيث قُسم الفصل الثالث من التصنيف الدولي للأمراض العاشر، "أمراض الدم والأعضاء المكونة للدم وبعض الاضطرابات التي تنطوي على آلية المناعة"، إلى قسمين: "أمراض الدم أو الأعضاء المكونة للدم" (الفصل 3) و "أمراض الجهاز المناعي" (الفصل 4). الفصول الجديدة الأخرى هي "اضطرابات النوم واليقظة" (الفصل 7)، "الحالات المتعلقة بالصحة الجنسية" (الفصل 17)، "الفصل التكميلي، حالات الطب التقليدي - الوحدة الأولى" (الفصل 26).

الاضطرابات العقلية:

نظرة عامة

تمت إضافة الاضطرابات العقلية التالية حديثاً إلى ICD-11، والتي ضُمّت بالفعل في النموذج الأمريكي ICD-10-CM:

- اضطراب الشراهة عند الأكل
- اضطراب ثنائي القطب II
- اضطراب تشوه صورة الجسد
- اضطراب كشط الجلد
- اضطراب التحرش
- اضطراب الاكتناز
- الاضطراب الانفجاري المتقطع

كما تم إضافة الاضطرابات النفسية التالية حديثاً إلى ICD-11، ولم تدرج في النموذج الأمريكي ICD-10-CM:

- اضطراب تناول الطعام التجنبي/المقيد
- الانزعاج من الكمال الجسدي
- كاتاتونيا

■ اضطراب ما بعد الكرب المعقد

■ اضطراب اللعب

■ الاضطراب المرجعي الشبي

■ اضطراب الفجيلة المديد

تشمل التغييرات الملحوظة الأخرى:

■ تم اختصار اضطرابات الشخصية في تشخيص واحد لاضطراب الشخصية، باستخدام نموذج الأبعاد (على عكس الفئوية)؛ راجع قسم اضطرابات الشخصية.

■ تمت إزالة جميع الأنواع الفرعية من الفصام على سبيل المثال؛ الاضطهادي، غير منظم، كاتاتوني. بدلاً من ذلك، استخدم نموذج متعدد الأبعاد مع فئة للمظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية، مما يسمح للترميز بالأعراض الإيجابية، الأعراض السلبية، الأعراض الاكتئابية، الأعراض الهوسية، والأعراض النفسية الحركية، والأعراض المعرفية.

■ تم حذف الاضطرابات المزاجية المستمرة، والتي تتكون من اضطراب المزاج الدوري، وعسر المزاج.

■ يميز ICD-10 بين اضطرابات القلق الرهابية، مثل رهاب الساح، واضطرابات القلق الأخرى، مثل اضطراب القلق العام، في حين يدمج ICD-11 كلا المجموعتين معاً تحت مسمى اضطرابات القلق أو ذات الصلة بالخوف.

■ تم دمج جميع اضطرابات النمو الشاملة في فئة واحدة، اضطراب طيف التوحد، باستثناء متلازمة ريت، والتي تم نقلها إلى فصل التشوهات النمائية.

■ أعيدت تسمية اضطرابات فرط الحركة باسم اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، ويتم التمييز في الأنواع الفرعية بين النوع المهيمن نقص الانتباه، النوع المهيمن فرط الحركة – الاندفاعية، والنوع المشترك، كما أزيل اضطراب السلوك الحركي.

■ تم نقل تفاعل الكرب الحاد من فصل الاضطرابات العقلية، ووضعه في فصل "العوامل التي تؤثر على الحالة الصحية أو الاتصال بالخدمات الصحية" وهكذا، في ICD-11، لم يعد تفاعل الكرب الحاد اضطراباً عقلياً.

اضطرابات الشخصية

تم تنقيح قسم اضطرابات الشخصية بالكامل؛ حيث دمجت جميع الأنماط في نوع واحد سمي اضطراب الشخصية، والذي يمكن تمييزه على أنه خفيف أو متوسط أو شديد أو الشدة غير محددة. هناك أيضاً فئة إضافية تسمى عسر الشخصية، والتي يمكن استخدامها لوصف سمات الشخصية التي تنطوي على مشاكل، ولكنها لا ترتقي لتصل مستوى الاضطراب في الشخصية. بمجرد تحديد اضطراب الشخصية أو عسر الشخصية، يمكن وصفها بوحدة أو أكثر من سمات الشخصية البارزة.

يستخدم ICD-11 ستة مجالات لوصف الشخصية:

- الوجدان السلبي
- الانفصال
- اللااجتماعية
- التحلل
- الوسواسية
- النمط الحدي

لعل أشيع نوعين من أنواع الاضطراب في الشخصية التي كان يجري استخدامها من التصنيف العاشر هما: اضطراب الشخصية اللا مستقرة عاطفياً، النمط الحدي واضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، ولكن في الحقيقة فقد وجد تراكم كبير في سمات الشخصية، كما أن الأشخاص الذين لديهم اضطراب شديد في الشخصية، غالباً ما يوجد لديهم سمات من أنماط مختلفة من اضطرابات الشخصية. ولا زال هناك جدل كبير بشأن هذا النموذج الجديد عديد الأبعاد، حيث يعتقد الكثيرون أنه لا ينبغي التخلي عن التشخيص القاطع؛ وعلى وجه الخصوص، كان هناك خلاف حول حالة اضطراب الشخصية الحدية.

يشبه نموذج DSM-5 البديل لاضطرابات الشخصية (AMPD) الموجود في آخر الدليل التشخيصي الخامس نظام اضطرابات الشخصية العائد لـ ICD-11، على الرغم من أنه أكبر بكثير وأكثر شمولاً. وقد نُظر في إدراجه في ICD-11، لكن منظمة الصحة العالمية قررت عدم استخدامه لأنه كان يعتبر "معقداً جداً ليتم تطبيقه في معظم البيئات السريرية حول العالم"، نظراً لأن الهدف الواضح لمنظمة الصحة العالمية هو تطوير طريقة بسيطة وفعالة يمكن استخدامها أيضاً في الأماكن منخفضة الموارد.

اضطراب اللعب

تم إضافة اضطراب اللعب حديثاً إلى ICD-11، ووضع في مجموعة الاضطرابات الناتجة عن السلوكيات الإدمانية، جنباً إلى جنب مع اضطراب المقامرة، الذي كان يسمى المقامرة الباثولوجية في التصنيف الدولي للأمراض العاشر. بالإضافة إلى اضطراب اللعب، يوجد في ICD-11 أيضاً ما يسمى باللعب الخطر، وهي فئة إضافية يمكن استخدامها لتحديد اللعب الذي ينطوي على مشاكل لا ترقى إلى مستوى الاضطراب.

يوجد في DSM-5 فئة مشابهة تسمى اضطراب اللعب عبر الإنترنت؛ ومع ذلك، وبسبب الجدل حول تعريفه وإدراجه، فإنه لم يتم تضمينه في الجزء الرئيسي من التشخيصات العقلية، ولكن في الفصل الإضافي "حالات لمزيد من الدراسة". تهدف الاضطرابات في هذا الفصل إلى تشجيع البحث ولا يُقصد تشخيصها رسمياً.

الاحتراق

على عكس الفكرة السائدة، فالاحتراق موجود أيضاً في ICD-10، وإن كان ذلك بتعريف قصير من جملة واحدة فقط. يتميز ICD-11 بشرح أطول، يشير على وجه التحديد إلى أنه يجب استخدام الفئة فقط في السياق المهني. علاوة على ذلك، يجب تطبيقه فقط عند استبعاد اضطرابات المزاج، والاضطرابات المرتبطة تحديداً بالكرب، والقلق أو الاضطرابات ذات الصلة بالخوف.

كما هو الحال مع الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض، فإن الاحتراق لم يدرج في فصل الاضطرابات العقلية، ولكن في فصل "العوامل التي تؤثر على الحالة الصحية أو الاتصال بالخدمات الصحية". وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن ICD-11 لا يعرف الاحتراق بأنه اضطراب عقلي أو مرض، ولكن كظاهرة مهنية تقوض عافية الشخص في مكان العمل.

الحالات المتعلقة بالصحة الجنسية

تعتبر الحالات المتعلقة بالصحة الجنسية فصلاً جديداً في ICD-11. قررت منظمة الصحة العالمية وضع الاضطرابات الجنسية في فصل منفصل لأن انقسام العقل / الجسم هو مفهوم عفا عليه الزمن. حيث استند عدد من فئات التصنيف الدولي للأمراض العاشر، بما في ذلك الاضطرابات الجنسية، إلى ثنائية العقل – الجسد (تعود مسألة العقل والجسد في صيغتها المعروفة اليوم لديكارت)، أي الفصل بين الحالات العضوية (الجسدية) وغير العضوية (العقلية). على هذا النحو، تم تضمين الاختلالات

الجنسية التي كانت تعتبر غير عضوية في فصل الاضطرابات العقلية، في حين أن تلك التي كانت تعتبر عضوية تم إدراجها في الغالب في الفصل الخاص بأمراض الجهاز البولي التناسلي. في ICD-11، يُنظر إلى الدماغ والجسم على أنهما وحدة متكاملة، حيث نُظر إلى الاختلالات الجنسية على أنها تنطوي على تفاعل بين العوامل الجسدية والنفسية، وهكذا، تم إلغاء التمييز العضوي / غير العضوي.

الاختلالات الجنسية

وجدت في ICD-10 ثلاث فئات رئيسية حول الاختلالات الجنسية:

- تدني أو فقدان الرغبة الجنسية
- النفور الجنسي وقلة التمتع الجنسي
- فشل استجابة الأعضاء التناسلية

يستبدل ICD-11 هذه الاضطرابات بفئتين رئيسيتين:

- تدني الرغبة الجنسية
- خلل الاستثارة الجنسية.

كما يحتوي ICD-10 على فئات:

- التشنج المهبلي
- التشنج المهبلي اللا عضوي
- عسر الجماع
- عسر الجماع اللاعضوي

ونظراً لتوجه منظمة الصحة العالمية للابتعاد عن "الانقسام القديم للعقل / الجسم" المذكور أعلاه، فقد دمجت الاضطرابات العضوية وغير العضوية. وتم إعادة تصنيف التشنج المهبلي على أنه ألم الإيلاج الجنسي، وتم الاحتفاظ بعسر الجماع ، كما أن حالة ألم الفرج التي وجدت في ICD-9، وليس في ICD-10. تمت إضافتها إلى ICD-11.

اضطراب السلوك الجنسي القهري

تم إعادة تصنيف الدافع الجنسي المفرط من ICD-10 على أنه اضطراب السلوك الجنسي القهري، وأدرج ضمن اضطرابات التحكم في الدافع. يُشار إلى أن زيادة الدافع الجنسي ليس بالضرورة اضطراباً، طالما أن هؤلاء الأشخاص لا يظهرون ضعفاً في السيطرة على سلوكهم، أو ضائقة كبيرة، أو ضعفاً في الأداء.

اضطرابات الولوج الجنسي

ظلت اضطرابات الولوج الجنسي، المسماة اضطرابات التفضيل الجنسي في ICD-10، في فصل الاضطرابات العقلية، على الرغم من وجود إشارة إليها في فصل الصحة الجنسية. أما الفئات التي كانت مدرجة في ICD-10 وهي: الفيتيشية ولبس ملابس الجنس الآخر فقد أزيلت من ICD-11، لأنها إن لم تسبب الضيق أو الأذى، فإنها لا تعتبر من الاضطرابات النفسية. وتم إضافة اضطراب التحرش حديثاً.

لا توافق الجندر

التحول الجندري والانزعاج الجندري، سميت لا توافق الجندر في ICD-11. كانت اضطرابات الهوية الجندرية في ICD-10، تتكون من ثلاثة اضطرابات رئيسية هي:

- التحول الجنسي،
- لبس ملابس الجنس الآخر
- اضطراب هوية الجندر عند الأطفال

في ICD-11، تم حذف لبس ملابس الجنس الآخر، وتمت إعادة تسمية التحول الجنسي بلا توافق الجندر في مرحلة المراهقة أو البلوغ، وتمت إعادة تسمية اضطراب هوية الجندر عند الأطفال بلا توافق الجندر عند الأطفال.

كما أن الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض، قد وضع اضطرابات هوية الجندر في فصل الاضطرابات العقلية، وفقاً لما كان معتاداً في ذلك الوقت. ولكن هذه الفكرة غدت موضع تحدٍ متزايد، حيث اعتقد البعض أن فكرة اعتبار التحول الجنسي كاضطراب عقلي ستحيطه بوصمة عار. واقترح أن الضيق والخلل الوظيفي بين الأشخاص المتحولين جنسياً يجب أن يُنظر إليه بشكل أكثر ملاءمة على أنه نتيجة للرفض الاجتماعي والتمييز والعنف (الجنسي) تجاه الأفراد ذوي المظهر والسلوك المختلف من ناحية الجندر. وقد ظهر أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية، لكن

الخدمات الصحية الموجهة لهم غالباً ما تكون غير كافية أو غير موجودة. ونظراً لأن رمز التصنيف الدولي للأمراض مطلوب عادةً للوصول إلى العلاج وسداد تكاليفه، فقد وجدت منظمة الصحة العالمية أنه من غير المستحسن إزالة التحول في الجندر من ICD-11 تماماً. لذلك تقرر نقل المفهوم من فصل الاضطرابات العقلية إلى فصل الصحة الجنسية الجديد.

الطب التقليدي

"الفصل التكميلي حالات الطب التقليدي - الوحدة الأولى" هو فصل إضافي في ICD-11. وهو يتألف من مفاهيم يشار إليها عادة باسم الطب الصيني التقليدي (TCM)، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تفضل استخدام مصطلح أكثر عمومية وحيادية وهو الطب التقليدي (TM). وقد جاءت العديد من العلاجات والأدوية التقليدية من الصين أصلاً، وإن كان لها أيضاً تاريخ طويل من الاستخدام والتطوير في اليابان وكوريا وفيتنام.

في الواقع، تم استخدام الطب التقليدي في جميع أنحاء العالم لعقود، إن لم يكن لقرون، وهو جزء لا يتجزأ من الخدمات الصحية المقدمة في العديد من البلدان.

تم انتقاد قرار تضمين الطب التقليدي في ICD-11، لما يُزعم بأنه علم زائف، على من الاعتراف بأن بعض تقنيات وأعشاب الطب التقليدي قد أظهرت فعالية أو إمكانات علاجية، لكن البعض الآخر لا طائل من ورائه، أو حتى ضار تماماً. حيث قيل بأن إدراج هذا الفصل يتعارض مع الأساليب العلمية القائمة على الأدلة التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية عادةً. وقد وجهت أصابع الاتهام بمحاباة حكومة الصين مما دفع منظمة الصحة العالمية لإدراج الطب الصيني التقليدي، وهو سوق عالمي بمليارات الدولارات تلعب فيه الصين دوراً رائداً. لكن منظمة الصحة العالمية قد صرحت بأن إدراج فصل حالات الطب التقليدي لا يؤيد أي شكل من أشكال العلاج، وأن إدراجها مخصص في المقام الأول للأغراض الإحصائية.

تغييرات أخرى

تشمل التغييرات الملحوظة الأخرى في ICD-11 ما يلي:

تصنف السكتة الدماغية الآن على أنها اضطراب عصبي بدلاً من كونها مرض وعائي.

يتم الآن ترميز الحساسية تحت أمراض الجهاز المناعي.

في الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض، تم التمييز بين اضطرابات النوم المدرجة في فصل

أمراض الجهاز العصبي، واضطرابات النوم غير العضوية المدرجة في فصل الاضطرابات العقلية، في الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، دمجا معاً وتم وضعهم في فصل جديد يسمى اضطرابات النوم واليقظة.

"الفصل التكميلي لتقييم الأداء" هو فصل إضافي يوفر رموزاً للاستخدام في جدول تقييم الإعاقة لمنظمة الصحة العالمية (WHODAS 2.0)، واستقصاء الإعاقة النموذجي (MDS)، و ICF.

حقائق عن ICD-11 :

- المعيار العالمي للبيانات الصحية والتوثيق السريري والإحصائي
- له استخدامات متعددة، بما في ذلك الرعاية الأولية.
- محدّث علمياً ومصمم للاستخدام في عالم رقمي.
- أحدث التقنيات تقلل من تكاليف التدريب والتنفيذ.
- يسهل التصميم متعدد اللغات الاستخدام العالمي، بينما تسمح منصة الاقتراحات بمشاركة أصحاب الشأن في تحديث ICD-11.
- بدأت البلدان بالفعل في التحضير لتطبيق ICD-11، مع تواجد النسختين الإنجليزية والإسبانية على الإنترنت.

■

طريقة الاستعمال

إن أبسر وسيلة لاستعمال الطبعة العربية من ICD-11 هو العودة للفهرس في بداية المرجع، حيث يحتوي الفهرس على كافة الاضطرابات مع رموزها، وعند استعمال نسخة PDF فإن الضغط على الاضطراب المرغوب الوصول إليه في الفهرس، سيوصلك مباشرة إلى المعلومة المطلوبة.

التنسيق اللاحق

يسمح نظام التنسيق اللاحق بإضافة مزيد من التفاصيل إلى الكيان المختار. يمكن إضافة أنواع مختلفة من المعلومات إلى عناصر مختلفة. عندما يظهر مصطلح التنسيق اللاحق في إحدى الفئات، فإن حقل التنسيق اللاحق سيعرض فقط محاور التنسيق اللاحق المحتملة التي تنطبق على هذا الكيان. تحتوي بعض الفئات على معلومات غير مكتملة لأغراض متعددة من التصنيف الدولي للأمراض. في مثل هذه الحالات، تشير الملاحظة (رّمز أيضاً) إلى ضرورة إضافة المعلومات لهذا المحور.

عرض / البحث عن مجموعات القيم

يمكن لبعض محاور التنسيق اللاحق الحصول على قيم من مجموعة أصغر من القيم المحتملة، بينما يمكن لبعض المحاور الحصول على قيم من مجموعة قيم كبيرة إلى حد ما. إذا كانت مجموعة القيم صغيرة، فسيعرض المتصفح جميع القيم الممكنة مع أكوادها. إذا كانت مجموعة القيم كبيرة، يمكنك البحث في مجموعات القيم عن طريق العودة للبحث في مستعرض ICD-11، سيقوم المستعرض بالبحث فقط عن قيم هذا المحور. ويسمح النظام بقيمة واحدة لكل محور لمعظم محاور التنسيق اللاحق. على سبيل المثال، عند التنسيق اللاحق مع "الخطورة"، لا يمكنك اختيار القيمة "معتدل" و "شديد" في نفس الوقت. ومع ذلك، بالنسبة إلى محاور معينة، يسمح النظام بتوفير قيم متعددة.

المحاور التي تسمح بقيم متعددة مذكورة أدناه:

ذو صلة بالاضطراب، أسباب محددة، له مظهر، تشريح محدد، عوامل معدية، عوامل كيميائية، دواء.

بالنسبة إلى هذه المحاور، يمكنك تقديم أكثر من قيمة واحدة.

الاضطرابات العقلية، السلوكية، أو اضطرابات النماء العصبية 06

الوصف:

الاضطرابات العقلية، السلوكية، أو اضطرابات النماء العصبية: هي متلازمات تتميز باختلال سريري ملحوظ في إدراك الفرد، أو التنظيم العاطفي، أو السلوك، مما يعكس خللاً في العمليات النفسية أو البيولوجية أو النمائية التي تكمن وراء الأداء العقلي والسلوكي. وعادة ما ترتبط هذه الاضطرابات بالضائقة أو التدهور في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من المجالات المهمة..

الاستثناءات:

- تفاعل الكرب الحاد (QE84)

- الفجيرة غير المعقدة (QE62)

مضمنة في مكان آخر:

- اضطرابات النوم واليقظة (7A00-7B2Z)

- الاختلالات الجنسية (HA00-HA0Z)

- عدم التوافق الجندي (HA60-HA6Z)

اضطرابات النمء العصبية

الوصف:

اضطرابات النمء العصبية: هي اضطرابات سلوكية أو معرفية تنشأ خلال فترة النمو، وتتضمن صعوبات ملحوظة في اكتساب وتنفيذ مهام ذهنية أو حركية أو اجتماعية معينة. وبرغم أن الخلل السلوكي أو المعرفي يوجد في العديد من الاضطرابات العقلية أو السلوكية التي تحدث خلال فترة النمو (الفُصام، ثنائي القطب على سبيل المثال)، فقد أدرجت في هذه المجموعة الاضطرابات التي يشكل جوهرها الخلل العصبي النمائي فقط. المسببات المفترضة لاضطرابات النمو العصبي معقد، وفي كثير من الحالات الفردية غير معروفة.

مضمنة في مكان آخر:

- العرات الأولية أو اضطراب العرة (8A05.0)
- متلازمة النمو العصبي الثانوية (6E60)

اضطرابات النمء الذهني 6A00

الوصف:

اضطرابات النمء الذهني هي مجموعة من الحالات المتنوعة من ناحية المنشأ المرضي، والتي تظهر خلال فترة النمو وتتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من المعدل الوسطي، والذي يكون تقريباً أقل بانحرافين قياسيين أو أكثر عن المتوسط (تقريباً أقل بما يساوي 2.3 في المئين)، وذلك استناداً إلى الاختبارات المعيارية المناسبة والمطبقة بشكل فردي. عندما لا تتوفر الاختبارات المعيارية والموحدة، سيتطلب تشخيص اضطرابات النمء الذهني اعتماداً أكبر على الحكم السريري بناءً على التقييم المناسب للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة.

ملاحظة للترميز:

استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك، لتحديد أي مسببات معروفة.

اضطراب النمء الذهني، خفيف 6A00.0

الوصف:

اضطراب النمء الذهني الخفيف هو حالة تظهر خلال فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من المعدل الوسطي، والذي يكون تقريباً أقل بانحرافين قياسيين أو ثلاثة عن المتوسط (تقريباً 0.1 – 2.3 في المئين)، وذلك استناداً إلى الاختبارات المعيارية المناسبة والمطبقة بشكل فردي، أو للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما لا تتوفر الاختبارات المعيارية والموحدة. غالباً ما يواجه الأشخاص المتأثرون صعوبة في اكتساب وفهم المفاهيم اللغوية المعقدة والمهارات الأكاديمية. سيُجيد معظمهم الرعاية الذاتية الأساسية والأنشطة المنزلية والعملية. يمكن عموماً للأشخاص المتأثرين باضطراب خفيف في النمء الذهني تحقيق حياة وعمل مستقر نسبياً كبالغين، ولكن قد يحتاجون إلى

اضطراب النماء الذهني، معتدل 6A00.1

الوصف:

اضطراب النماء الذهني المعتدل هو حالة تظهر خلال فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من المعدل الوسطي، والذي يكون تقريباً أقل بثلاثة أو أربعة انحرافات قياسية عن المتوسط (تقريباً 0.003 – 0.1 في المئين)، وذلك استناداً إلى الاختبارات المعيارية المناسبة والمطبقة بشكل فردي، أو للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما لا تتوفر الاختبارات المعيارية والموحدة. تتنوع لغة وقدرة اكتساب المهارات الأكاديمية عند الأشخاص المتأثرين باضطراب النماء الذهني المعتدل ولكنها تتحدد عموماً بالمهارات الأساسية. قد يجيد بعضهم الرعاية الذاتية الأساسية والأنشطة المنزلية والعملية. يحتاج معظم الأشخاص المتأثرين باضطراب معتدل في النماء الذهني إلى دعم كبير ومستمر لتحقيق حياة ووظيفة مستقلة كبالغين.

اضطراب النماء الذهني، شديد 6A00.2

الوصف:

اضطراب النماء الذهني الشديد هو حالة تظهر خلال فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من المعدل الوسطي، والذي يكون تقريباً أقل بأربعة انحرافات قياسية أو أكثر عن المتوسط (تقريباً أقل 0.003 في المئين)، وذلك استناداً إلى الاختبارات المعيارية المناسبة والمطبقة بشكل فردي، أو للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما لا تتوفر الاختبارات المعيارية والموحدة. يظهر عند الأشخاص المتأثرين باضطراب النماء الذهني الشديد تحديداً شديداً في اللغة والقدرة على اكتساب المهارات الأكاديمية. وقد يعانون أيضاً من إعاقات حركية وعادة ما يحتاجون إلى دعم يومي في بيئة خاضعة للإشراف للحصول على رعاية كافية، ولكنهم قد يكتسبون مهارات الرعاية الذاتية الأساسية من

خلال التدريب المكثف. يتم التمييز بين الاضطرابات الشديدة والعميقة في النمء الذهني حصراً على أساس الاختلافات السلوكية التكيفية، لأن الاختبارات المعيارية الحالية للذكاء لا يمكنها التمييز بشكل موثوق أو صحيح بين الأفراد الذين لديهم وظائف ذهنية أقل من 0.003 في المئين.

اضطراب النمء الذهني، عميق 6A00.3

الوصف:

اضطراب النمء الذهني العميق هو حالة تظهر خلال فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من المعدل الوسطي، والذي يكون تقريباً أقل بأربعة انحرافات قياسية أو أكثر عن المتوسط (تقريباً أقل 0.003 في المئين)، وذلك استناداً إلى الاختبارات المعيارية المناسبة والمطبقة بشكل فردي، أو للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما لا تتوفر الاختبارات المعيارية والموحدة. يملك الأشخاص المتأثرين باضطراب النمء الذهني العميق قدرات محددة جداً في التواصل، وتحدد القدرة على اكتساب المهارات الأكاديمية بالمهارات الغير مجردة. وقد يعانون أيضاً من إعاقات حركية وحسية ونموذجياً يحتاجون إلى دعم يومي في بيئة خاضعة للإشراف للحصول على رعاية كافية. يتم التمييز بين الاضطرابات الشديدة والعميقة في النمء الذهني على أساس الاختلافات السلوكية التكيفية حصراً، لأن الاختبارات المعيارية الحالية للذكاء لا يمكنها التمييز بشكل موثوق أو صحيح بين الأفراد الذين لديهم وظائف ذهنية أقل من 0.003 في المئين.

اضطراب النمء الذهني، مرحلي 6A00.4

الوصف:

يتم تعيين اضطراب النمء الذهني المرحلي عندما يكون هناك دليل على وجود اضطراب في النمو الذهني ولكن الفرد يكون رضيعاً أو طفلاً دون سن الرابعة، أو لا يمكن إجراء تقييم صحيح للأداء الذهني والسلوك التكيفي بسبب أو الإعاقات الجسدية أو الحسية (على سبيل المثال، العمى، الصمم قبل اكتساب اللغة)، الإعاقة الحركية، السلوكيات الإشكالية الحادة أو الاضطرابات العقلية والسلوكية المصاحبة.

اضطرابات النمء الذهني، غير محددة 6A00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة " .

اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية 6A01

الوصف:

تنشأ اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية خلال فترة النمو، وتتميز بمصاعب في فهم أو إنتاج الكلام واللغة أو عند استخدام اللغة ضمن سياقٍ معين بغرض التواصل، بما يقع خارج حدود الاختلاف الطبيعي المتوقع بالنسبة للعمر ومستوى الأداء الذهني. لا تُعزى مشاكل الكلام واللغة التي لوحظت إلى عوامل اجتماعية أو ثقافية (على سبيل المثال، اللهجات الإقليمية) ولا تفسر بالكامل بالشذوذ التشريحي أو العصبي. المسببات المفترضة لاضطرابات الكلام أو اللغة النمائية معقدة، وفي كثير من الحالات الفردية غير معروفة.

اضطراب صوت الكلام النمائي 6A01.0

الوصف:

يتسم اضطراب صوت الكلام النمائي بصعوبات في اكتساب وإنتاج وإدراك الكلام مما ينتج عنه أخطاء في النطق، سواء في العدد أو أنواع أخطاء الكلام التي تحدث أو في الجودة الشاملة لإنتاج الكلام، والتي تقع خارج حدود الاختلاف الطبيعي المتوقع بالنسبة للعمر ومستوى الأداء الذهني مما يؤدي إلى تقليل الوضوح ويؤثر بشكل كبير على التواصل. تنشأ الأخطاء في النطق خلال فترة النمو المبكرة ولا يمكن تفسيرها بالتغيرات الاجتماعية والثقافية وغيرها من الاختلافات البيئية (على سبيل المثال، اللهجات الإقليمية). لا يتم تفسير أخطاء الكلام بشكل كامل بنقص السمع أو خلل بنيوي أو عصبي.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب نطق الكلام الوظيفي

استثناءات:

- الصمم غير المحدد (AB52)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)
- رُتَّة (عُسْرُ التَّلَفُّظ) (MA80.2)

اضطراب طلاقة الكلام النمائي 6A01.1

الوصف:

يتسم اضطراب طلاقة الكلام النمائي بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في التدفق الإيقاعي للكلام والذي ينشأ خلال فترة النمو ويقع خارج حدود الاختلاف الطبيعي المتوقع بالنسبة للعمر ومستوى الأداء الذهني مما يؤدي إلى تقليل الوضوح ويؤثر بشكل كبير على التواصل. يمكن أن ينطوي على تكرار الأصوات، والمقاطع أو الكلمات، والإطالة، وفواصل الكلمات، وتعطل إنتاج الكلام، والاستخدام المفرط للكلمات المُقحمة، والانفجارات السريعة القصيرة للكلام.

استثناءات:

- اضطرابات العرة (A058)

اضطراب اللغة النمائي 6A01.2

الوصف:

يتسم اضطراب اللغة النمائي بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو فهم أو إنتاج اللغة (المنطوقة أو لغة الإشارة) والذي ينشأ خلال فترة النمو، بشكلٍ نموذجي خلال الطفولة المبكرة، مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل. إن قدرة الفرد على فهم أو إنتاج أو استخدام اللغة أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني. لا يفسر العجز اللغوي باضطراب عصبي تطوري آخر أو ضعف حسي أو حالة عصبية، بما في ذلك آثار أذية الدماغ أو الانتان. الاستثناءات طفرة انتقائية

استثناءات:

- اضطراب طيف التوحد (6A02)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)
- الصمم غير المحدد (AB52)
- الصمت الانتقائي (6B06)

اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة الاستقبالية والتعبيرية 6A01.20

الوصف:

يتسم اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة الاستقبالية والتعبيرية بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو فهم أو إنتاج اللغة، والذي ينشأ خلال فترة النمو، بشكلٍ نموذجي خلال الطفولة المبكرة، مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل. إن قدرة الفرد على فهم اللغة المنطوقة ولغة

الإشارة (اللغة الاستقبالية) أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني، كما تترافق بتدنٍ ملحوظ في القدرة على انتاج أو استخدام اللغة المنطوقة أو لغة الإشارة (اللغة التعبيرية).

مُشْتَمَلَات:

- الحبسة النمائية أو تعذر النطق، النمط الاستقبالي
- حبسة فيرنكة التطورية

استثناءات:

- حبسة مكتسبة مع الصرع (8A62.2) [Landau-Kleffner]
- اضطراب طيف التوحد (6A02)
- الصمت الانتقائي (6B06)
- الحبسة غير المحددة (MA80.1)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)
- الصمم غير المحدد (AB52)

اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة التعبيرية خصوصاً 6A01.21

الوصف:

يتسم اضطراب اللغة النمائي مع ضعف في اللغة التعبيرية خصوصاً بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو انتاج أو استخدام اللغة، والذي ينشأ خلال فترة النمو، بشكلٍ نموذجي خلال الطفولة المبكرة، مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل. إن قدرة الفرد على انتاج أو استخدام اللغة المنطوقة أو لغة الإشارة (اللغة التعبيرية) أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني، لكن القدرة على فهم اللغة المنطوقة أو لغة الإشارة (اللغة الاستقبالية) سليم نسبياً.

مُشتمَلات:

- الحبسة النمائية أو تعذر النطق، النمط التعبيري

استثناءات:

- حبسة مكتسبة مع الصرع (8A62.2) [Landau-Kleffner]
- الصمت الانتقائي (6B06)
- الحبسة أو تعذر النطق، التطورية، النمط الاستقبالي (6A01.20)
- الحبسة غير المحددة (MA80.1)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)
- الصمم غير المحدد (AB52)

اضطراب اللغة النمائي مع ضعفٍ في اللغة العملية خصوصاً 6A01.22

الوصف:

يتسم اضطراب اللغة النمائي مع ضعفٍ في اللغة العملية خصوصاً بخلل مستمر ملحوظ في فهم أو استخدام اللغة في السياقات الاجتماعية، على سبيل المثال الوصول للاستنتاجات، وفهم الدعابة اللفظية، وحل المعنى المبهم. ينشأ الاضطراب خلال فترة النمو، بشكلٍ نموذجي خلال الطفولة المبكرة، مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل. إن القدرات اللغوية العملية أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني، ولكن المكونات الأخرى للغة الاستقبالية والتعبيرية سليمة نسبياً. لا ينبغي استخدام هذا الوصف فسر ضعف اللغة العملي بشكلٍ أفضل باضطراب طيف التوحد أو من خلال ضعف المكونات الأخرى للغة الاستقبالية أو التعبيرية.

استثناءات:

- الصمت الانتقائي (6B06)
- اضطراب طيف التوحد (6A02)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)

اضطراب اللغة النمائي مع ضعفٍ محدد في اللغة 6A01.23

الوصف:

يتسم اضطراب اللغة النمائي مع ضعفٍ محددٍ في اللغة بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو فهم أو انتاج واستعمال اللغة، والذي ينشأ خلال فترة النمو، مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل. لا يتم تسجيل نمط الخلل المحدد في القدرات اللغوية بشكل كافٍ ضمن أي من فئات اضطرابات اللغة النمائية الأخرى.

استثناءات:

- الصمت الانتقائي (6B06)
- اضطراب طيف التوحد (6A02)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)
- اضطرابات النمء الذهني (6A00)

اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية المحددة الأخرى 6A01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب كلام أولغة تطوري غير محدد 6A01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب طيف التوحد 6A02

الوصف:

يتسم اضطراب طيف التوحد بالعجز المستمر في القدرة على بدء واستدامة التفاعل الاجتماعي المتبادل والتواصل الاجتماعي، وبمجموعة من أنماط السلوك والاهتمامات المحدودة والمتكررة وغير المرنة. يبدأ الاضطراب خلال فترة النمو، عادةً في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن قد لا تظهر الأعراض بشكل كامل حتى وقت متأخر، وذلك عندما تتجاوز المطالب الاجتماعية القدرات المحدودة. يكون العجز شديد بما يكفي لإحداث تدني في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من المجالات المهمة، وعادة ما تكون تسود تلك السمات أداء الفرد والذي يمكن ملاحظته في جميع السياقات، على الرغم من أنها قد تختلف وفقاً للسياقات الاجتماعية أو التعليمية أو غيرها. يظهر الأفراد على طول الطيف مجموعة كاملة من الوظائف الذهنية والقدرات اللغوية.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب التوحد
- تأخر النمو الشامل

استثناءات:

- اضطراب اللغة النمائية (6A01.2)
- الفصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية الأخرى (6A20-6A2Z)

اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة
الوظيفية 6A02.0

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد، ويوجد الأداء الذهني والسلوك التكيفي ضمن النطاق المتوسط على الأقل (أكبر تقريباً من 2.3 في المئين)، ولا يوجد سوى ضعف طفيف أو لا يوجد ضعف في قدرة الفرد على استخدام وظائف اللغة (المنطوقة أو لغة الإشارة) لأغراض مفيدة، كالتعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة
الوظيفية 6A02.1

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد واضطراب النماء الذهني، ولا يوجد سوى ضعف طفيف أو لا يوجد ضعف في قدرة الفرد على استخدام وظائف اللغة (المنطوقة أو لغة الإشارة) لأغراض مفيدة، كالتعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.2

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد، كما يوجد الأداء الذهني والسلوك التكيفي ضمن النطاق المتوسط على الأقل (أكبر تقريباً من 2.3 في المئين)، وهناك ضعف ملحوظ في اللغة الوظيفية (المنطوقة أو لغة الإشارة) بالنظر إلى عمر الفرد، مع عدم قدرة الفرد على استخدام أكثر من كلمات مفردة أو عبارات بسيطة لأغراض مفيدة، مثل التعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.3

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد واضطراب النماء الذهني، وهناك ضعف ملحوظ في اللغة الوظيفية (المنطوقة أو لغة الإشارة) بالنظر إلى عمر الفرد، مع عدم قدرة الفرد على استخدام أكثر من كلمات مفردة أو عبارات بسيطة لأغراض مفيدة، مثل التعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.4

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد، كما يوجد الأداء الذهني والسلوك التكيفي ضمن النطاق المتوسط على الأقل (أكبر تقريباً من 2.3 في المئين)، وهناك غياب كامل أو شبه كامل في قدرة الفرد على استخدام اللغة الوظيفية (المنطوقة أو لغة الإشارة) بالنظر إلى عمر الفرد، لأغراض مفيدة، مثل التعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.5

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب طيف التوحد واضطراب النماء الذهني، وهناك غياب كامل أو شبه كامل في قدرة الفرد على استخدام اللغة الوظيفية (المنطوقة أو لغة الإشارة) بالنظر إلى عمر الفرد، لأغراض مفيدة، مثل التعبير عن الاحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد محدد آخر 6A02.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب طيف التوحد غير محدد 6A02.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب التعلم النمائي 6A03

الوصف:

يتسم اضطراب التعلم النمائي بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية، والتي قد تشمل القراءة أو الكتابة أو الحساب. ينخفض أداء الفرد في المهارة / المهارات الأكاديمية المتأثرة بشكل ملحوظ عما هو متوقع للعمر الزمني والمستوى العام للأداء الذهني، وينتج عنه تدني كبير في الأداء الأكاديمي أو المهني للفرد. يظهر اضطراب التعلم النمائي عندما يتم تدريس المهارات الأكاديمية خلا

ل سني الدراسة المبكرة. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي إلى اضطراب في النمو الذهني، أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية أو لكرپ نفسي اجتماعي.

استثناءات:

- الاختلالات الرمزية (MB4B)

اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في القراءة 6A03.0

الوصف:

يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في القراءة بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية المتعلقة بالقراءة، مثل دقة قراءة الكلمات، وطلاقة القراءة، وفهم القراءة. أداء الفرد في القراءة أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى الأداء الفكري، وينتج عنه تدني ملحوظ في الأداء الأكاديمي أو المهني للفرد. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في القراءة إلى اضطراب في النمو الذهني، أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية أو لكرپ نفسي اجتماعي.

مُشتملات:

• عسر القراءة التطورية

استثناءات:

• اضطرابات النمو الذهني (6A00)

اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في التعبير المكتوب 6A03.1

الوصف:

يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في التعبير المكتوب بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية المتعلقة بالكتابة، مثل دقة الهجاء، ودقة القواعد وعلامات الترقيم، وتنظيم وترابط الأفكار في الكتابة. أداء الفرد في التعبير المكتوب أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى الأداء الفكري، وينتج عنه تدني ملحوظ في الأداء الأكاديمي أو المهني للفرد. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في التعبير المكتوب إلى اضطرابٍ في النمو الذهني، أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية أو لكربٍ نفسي اجتماعي.

استثناءات:

• اضطرابات النمو الذهني (6A00)

اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في الرياضيات 6A03.2

الوصف:

يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في الرياضيات بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية المتعلقة بالرياضيات أو الحساب، مثل فهم الأرقام، تذكر حقائق الأرقام، دقة الحساب، طلاقة الحساب، والمنطق الرياضي السليم. أداء الفرد في الرياضيات أو الحساب أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني أو النمائي ومستوى الأداء الفكري، وينتج عنه تدني ملحوظ في الأداء الأكاديمي أو المهني للفرد. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ في الرياضيات إلى اضطرابٍ في النمو الذهني، أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية أو لكربٍ نفسي اجتماعي.

استثناءات:

- اضطرابات النمو الذهني (6A00)

اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ محدد آخر في التعلم 6A03.3

الوصف:

يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف محدد آخر في التعلم بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية غير المتعلقة بالكتابة، أو القراءة أو الرياضيات. أداء الفرد في هذه المهارات الأكاديمية أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى الأداء الفكري، وينتج عنه تدني ملحوظ في الأداء الأكاديمي أو المهني للفرد. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي مع ضعفٍ محدد آخر في التعلم إلى اضطرابٍ في النمو الذهني، أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية أو لكربٍ نفسي اجتماعي.

استثناءات:

- اضطرابات النمو الذهني (6A00)

اضطراب التعلم التطوري، غير محدد 6A03.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

الوصف:

يتسم اضطراب التناسق الحركي النمائي بتأخر كبير في اكتساب المهارات الحركية الخشنة والناعمة، وضعف في تنفيذ المهارات الحركية المتناسقة والذي يتظاهر في الخرق أو البطء أو عدم الدقة في الأداء الحركي. المهارات الحركية المتناسقة تكون أدنى بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني للفرد ومستوى الأداء الفكري. تحدث صعوبات المهارات الحركية المتناسقة خلال فترة النمو وتظهر بشكل نموذجي منذ الطفولة المبكرة. تتسبب صعوبات المهارات الحركية المتناسقة في قيود كبيرة ومستمرة في الأداء الوظيفي (على سبيل المثال، أنشطة الحياة اليومية والعمل المدرسي والأنشطة المهنية والترفيهية). لا تُعزى الصعوبات المتعلقة بالمهارات الحركية المتناسقة لمجرد مرض في الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي الهيكلي أو الأنسجة الضامة، أو ضعف الحواس، ولا يشرح بشكل أفضل باضطراب في النماء الذهني.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب التناسق الفموي الوجهي الحركي

استثناءات:

- شذوذ في المشي والحركة (MB44)
- أمراض الجهاز العضلي الهيكلي أو النسيج الضام (FA00-FC0Z)
- أمراض الجهاز العصبي (8A00-8E7Z)

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة 6A05

الوصف:

يتسم اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة بنمط مستمر (6 أشهر على الأقل) من عدم الانتباه و / أو فرط الحركة - الاندفاعية، مع بدءٍ خلال فترة النمو، في زمن مبكر من الطفولة إلى منتصفها عادة. درجة عدم الانتباه وفرط الحركة - الاندفاعية تقع خارج حدود الاختلاف الطبيعي المتوقع للعمر ومستوى الأداء الذهني ويعرقل الاضطراب بشكل كبير الأداء الأكاديمي أو المهني أو الاجتماعي. يشير عدم الانتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على الانتباه متوجهاً إلى المهام التي لا توفر مستوى عالٍ من التحفيز أو المكافآت المتكررة، والتشتت، ومشاكل التنظيم. يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي المفرط وصعوبة البقاء ساكناً، وأشد ما يتجلى في المواقف المنظمة التي تتطلب ضبطاً ذاتياً للسلوك. الاندفاعية هي ميل للتصرف استجابة للمنبهات الآنية، دون مناقشة أو نظر في المخاطر والعواقب. يختلف التوازن النسبي والمظاهر المحددة لخصائص نقص الانتباه وفرط الحركة - الاندفاعية بين الأفراد، وقد يتغير خلال مسار النمو. من أجل تشخيص الاضطراب، يجب ملاحظة نمط السلوك بوضوح في أكثر من بيئة.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة
- متلازمة نقص الانتباه مع فرط الحركة

استثناءات:

- اضطراب طيف التوحد 6A02
- السلوك المشوش أو الاضطرابات غير الاجتماعية (6C90-6C9Z)

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المهيمن نقص الانتباه 6A05.0

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب نقص الانتباه فرط الحركة وتهيمن أعراض نقص الانتباه على التظاهر السريري. يشير عدم الانتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على الانتباه متوجهاً إلى المهام التي لا توفر مستوى عالٍ من التحفيز أو المكافآت المتكررة، والتشتت، ومشاكل التنظيم. قد توجد أيضاً بعض أعراض فرط الحركة - الاندفاعية، ولكنها ليست ذات أهمية سريرية مقارنة مع أعراض نقص الانتباه.

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المهيمن فرط الحركة - الاندفاعية 6A05.1

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب نقص الانتباه فرط الحركة وتهيمن أعراض فرط الحركة - الاندفاعية على التظاهر السريري. يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي المفرط وصعوبة البقاء ساكناً، وأشد ما يتجلى في المواقف المنظمة التي تتطلب ضبطاً ذاتياً للسلوك. الاندفاعية هي ميل للتصرف استجابةً للمنبهات الآنية، دون مناقشة أو نظر في المخاطر والعواقب. قد توجد أيضاً بعض أعراض نقص الانتباه، ولكنها ليست ذات أهمية سريرية مقارنة مع أعراض فرط الحركة - الاندفاعية.

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، التظاهر المشترك 6A05.2

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، وكلاً من أعراض نقص الانتباه وفرط الحركة - الاندفاعية ذات أهمية سريرية، ولا تهيمن أي منها على التظاهر السريري. يشير عدم الانتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على الانتباه متوجهاً إلى المهام التي لا توفر مستوى عالٍ من التحفيز أو المكافآت المتكررة، والتشتت، ومشاكل التنظيم. يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي المفرط وصعوبة البقاء ساكناً، وأشد ما يتجلى في المواقف المنظمة التي تتطلب ضبطاً ذاتياً للسلوك. الاندفاعية هي ميل للتصرف استجابةً للمنبهات الآنية، دون مناقشة أو نظر في المخاطر والعواقب.

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، تظاهر محدد آخر 6A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، تظاهر غير محدد 6A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الوصف:

يتسم اضطراب الحركة النمطية بحركات طوعية ومتكررة ونمطية لا هدف لها على ما يبدو (وغالباً متواترة) تنشأ خلال فترة النمو المبكر، ولا تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية المباشرة لمادة أو دواء (بما في ذلك السحب) وتتداخل بشكل ملحوظ مع الأنشطة العادية أو ينتج عنها إصابة جسدية ذاتية. يمكن أن تشمل الحركات النمطية غير المؤذية تأرجح الجسد، وهز الرأس، وسلوك النقر بالأصابع، وتحريك اليد. يمكن أن تشتمل السلوكيات النمطية المؤذية للذات على ضربات الرأس المتكررة، والصفع على الوجه والضغط على العين، وقضم اليدين أو الشفتين أو أجزاء أخرى من الجسد.

استثناءات:

- اضطرابات العرة (8A05)
- هوس نتف الأشعار (6B25.0)
- حركات لا إرادية غير طبيعية (6MB4)

اضطراب الحركة النمطي دون أذية للذات 6A06.0

الوصف:

يجب تطبيق هذه الفئة على أشكال اضطراب الحركة النمطية التي تتداخل فيها السلوكيات النمطية بشكل ملحوظ مع الأنشطة العادية، ولكنها لا تؤدي إلى إصابة جسدية ذاتية. يتسم اضطراب الحركة النمطية دون أذية للذات بحركات طوعية ومتكررة ونمطية لا هدف لها على ما يبدو (وغالباً متواترة) تنشأ خلال فترة النمو المبكر، ولا تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية المباشرة لمادة أو دواء (بما في ذلك السحب) وتتداخل بشكل ملحوظ مع الأنشطة العادية. يمكن أن تشمل الحركات النمطية غير المؤذية تأرجح الجسد، وهز الرأس، وسلوك النقر بالأصابع، وتحريك اليد.

اضطراب الحركة النمطي مع أذية للذات 6A06.1

الوصف:

يجب تطبيق هذه الفئة على أشكال اضطراب الحركة النمطية التي ينتج فيها عن السلوكيات النمطية إصابة جسدية ذاتية تستدعي رعاية طبية، أو قد تؤدي إلى مثل هذه الإصابة إذا لم يتم تطبيق التدابير الوقائية (مثل الخوذة لمنع إصابة الرأس). يتسم اضطراب الحركة النمطية مع أذية للذات بحركات طوعية ومتكررة ونمطية لا هدف لها على ما يبدو (وغالباً متواترة) تنشأ خلال فترة النمو المبكر، ولا تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية المباشرة لمادة أو دواء (بما في ذلك السحب). يمكن أن تشمل الحركات النمطية المؤذية للذات ضربات الرأس المتكررة، والصفع على الوجه والضغط على العين، وقضم اليدين أو الشفتين أو أجزاء أخرى من الجسد.

اضطراب الحركة النمطي، غير محدد 6A06.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب العرة أو عرات أولية 8A05.0

الوصف:

يتسم اضطراب العرة أو العرات الأولية بوجود عرات حركية و / أو صوتية (لفظية) مزمنة. يتم تعريف العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة. لوضع التشخيص، يجب أن تكون العرات موجودة منذ عام واحد على الأقل، على الرغم من أنها قد لا تظهر باستمرار.

متلازمة توريت 8A05.00

الوصف:

متلازمة توريت هي اضطراب عرة مزمن يتميز بوجود عرات حركية وصوتية (لفظية) مزمنة، مع ظهور خلال فترة النمو. يتم تعريف العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة. لوضع تشخيص متلازمة توريت، يجب أن تكون كلاً من العرات الحركية والصوتية موجودة منذ عام واحد على الأقل، على الرغم من أنها قد لا تظهر معاً أو باستمرار.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب عرات صوتية وحركية متعددة

اضطراب العرة الحركية المزمن 8A05.01

الوصف:

يتسم اضطراب العرة الحركية المزمن بوجود عرات حركية على مدى عام واحد على الأقل، على الرغم من أنها قد لا تظهر باستمرار. يتم تعريف العرات الحركية على أنها حركات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة.

استثناءات:

- متلازمة توريت (8A05.00)

اضطراب العرة الصوتية المزمن 8A05.02

الوصف:

يتسم اضطراب العرة الصوتية المزمن بوجود عرات صوتية (لفظية) على مدى عام واحد على الأقل، على الرغم من أنها قد لا تظهر باستمرار. يتم تعريف العرات الحركية على أنها حركات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة.

استثناءات:

- متلازمة توريت (8A05.00)

عرات حركية وجيزة 8A05.02

الوصف:

العرات هي حركات مفاجئة وغير منظومة ونمطية مثل غمز العين، الاستنشاق، النقر وغيرها. يجب أن تكون قد وجدت لأقل من عام واحد.

اضطراب العرة أو عرات أولية محددة أخرى 8A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرة أو عرات أولية، غير محددة 8A05.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

متلازمة النماء العصبي الثانوية 6E60

الوصف:

هي متلازمة تحوي سمات عصبية تطويرية كبيرة ولكنها لا تفي بالمتطلبات التشخيصية لأي من الاضطرابات العصبية النمائية المحددة والتي يُعتقد أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة تحت الاضطرابات العقلية والسلوكية (على سبيل المثال، سمات التوحد في متلازمة ريت، العدوانية وتشويه الذات في متلازمة لش-نيهان، وشذوذات تطور اللغة في متلازمة ويليامز)، وذلك بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المختبرية. يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الكامن المفترض عندما تكون مشاكل النماء العصبي شديدة بما يكفي لتستدعي عناية سريرية مخصصة.

التنسيق اللاحق:

إضافة تفاصيل لمتلازمة النمو العصبي الثانوي

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الكلام أو اللغة الثانوية 6E60.0

الوصف:

متلازمة تحوي سمات مهمة تتعلق بتطور الكلام أو اللغة التي لا تفي بالمتطلبات التشخيصية لأي من اضطرابات الكلام أو اللغة النمائية المحددة والتي يُعتقد أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة تحت الاضطرابات العقلية والسلوكية، وذلك بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المختبرية. تشمل المسببات المحتملة داءً في الجهاز العصبي أو نقصاً حسيّاً أو إصابة

في الدماغ أو عدوى.

ملاحظة للترميز:

يجب وضع هذا التشخيص بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الكامن المفترض عندما تكون مشاكل النماء العصبي شديدة بما يكفي لتستدعي عناية سريرية مخصصة.

التنسيق اللاحق:

إضافة تفاصيل إلى متلازمة الكلام أو اللغة الثانوية

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَّمز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة النماء العصبي الثانوية المحددة أخرى 6E60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

إضافة تفاصيل لمتلازمة النماء العصبي الثانوية المحددة الأخرى

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَّمز أيضاً)

متلازمة النماء العصبي الثانوية، غير محددة 6E60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

إضافة تفاصيل لمتلازمة النماء العصبي الثانوية، غير محددة

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات النماء العصبية محددة أخرى 6A0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات النماء العصبية، غير محددة 6A0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الفصام والاضطرابات الذهانية الأولية

الوصف:

يتميّز الفُصام وغيره من الاضطرابات الذهانية الأولية بتدنٍ ملحوظ في اختبار الواقع مع تغيرات في السلوك، تظهر كأعراض إيجابية مثل الأوهام المستمرة والهلاوس المستمرة والتفكير غير المنظم (عادة ما يظهر ككلام غير منظم) والسلوك المضطرب بشكل كبير، واختبار أوهام السلبية والتحكم، والأعراض السلبية مثل المزاج المسطح وانعدام الإرادة، واختلالات حركية نفسية. تحدث هذه الأعراض بتواتر وكثافة كافية للابتعاد عن المعايير الثقافية المتوقعة. لا تنشأ هذه الأعراض كأحد المظاهر لاضطراب عقلي وسلوكي آخر (على سبيل المثال، اضطراب المزاج أو الهذيان أو اضطراب ناجم عن استعمال المواد). يجب عدم استخدام الفئات في هذه المجموعة لتصنيف التعبير عن الأفكار أو المعتقدات أو السلوكيات التي يتم إقرارها ثقافياً.

مضمنة في مكان آخر:

- الاضطرابات الذهانية الناجمة عن المواد
- متلازمة ذهانية ثانوية (E616)

الفُصام 6A20

الوصف:

يتميز الفُصام باختلالات ذات أشكال عقلية متعددة، بما في ذلك التفكير (على سبيل المثال، الأوهام، واضطراب بنية الفكر)، والإدراك (مثل الهلوس)، والخبرة الذاتية (على سبيل المثال، اختبار الفرد بأن مشاعره، أو دوافعه، أو أفكاره، أو سلوكه تحت سيطرة قوة خارجية)، و المعرفية (على سبيل المثال، نقص الانتباه، الذاكرة اللفظية، المعرفية الاجتماعية)، الإرادة (على سبيل المثال، فقدان الدافع)، الوجدان (على سبيل المثال، التعبير العاطفي المتبلد)، والسلوك (مثل السلوك الذي يبدو غريباً أو بلا هدف أو استجابات عاطفية غير متوقعة أو غير ملائمة تتعارض مع تنظيم السلوك). قد توجد اضطرابات نفسية حركية، بما في ذلك كاتاتونيا. تعتبر الأوهام المستمرة والهلوس المستمرة واضطراب التفكير وتجارب التأثير أو السلبية أو السيطرة من الأعراض الأساسية. يجب أن تستمر الأعراض لمدة شهر واحد على الأقل حتى يوضع تشخيص الفُصام. كما أن الأعراض ليست مظهراً من مظاهر حالة صحية أخرى (على سبيل المثال، ورم في المخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات)، بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).

الاستثناءات:

- اضطراب فصامي الشكل (A226)
- تفاعل فصامي (A226)
- الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز (A236)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

- 6A25.1 الأعراس السلبلية في الاضطرابات الذهانلة الأولى
- 6A25.2 الأعراس الاكتنابلة في الاضطرابات الذهانلة الأولى
- 6A25.3 أعراس الهوس في الاضطرابات الذهانلة الأولى
- 6A25.4 الأعراس النفسلة الحركلة في الاضطرابات الذهانلة الأولى
- 6A25.5 الأعراس المعرفلة في الاضطرابات الذهانلة الأولى

الفُصام، النوبة الأولى 6A20.00

الوصف:

يستخدم الفُصام، النوبة الأولى لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلبي المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام (بما في ذلك المدة) ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة تم خلالها تلبية متطلبات التشخيص لمرض الفُصام.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، النوبة الأولى

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، النوبة الأولى، عرضي حالياً 6A20.00

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الفُصام، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تليبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، النوبة الأولى، عرضي حالياً
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً 6A20.01

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدني في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة كاملة 6A20.02

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبقَ شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، النوبة الأولى، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصل، النوبة الأولى، غير محدد 6A20.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصل، النوبة الأولى، غير محدد له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، نوبات متعددة 6A20.1

الوصف:

يستخدم الفُصام، نوبات متعددة لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلي المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام (بما في ذلك المدة) كما سبق لهم اختبار نوبات تم خلالها تلبية متطلبات التشخيص لمرض الفُصام، مع هدأة ملحوظة للأعراض بين النوبات. قد تبقى بعض الأعراض الخفيفة خلال فترات الهدأة والتي تحدث استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، نوبات متعددة

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الفُصام، نوبات متعددة، عرضي حالياً 6A20.10

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الفُصام، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تليبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، نوبات متعددة، عرضي حالياً
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً 6A20.11

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً. وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدني في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة كاملة 6A20.12

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبقَّ شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، نوبات متعددة، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، نوبات متعددة، غير محدد 6A20.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، نوبات متعددة، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، مستمر 6A20.2

الوصف:

وجدت الأعراض التي تفي بجميع المتطلبات التعريفية للفصام في جميع مراحل المرض تقريباً على مدار عام واحد على الأقل، كما كانت فترات الأعراض دون العتبة قصيرة جداً بالنسبة لعموم الاضطراب.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، مستمر

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، مستمر، عرضي حالياً 6A20.20

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الفُصام، مستمر من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تليبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، مستمر، عرضي حالياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، مستمر، في هدأة جزئياً 6A20.21

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، مستمر من ناحية الأعراض والمدة سابقاً. وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدني في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، مستمر، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الفُصام، مستمر، في هدأة كاملة 6A20.22

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام، مستمر من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبقَ شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، مستمر، في هدأة كاملة
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، مستمر، غير محدد 6A20.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، مستمر، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام، محدد آخر 6A20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام، محدد آخر

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصل، غير محدد 6A20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصل، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الوصف:

اضطراب الفُصام الوجداني هو اضطراب نوبي يتم فيه تلبية المتطلبات التشخيصية للفصام والهوس، أو النمط المختلط أو الاكتئاب المعتدل أو الشديد في نفس النوبة من المرض، إما في آنٍ واحد أو في غضون بضعة أيام من بعضها البعض. الأعراض البارزة للفصام (مثل الأوهام والهلاوس وعدم انتظام شكل فكر وتجارب التأثير والسلبية والسيطرة) مصحوبة بأعراض نموذجية لنوبة اكتئابية (على سبيل المثال، الاكتئاب، فقدان الاهتمام، تدني النشاط)، نوبة هوس (على سبيل المثال، مزاج مرتفع، زيادة في طبيعة وسرعة النشاط الجسدي والعقلي) أو نوبة مختلطة. قد توجد اضطرابات نفسية حركية، بما في ذلك كاتاتونيا. يجب أن تستمر الأعراض لمدة شهر واحد على الأقل. كما أن الأعراض ليست مظهراً من مظاهر حالة صحية أخرى (على سبيل المثال، ورم في المخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات)، بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام الوجداني، النوبة الأولى 6A21.0

الوصف:

يستخدم الفُصام الوجداني، النوبة الأولى لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلبي المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام الوجداني (بما في ذلك المدة) ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة تم خلالها تلبية متطلبات التشخيص لمرض الفُصام أو الفُصام الوجداني.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، النوبة الأولى

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، النوبة الأولى، عرضي حالياً 6A21.00

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الفصام الوجداني، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تلبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، النوبة الأولى، عرضي حالياً
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً 6A21.01

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفصام الوجداني، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة كاملة 6A21.02

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفصام الوجداني، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبق شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، النوبة الأولى، في هدأة كاملة

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، النوبة الأولى، غير محدد 6A21.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، النوبة الأولى، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، نوبات متعددة 6A21.1

الوصف:

يستخدم الفصام الوجداني، نوبات متعددة لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلبي المتطلبات التشخيصية لمرض الفصام (بما في ذلك المدة) كما سبق لهم اختبار نوبات تم خلالها تلبية متطلبات التشخيص لمرض الفصام والفصام الوجداني، مع هدأة ملحوظة للأعراض بين النوبات. قد تبقى بعض

الأعراض الخفيفة خلال فترات الهدأة والتي تحدث استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، نوبات متعددة

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A21.10 الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، عرضي حالياً

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الفُصام الوجداني، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تليبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، عرضي حالياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصل الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً 6A21.11

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفصل الوجداني، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً. وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريراً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصل الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة كاملة 6A21.12

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الفُصام الوجداني، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبقَّ شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، نوبات متعددة، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، نوبات متعددة، غير محدد 6A21.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، نوبات متعددة، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام الوجداني، مستمر 6A21.2

الوصف:

وجدت الأعراض التي تفي بجميع المتطلبات التعريفية للفصام الوجداني في جميع مراحل المرض تقريباً على مدار عام واحد على الأقل، كما كانت فترات الأعراض دون العتبة قصيرة جداً بالنسبة لعموم الاضطراب.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، مستمر

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام الوجداني، مستمر، عرضي حالياً 6A21.20

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لاضطراب الفُصام الوجداني، مستمر من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تلبيتها جلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام الوجداني، مستمر، عرضي حالياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، مستمر، في هدأة جزئياً 6A21.21

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لاضطراب الفصام الوجداني، مستمر من ناحية الأعراض والمدة سابقاً. وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريراً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، مستمر، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، مستمر، في هدأة كاملة 6A21.22

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لاضطراب الفصام الوجداني، مستمر من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبقَّ شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، مستمر، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، مستمر، غير محدد 6A21.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، مستمر، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصل الوجداني، محدد آخر 6A21.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصل الوجداني، محدد آخر

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفصام الوجداني، غير محدد 6A21. Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفصام الوجداني، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الفصامي النمط 6A22

الوصف:

يتميز الاضطراب الفصامي النمط بنمط دائم (أي سمات لأداء الشخص على مدى سنوات عدة على الأقل) من الغرابة في السلوك والمظهر والكلام، مصحوباً بتشوهات معرفية وإدراكية، والمعتقدات غير العادية، وعدم الارتياح - وانخفاض القدرة في كثير من الأحيان - مع العلاقات الشخصية. قد تشمل الأعراض انقباض المزاج أو كونه غير موافق، وغياب اللذة (الفصامي النمط السلبي). قد تحصل أفكار اضطهادية، أو أفكار الإشارة، أو أعراض ذهانية أخرى، بما في ذلك الهلوس بأنواعها، (الفصامي النمط الإيجابي)، ولكنها ليست بكثافة أو مدة كافية لتلبية المتطلبات التشخيصية لمرض الفصام، أو اضطراب الفصام الوجداني، أو الاضطراب التوهي. تتسبب الأعراض بالضائقة أو التدهور في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من المجالات المهمة.

مُشتمَلات:

- اضطراب الشخصية الفُصامية

استثناءات:

- اضطراب طيف التوحد (6A02)
- اضطراب الشخصية (6D10)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الفصامي النمط

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز 6A23

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز ببداية حادة لأعراض ذهانية تظهر دون بوادر لتصل أقصى حد لها في غضون أسبوعين. قد تشمل الأعراض الأوهام، والهلاوس، وعدم تنظيم عمليات التفكير، والحيرة أو الارتباك، واضطرابات الوجدان والمزاج. قد تكون الاضطرابات النفسية الحركية الشبيهة بالكاتاتونيا موجودة. عادة ما تتغير الأعراض بسرعة، سواء في الطبيعة أو الشدة، من يوم لآخر، أو حتى في غضون يوم واحد. لا تتجاوز مدة النوبة 3 أشهر، وتستمر في الغالب من بضعة أيام إلى شهر واحد. لا تعد الأعراض مظهراً لحالة صحية أخرى (مثل ورم في المخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات)، بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبة أولى 6A23

الوصف:

يستخدم الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبة أولى لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلبي المتطلبات التشخيصية للاضطراب الذهاني الحاد الوجيز ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة مماثلة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبة أولى له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، عرضي حالياً 6A23.00

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تلبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، عرضي حالياً له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً 6A23.01

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، في هدأة جزئياً له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، في هدأة كاملة 6A23.02

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبق شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، غير محدد 6A23.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، النوبة الأولى، غير محدد له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة 6A23.1

الوصف:

يستخدم الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة لتحديد الأفراد الذين يعانون من أعراض تلي المتطلبات التشخيصية للاضطراب الذهاني الحاد والوجيز كما سبق لهم اختبار نوبات مماثلة سابقاً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، عرضي حالياً 6A23.10

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً لمرض الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تلبيتها خلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، عرضي حالياً له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً 6A23.11

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية للاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً. وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريراً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، في هدأة كاملة 6A23.12

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية لمرض الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبق شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، في هدأة كاملة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، غير محدد 6A23.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، نوبات متعددة، غير محدد له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، محدد آخر 6A23.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، محدد آخر

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، غير محدد 6A23. Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الوصف:

يتميز الاضطراب التوهي بتطور أوهام أو مجموعة من الأوهام ذات الصلة التي تستمر لمدة 4 أشهر على الأقل (عادة أطول بكثير)، والتي تحدث في غياب للاكتئاب أو الهوس أو النوبة المختلطة. الأعراض المميزة الأخرى لمرض الفصام (مثل الهلوس السمعية المستمرة، والتفكير غير المنظم، والأعراض السلبية) غير موجودة، على الرغم من أن الأشكال المختلفة من الاضطرابات الإدراكية (مثل الهلوس والإخالات وسوء التعرف على الأشخاص) المرتبطة موضوعياً بالوهم لا تزال متوافقة مع التشخيص. بصرف النظر عن الأفعال والمواقف المرتبطة مباشرة بالوهم أو النظام التوهي، لا يتأثر الوجدان والكلام والسلوك عادةً. الأعراض ليست مظهراً من مظاهر اضطراب أو مرض آخر لا يُصنف ضمن الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية (مثل ورم في المخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات)، بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب التوهي

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25	المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.0	الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.1	الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.2	الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.3	أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.4	الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
6A25.5	الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب التوهمي، عرضي حالياً 6A24.0

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية حالياً للاضطراب التوهمي من ناحية الأعراض والمدة، أو جرى تليبيتها جلال الشهر الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيل الاضطراب التوهمي، عرضي حالياً
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب التوهمي، في هدأة جزئياً 6A24.1

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية للاضطراب التوهمي، من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتم تلبية المتطلبات التشخيصية للاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن لا تزال هناك بعض الأعراض المهمة سريرياً، والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بتدنٍ في الأداء الوظيفي. ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب التوهمي، في هدأة جزئياً

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| 6A25 | المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.0 | الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.1 | الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.2 | الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.3 | أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.4 | الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية |
| 6A25.5 | الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية |

الاضطراب التوهمي، في هدأة كاملة 6A24.2

الوصف:

تمت تلبية كافة المتطلبات التشخيصية للاضطراب التوهمي من ناحية الأعراض والمدة سابقاً، وقد تحسنت الأعراض بحيث لم يتبق شيء من الأعراض المهمة سريرياً. ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو علاج آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب التوهمي، في هدأة كاملة
له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الاضطراب التوهي، غير محدد 6A24.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب التوهي، غير محدد

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية 6A25

الوصف:

يمكن استخدام هذه الفئات لوصف المظهر السريري الحالي عند الأفراد الذين تم تشخيصهم بالفصام أو اضطراب ذهاني أولي آخر، ويجب عدم استخدامها في الأفراد الذين ليس لديهم مثل هذا التشخيص. يمكن تطبيق فئات متعددة. الأعراض التي تُعزى إلى العواقب الفيزيولوجية المرضية المباشرة لحالة صحية أو إصابة غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية (على سبيل المثال، ورم في المخ أو إصابة الدماغ الرضوية)، أو إلى التأثيرات المباشرة لمادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تأثيرات السحب، كأثلة على أنواع الأعراض ذات الصلة.

ملاحظة للترميز:

لا ينبغي استخدام هذه الفئات في الترميز الأساسي. يجري توفير هذه الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود هذه الأعراض في الاضطرابات الذهانية الأولية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.0

الوصف:

تشمل الأعراض الإيجابية للاضطرابات الذهانية الأولية الأوهام المستمرة، والهلاوس المستمرة (الأكثر شيوعاً الهلوسة السمعية اللفظية)، والتفكير غير المنظم (اضطراب شكل الفكر مثل فقد الترابط، وانحراف الفكر، أو التفكك)، والسلوك غير المنظم بشكل كبير (السلوك الذي يبدو غريباً، عشوائياً بلا هدف) وتجارب السلبية والسيطرة (تجربة أن مشاعر المرء أو دوافعه أو أفكاره تحت سيطرة قوة خارجية). يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة الأعراض الإيجابية خلال الأسبوع الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.1

الوصف:

تشمل الأعراض السلبية للاضطرابات الذهانية الأولية وجداناً محدداً أو متبلداً أو مسطحاً، شح الكلام أو انعدامه، فقد الإرادة (الافتقار العام للدافع، أو فقد الدافع لتحقيق أهداف ذات مغزى)، فقد الاجتماعية (قلة أو غياب المشاركة مع الآخرين والاهتمام بالتفاعل الاجتماعي) وفقد اللذة (عدم القدرة على اختبار المتعة من الأنشطة الممتعة في العادة). لكي يتم اعتبار الأعراض الذهانية سلبية، يجب ألا تُعزى مثل هذه الأعراض ذات الصلة بالكامل إلى العلاج بالعقاقير المضادة للذهان، أو الاضطراب الاكتئابي، أو بيئة غير محفزة، ويجب ألا تكون نتيجة مباشرة لأعراض إيجابية (على سبيل المثال، الأوهام الاضطهادية التي تؤدي ليصبح الشخص معزولاً اجتماعياً بسبب الخوف من الأذى). يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة الأعراض السلبية خلال الأسبوع الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.2

الوصف:

تشير الأعراض الاكتئابية للاضطرابات الذهانية الأولية إلى المزاج المكتئب كما ذكره الفرد (الشعور بالإحباط والحزن) أو تظهر كعرض (مثل المظهر المظلوم أو الدامع). لا ينبغي استخدام هذا الوصف في حالة وجود أعراض غير مزاجية لنوبة اكتئاب (على سبيل المثال، انعدام اللذة، بطء حركي نفسي). يمكن استخدام هذا الوصف سواء كانت أعراض الاكتئاب تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب اكتئابي تم تشخيصه بشكل منفصل أم لا. يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة الأعراض الاكتئابية خلال الأسبوع الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.3

الوصف:

تشير أعراض الهوس للاضطرابات الذهانية الأولية إلى حالات مزاجية مرتفعة أو متهيجة أو متهيجة أو مشتتة، بما في ذلك التبدلات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج) المصحوبة بزيادة الطاقة أو النشاط، وذلك عندما تمثل تغيرات كبيرة عن الحالة المزاجية والطاقة أو مستوى النشاط النموذجي للفرد. يمكن استخدام هذا الوصف سواء كانت أعراض الاكتئاب تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب ثنائي القطب تم تشخيصه بشكل منفصل أم لا. يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة أعراض الهوس خلال الأسبوع الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.4

الوصف:

تشير الأعراض النفسية الحركية للاضطرابات الذهانية الأولية إلى الهياج النفسي الحركي أو النشاط الحركي المفرط، والذي يتجلى عادةً في سلوكيات غير هادفة مثل التملل، والتحول، والعبث، وعدم القدرة على استمرار الجلوس أو الوقوف، وتقليب الكفين، والتخلف الحركي النفسي، أو تباطؤ عام مرئي للحركات والكلام، والأعراض الكاتاتونية مثل الهياج، أو الوضعة، أو المرونة الشمعية، أو السلبية، أو الصمت، أو الذهول. يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة الأعراض النفسية الحركية خلال الأسبوع الماضي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية 6A25.4

الوصف:

تشير الأعراض المعرفية للاضطرابات الذهانية الأولية إلى الانخفاض المعرفي في أي من المجالات التالية: سرعة المعالجة، والانتباه / التركيز، والتوجه، والحكم، والتجريد، والتعلم اللفظي أو البصري، والذاكرة العاملة. لا يُعزى الضعف المعرفي إلى الاضطراب العصبي النمائي أو الهذيان أو الاضطراب العصبي المعرفي الآخر أو التأثيرات المباشرة لمادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تأثيرات السحب. من الناحية المثالية، يجب أن يعتمد استخدام هذه الفئة على نتائج التقييمات النفسية العصبية المعيارية والمثبتة محلياً، على الرغم من أن مثل هذه التدابير قد لا تكون متاحة في جميع الظروف. يجب أن يتم التقييم بناءً على شدة الأعراض المعرفية خلال الأسبوع الماضي.

استثناءات:

- اضطرابات عصبية معرفية (6D70-6E0Z)
- اضطرابات النماء العصبي (6A00-6A0Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

لديه حالة مسببة:

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول 6C40.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدّث بالكحول بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

مُشتمَلات:

- الغيرة الكحولية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدّث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمزياً):

6C40.0

نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسحاب بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع هلاوس 6C40.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
	(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أوهام 6C40.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكحول مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكحول مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسحاب بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة 6C40.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
	(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول، غير محدد 6C40.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكحول مع غير محدد

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3 الانسحاب بالكحول

6C40.4 سحب الكحول

6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالحشيش 6C41.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالحشيش بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش

- 6C41.20 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
- 6C41.21 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C41.22 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C41.23 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C41.2Z الاعتماد على الحشيش، غير محدد
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- 6C41.3 الانسحاب بالحشيش
- 6C41.4 سحب الحشيش

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاناينويد الصناعي 6C42.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاناينويد الصناعي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكاناينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تتميز الانسحاب بالكاناينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاناينويد الصناعي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكاناينويد، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاناينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاناينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاناينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C42.3

الانسحاب بالكاناينويد الصناعي

6C42.4

سحب الكاناينويد الصناعي

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالأفيون بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة

6C43.22 الاعتماد على الأفيون، هداة جزئية مستدامة

6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هداة كاملة مستدامة

6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):
- يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين 6C45.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
	متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالكوكائين مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالكوكائين مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3

الانسمام بالكوكائين

6C45.4

سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع أوهام

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C45.0

نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر

6C45.1Z

نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد

6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين (6C45.6)
- اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون (6C47.6)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس
6C46.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع هلاوس (6C45.60)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون مع هلاوس (6C47.60)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
 6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر

6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع أوهام 6C46.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أوهام (6C45.61)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون مع هلاوس (6C47.61)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر

6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض مختلطة 6C46.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة (6C45.62)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة (6C47.62)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون، نوبي 6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأَمفيتامين والميتكاثينون، مستمر

6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تتميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.5

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهلوسات بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

استثناءات:

• اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة أخرى ذات أثر نفسي (6C4E.6)

• اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول (6C40.6)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات

6C49.10 نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي

6C49.11 نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر

6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
6C49.2Z	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد
	متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C49.3	الانسمام بالمهلوسات

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تتميز الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطيارة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطيارة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطيارة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد
	مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطيارة
6C4B.4	سحب المستنشقات الطيارة

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C4C.0 | نوبة من الاستعمال الضار MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |
| 6C4C.1 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |
| 6C4C.10 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي |
| 6C4C.11 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر |
| 6C4C.1Z | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد |
| 6C4C.2 | الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |

- 6C4C.20 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي
- 6C4C.21 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4C.22 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة جزئية مستدامة
- 6C41.23 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4C.2Z الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.5

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال العقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال العقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال العقاقير المُفارقة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|--|
| 6C4D.0 | نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.1 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.10 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي |
| 6C4D.11 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر |
| 6C4D.1Z | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد |
| 6C4D.2 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.20 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي |

- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- (مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطراب ذهاني مُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C4E.0 | نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي |
| 6C4E.1 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي |
| 6C4E.10 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي |
| 6C4E.11 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر |
| 6C4E.1Z | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد |

- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- (مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية 6E61

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود هلاوس أو أوهام بارزة يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز (6A23)
- هذيان (6D70)
- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع هلاوس 6E61.0

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود هلاوس بارزة يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. ليست الأوهام عنصراً بارزاً في المظاهر السريرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)
- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع أوهام 6E61.1

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أوهام بارزة يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. ليست الهلوسات عنصراً بارزاً في المظاهر السريرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)
- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع أوهام وهلاوس 6E61.2

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أوهام وهلاوس بارزة يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)
- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوي، مع أوهام وهلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أعراض غير محددة 6E61.3

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أعراض غير محددة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

فُصام محدد آخر، أو الاضطرابات الذهانية الأولية 6A2.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام المحدد الآخر، أو الاضطرابات الذهانية الأولية

له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية

6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية

A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

الفُصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية، غير محددة 6A2.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الفُصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية، غير المحددة له مظاهر (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- 6A25 المظاهر العرضية للاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.0 الأعراض الإيجابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.1 الأعراض السلبية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.2 الأعراض الاكتئابية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.3 أعراض الهوس في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.4 الأعراض النفسية الحركية في الاضطرابات الذهانية الأولية
- 6A25.5 الأعراض المعرفية في الاضطرابات الذهانية الأولية

كاتاتونيا

الوصف:

الكاتاتونيا هي متلازمة لاضطرابات نفسية حركية في المقام الأول، والتي تتميز بحدوث العديد من الأعراض في وقت واحد مثل الذهول؛ الجُمْدَة، المرونة الشمعية، الصمات، السلبية، الوضعة، النمطية، التكلف، الهياج النفسي الحركي، التكشير، الصدى اللفظي، صدى الحركة. قد تحدث الكاتاتونيا في سياق اضطرابات عقلية معينة، بما في ذلك اضطرابات المزاج، والفصام أو غيرها من الاضطرابات الذهانية الأولية، واضطرابات النمو العصبي، وقد تحدث بسبب المواد ذات التأثير النفسي، بما في ذلك الأدوية. قد يكون سبب الكاتاتونيا أيضاً حالة طبية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو اضطرابات النمو العصبي.

الاستثناءات :

- الآثار الضارة للعقاقير والأدوية والمواد البيولوجية غير المصنفة في مكان آخر (NE60)

مضمنة في مكان آخر:

- متلازمة الكاتاتونية الثانوية (E696)

ملاحظة للترميز:

استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك، لتحديد أي مسببات معروفة.

كاتاتونيا مصاحبة لمرض عقلي آخر 6A40

الوصف:

الكاتاتونيا المصاحبة لمرض عقلي آخر هي متلازمة لاضطرابات نفسية حركية في المقام الأول، والتي تتميز بحدوث العديد من الأعراض في وقت واحد مثل الذهول؛ الجُمْدَة، المرونة الشمعية، الصمات، السلبية، الوضعة، النمطية، التكلف، الهياج النفسي الحركي، التكشير، الصدى اللفظي، صدى الحركة. الاضطرابات العقلية المصاحبة للكاتاتونيا تتضمن اضطرابات المزاج، والفصام أو غيرها من الاضطرابات الذهانية الأولية، واضطرابات النمو العصبي، خصوصاً اضطراب طيف التوحد.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الكاتاتونيا المصاحبة لمرض عقلي آخر

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

كاتاتونيا مُحدّثة بمواد ذات تأثير نفسي، متضمنة الأدوية 6A41

الوصف:

الكاتاتونيا المُحدّثة بمواد ذات تأثير نفسي، متضمنة الأدوية هي متلازمة لاضطرابات نفسية حركية في المقام الأول، والتي تظهر خلال أو بعد الانسحاب بمادة أو السحب منها أو خلال استعمال الأدوية ذات التأثير النفسي (على سبيل المثال، مضادات الذهان، الأمفيتامين، فينيسكلدين، PCP). تتميز المتلازمة بحدوث العديد من الأعراض في وقت واحد مثل الذهول؛ الجُمْدَة، المرونة الشمعية، الصمات، السلبية، الوضعة، النمطية، التكلف، الهياج النفسي الحركي، التكشير، الصدى اللفظي، صدى الحركة. المادة المحددة بالإضافة لمقدار وفترة استعمالها يجب أن تكون قادرة على إنتاج أعراض الكاتاتونيا.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الكاتاتونيا المُحدّثة بمواد ذات تأثير نفسي، متضمنة الأدوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69

الوصف:

متلازمة الكاتاتونيا الثانوية هي متلازمة لاضطرابات نفسية حركية في المقام الأول، والتي يُنظر على أنها ناتجة عن حالة طبية ليست مصنفة تحت فئة الاضطرابات العقلية، السلوكية، أو اضطرابات النماء العصبية (على سبيل المثال، الحمض الكيتوني السكري، فرط كالسيوم الدم، اعتلال الدماغ الكبدي، بيلة هوموسيستينية، رضوض الرأس وأورام الدماغ، أمراض الأوعية الدموية الدماغية، التهاب الدماغ). تتميز المتلازمة بحدوث العديد من الأعراض في وقت واحد مثل الذهول؛ الجُمْدَة، المرونة الشمعية، الصمات، السلبية، الوضعة، النمطية، التكلف، الهياج النفسي الحركي، التكشير، الصدى اللفظي، صدى الحركة.

ملاحظة للترميز:

استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك، لتحديد أي مسببات معروفة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة الكاتاتونيا الثانوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

ملاحظة للترميز:

استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك، لتحديد أي مسببات معروفة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى كاتاتونيا، غير محددة

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات المزاج

الوصف:

تشير اضطرابات المزاج إلى تجمع لاضطرابات ثنائي القطب والاكتئاب. يتم تعريف اضطرابات المزاج وفقاً لأنواع معينة من نوبات المزاج ونمطها بمرور الزمن. الأنواع الأساسية لنوبات المزاج هي نوبة الاكتئاب، ونوبة الهوس، والنوبة المختلطة، ونوبة تحت الهوس. نوبات الحالة المزاجية ليست كيانات يمكن تشخيصها بشكل مستقل، وبالتالي ليس لها رموز تشخيص خاصة بها. بدلاً من ذلك، تشكل نوبات المزاج المكونات الأساسية لمعظم الاضطرابات الاكتئابية والثنائية القطب.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطرابات المزاج المُحدَّثة بالمواد (8A05.0)

- متلازمة مزاج ثانوية (6E62)

ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة

الوصف:

ثنائي القطب والاضطرابات ذات الصلة هي اضطرابات مزاجية نوبية تحدث من خلال حدوث نوبات أو أعراض هوس أو مختلطة أو تحت هوس. تتناوب هذه النوبات عادةً في سياق هذه الاضطرابات مع نوبات اكتئابية أو فترات من أعراض الاكتئاب.

اضطراب ثنائي القطب نمط I

الوصف:

الاضطراب ثنائي القطب نمط I هو اضطراب مزاجي نوبي يُعرَّف بحدوث نوبة أو أكثر من نوبات الهوس أو النوبات المختلطة. نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل ما لم يتم تقصير زمنها من خلال تدخل علاجي. تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط، وفرط النشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام السريع أو المضغوط، تطاير الأفكار، زيادة تقدير الذات أو العظمة، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي، والتغيرات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج). تتميز النوبة المختلطة إما بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والاكتئاب البارزة في معظم الأيام خلال فترة أسبوعين على الأقل. على الرغم من أنه يمكن وضع التشخيص بناءً على دليل لحصول نوبة هوس واحدة أو نوبة مختلطة، إلا أن نوبات الهوس أو النوبات المختلطة عادةً ما تتناوب مع نوبات الاكتئاب في سياق الاضطراب.

الاستثناءات:

- اضطراب المزاج الدوري (6A62)
- اضطراب ثنائي القطب نمط II (6A61)

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، دون أعراض ذهانية 6A60.0

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي هوس ، ولا توجد أوهام أو هلاوس أثناء النوبة. نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل ما لم يتم تقصير زمنها من خلال تدخل علاجي. تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط، وفرط النشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام السريع أو المضغوط، تطاير الأفكار، زيادة تقدير الذات أو العظمة، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي، والتغيرات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس ، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس ، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، مع أعراض ذهانية 6A60.1

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي هوس ، وتوجد أوهام أو هلاوس أثناء النوبة. نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل ما لم يتم تقصير زمنها من خلال تدخل علاجي. تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط، وفرط النشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام السريع أو المضغوط، تطاير الأفكار، زيادة تقدير الذات أو العظمة، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي، والتغيرات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية هوس ، مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية تحت هوس ، 6A60.2

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية تحت هوس عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي تحت هوس. نوبة تحت الهوس هي حالة مزاجية متواصلة تستمر لعدة أيام على الأقل وتتميز بارتفاع معتدل في المزاج وزيادة الاستثارة والنشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام السريع أو المضغوط، تسارع الأفكار، زيادة تقدير الذات أو، ازدياد الدافع الجنسي أو زيادة المخالطة الاجتماعية، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي. الأعراض ليست شديدة بما يكفي لإحداث تدنٍ ملحوظ في الأداء المهني أو في الأنشطة الاجتماعية المعتادة أو العلاقات مع الآخرين، ولا تستلزم دخول المستشفى، ولا توجد أوهام أو هلاوس مصاحبة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية تحت هوس

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة
أو النفاس دون أعراض ذهانية
6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS
6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية
6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو
النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة
6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
6A80.0

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
6A80.4

الدوران السريع
6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، خفيف 6A60.3

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، خفيف عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب ، خفيف الشديدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة، ولكنها ليست كبيرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولا توجد أوهام أو هلاوس.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب ، خفيف

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج

6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج

6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية 6A60.4

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، معتدل دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية، ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80	أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج
6A80.0	أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
6A80.1	هجمات هلع في نوبات المزاج
6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
6A80.4	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
6A80.5	الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل مع أعراض ذهانية 6A60.5

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، معتدل الشدة مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج

6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج

6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية 6A60.6

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، شديد دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج

6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج

6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية 6A60.7

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، شديد مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

- 6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج
- 6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
- 6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج
- 6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
- 6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
- 6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
- 6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد الشدة 6A60.8

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، لكن المعلومات لا تكفي لتحديد درجة الشدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو
الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج 6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، دون أعراض ذهانية 6A60.6

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، دون وجود أوهام أو هلاوس خلال النوبة. تتميز النوبة المختلطة إما بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والاكتئاب البارزة في معظم الأيام خلال فترة أسبوع واحد على الأقل.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، مع أعراض ذهانية 6A60.A

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I ، مع وجود أوهام أو هلاوس خلال النوبة. تتميز النوبة المختلطة إما بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والاكتئاب البارزة في معظم الأيام خلال فترة أسبوع واحد على الأقل.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، النوبة الحالية مختلطة، مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة هوس أو تحت هوس 6A60.B

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة هوس أو تحت هوس عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I سابقاً، وكانت أقرب نوبة هوس أو تحت هوس. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة الهوس أو تحت الهوس مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة. في بعض الحالات، قد تكون أعراض المزاج المتبقية اكتئابية وليست هوساً أو تحت هوس، ولكنها لا تفي بالمتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة هوس أو تحت هوس لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب 6A60.C

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I سابقاً، وكانت أقرب نوبة اكتئاب. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة الاكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض الاكتئابية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة مختلطة 6A60.D

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة مختلطة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I سابقاً، وكانت أقرب نوبة مختلطة. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة المختلطة مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة مختلطة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة 6A60.E

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I سابقاً، لكن لا توجد معلومات كافية لتحديد نوع أقرب نوبة. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة المزاجية مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة كاملة 6A60.F

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط I سابقاً، ولم تتبقَّ أي من الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط I ، حالياً في هدأة كاملة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط I محدد آخر 6A60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ثنائي القطب نمط I ، غير محدد 6A60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب ثنائي القطب نمط II

الوصف:

الاضطراب ثنائي القطب نمط II هو اضطراب مزاجي نوبي يُعرّف بحدوث نوبة أو أكثر من نوبات تحت الهوس ونوبة اكتئاب واحدة على الأقل. نوبة تحت الهوس هي حالة مزاجية متواصلة، تتميز نوبة تحت الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط، وفرط النشاط أو زيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام المضغوط، تطاير الأفكار، العظمة، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي، والتي تستمر لعدة أيام على الأقل. تمثل الأعراض تغيراً عن السلوك النموذجي للفرد ولكنها ليست شديدة بما يكفي لإحداث ضعف ملحوظ في الأداء. تتميز النوبة الاكتئابية بفترة من المزاج المكتئب شبه اليومي أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة التي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل التغيرات في الشهية أو النوم، والنشاط النفسي الحركي أو البطء، والتعب، والشعور بالذنب المفرط أو غير المناسب أو انعدام القيمة، ومشاعر اليأس وصعوبة التركيز والتفكير بالانتحار. لا يوجد تاريخ من الهوس أو النوبات المختلطة.

اضطراب ثنائي القطب نمط II، النوبة الحالية تحت هوس، 6A61.0

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II، النوبة الحالية تحت هوس عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II، حيث النوبة الحالية هي تحت هوس. نوبة تحت الهوس هي حالة مزاجية متواصلة تستمر لعدة أيام على الأقل وتتميز بارتفاع معتدل في المزاج وزيادة الاستثارة والنشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة، مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكلام السريع أو المضغوط، تسارع الأفكار، زيادة تقدير الذات أو، ازدياد الدافع الجنسي أو زيادة المخالطة الاجتماعية، قلة الحاجة إلى النوم، التشتت، السلوك المتهور أو الاندفاعي. الأعراض ليست شديدة بما يكفي لإحداث تدنٍ ملحوظ في الأداء المهني أو في الأنشطة الاجتماعية المعتادة أو العلاقات مع الآخرين، ولا تستلزم دخول المستشفى،

ولا توجد أوهام أو هلاوس مصاحبة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية تحت هوس

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية

6E20 اكتئاب ما بعد الولادة NOS

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو

الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية

6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة

6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.0

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، خفيف 6A61.1

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، خفيف عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، خفيف الشديدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب

المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة، ولكنها ليست كبيرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولا توجد أوهام أو هلاوس.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، خفيف

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج 6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية 6A61.2

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، معتدل دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية، ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج 6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

6A80.1	هجمات هلع في نوبات المزاج
6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
6A80.4	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
6A80.5	الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل مع أعراض ذهانية 6A61.3

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، معتدل الشدة مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، معتدل دون أعراض ذهانية لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80	أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج
6A80.0	أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.1	هجمات هلع في نوبات المزاج
6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
6A80.4	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
6A80.5	الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية 6A61.4

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، شديد دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد دون أعراض ذهانية لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة
أو النفاس دون أعراض ذهانية

6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية

6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو
النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة

6E20.Z

أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج

6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.3

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية 6A61.5

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، شديد مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، شديد مع أعراض ذهانية لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

- 6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج
- 6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
- 6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج
- 6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
- 6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
- 6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية
- 6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد الشدة 6A61.6

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد الشدة عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II ، حيث النوبة الحالية هي اكتئاب، لكن المعلومات لا تكفي لتحديد درجة الشدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، النوبة الحالية اكتئاب، غير محدد

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

6A80 أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج

6A80.0 أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

6A80.1 هجمات هلع في نوبات المزاج

6A80.2 حالياً نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

6A80.5 الدوران السريع

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة تحت هوس 6A61.7

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة تحت هوس عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II سابقاً، وكانت أقرب نوبة تحت هوس. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة تحت الهوس مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة. في بعض الحالات، قد تكون أعراض المزاج المتبقية اكتئابية وليست هوساً أو تحت هوس، ولكنها لا تفي بالمتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة تحت هوس

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب 6A61.8

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II سابقاً، وكانت أقرب نوبة اكتئاب. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة الاكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض الاكتئابية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة اكتئاب

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة 6A61.9

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II سابقاً، لكن لا توجد معلومات كافية لتحديد نوع أقرب نوبة. لم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة المزاجية مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة غير محددة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة كاملة 6A61.A

الوصف:

يُشخص اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب ثنائي القطب نمط II سابقاً، ولم تتبقَّ أي من الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب ثنائي القطب نمط II ، حالياً في هدأة كاملة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الدوران السريع 6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط II محدد آخر 6A61.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ثنائي القطب نمط II ، غير محدد 6A61.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الوصف:

يتسم اضطراب دَوْرَوِيَّةِ الْمَزَاجِ بعدم استقرار المزاج المستمر على مدى عامين على الأقل، بما في ذلك فترات عديدة من أعراض كلاً من تحت الهوس (على سبيل المثال، النشوة، والاستثارة، أو الشطط، والنشاط النفسي الحركي) والاكئاب (على سبيل المثال، الشعور بالإحباط، وتناقص الاهتمام بالأنشطة، التعب) والتي تظهر معظم الوقت. أعراض تحت الهوس قد تكون شديدة أو متواصلة أو لا تكون بما يكفي لتلبية متطلبات التعريف الكاملة لنوبة تحت الهوس (انظر اضطراب ثنائي القطب نمط II)، ولكن لا يوجد تاريخ من الهوس أو نوبات مختلطة (انظر اضطراب ثنائي القطب نمط I). أعراض الاكتئاب لم تكن شديدة أو طويلة على الإطلاق، بما يكفي لتلبية متطلبات التشخيص لنوبة الاكتئاب (انظر اضطراب ثنائي القطب نمط II). تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو تدني كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- شَخْصِيَّةُ دَوْرَوِيَّةِ الْمَزَاج
- شَخْصِيَّةُ دَوْرَوِيَّةِ

ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة محدد آخر 6A6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة، غير محدد 6A6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات الاكتئابية

الوصف:

تتميز الاضطرابات الاكتئابية بمزاج اكتئابي (على سبيل المثال، حزين، سريع الانفعال، فارغ) أو فقدان المتعة مصحوباً بأعراض معرفية أو سلوكية أخرى، أو عصبية نباتية تؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد على الأداء. لا ينبغي تشخيص الاضطراب الاكتئابي لدى الأفراد الذين عانوا في أي وقت مضى من نوبة هوس أو نوبة مختلطة أو نوبة تحت هوس، مما قد يدل على وجود اضطراب ثنائي القطب.

مضمنة في مكان آخر:

- سوء المزاج ما قبل الطمث

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة 6A70

الوصف:

يتميز الاضطراب الاكتئابي ذو النوبة الواحدة بوجود أو تاريخ لنوبة اكتئاب واحدة عندما لا يكون هناك تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب شبه اليومي أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو الشعور بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، هياج حركي نفسي أو بطء، ونقص الطاقة أو التعب. لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات مختلطة سابقة، مما قد يشير إلى وجود اضطراب ثنائي القطب.

استثناءات:

- اضطراب اكتئابي معاود (6A71)
- اضطراب التأقلم (6B43)
- ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، خفيف 6A70.0

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، والنوبة خفيفة الشديدة. يجب ألا تظهر أي من أعراض نوبة الاكتئاب بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة، ولكنها ليست كبيرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولا توجد أوهام أو هلاوس.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، خفيف

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

6A80.1	هجمات هلع في نوبات المزاج
6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، معتدل دون أعراض ذهانية 6A70.1

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، معتدل دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، النوبة معتدلة الشدة، دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية، ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، معتدل دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة	
أو النفاس دون أعراض ذهانية	6E20
اكتئاب ما بعد الولادة NOS	6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل	
أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية	6E20.Y
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو	
النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة	6E20.Z
أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج	6A80.0
هجمات هلع في نوبات المزاج	6A80.1
حالياً نوبة اكتئاب متواصلة	6A80.2
حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية	6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، معتدل مع أعراض ذهانية 6A70.2

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، معتدل مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، النوبة معتدلة الشدة مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، معتدل مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية	6E21
أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج	6A80.0
هجمات هلع في نوبات المزاج	6A80.1
حالياً نوبة اكتئاب متواصلة	6A80.2
حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية	6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، شديد دون أعراض ذهانية 6A70.3

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، شديد دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، النوبة شديدة، دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

مُشتمَلات:

- اكتئاب جسيم وحيد النوبة دون أعراض ذهانية

- اكتئاب متهيج وحيد النوبة دون أعراض ذهانية
- اكتئاب حيوي وحيد النوبة دون أعراض ذهانية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، شديد دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، شديد مع أعراض ذهانية 6A70.4

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، النوبة شديدة، مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، شديد مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، غير محدد الشدة 6A70.5

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة، غير محدد الشدة عند استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، لكن المعلومات لا تكفي لتحديد درجة الشدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، غير محدد

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة
أو النفاس دون أعراض ذهانية
6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS
6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية
6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو
النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة
6E20.Z

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية
6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
6A80.0

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 6A80.1 | هجمات هلع في نوبات المزاج |
| 6A80.2 | حالياً نوبة اكتئاب متواصلة |
| 6A80.3 | حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية |

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة جزئية 6A70.6

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة جزئية عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب سابقاً، لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، ولم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة الاكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة جزئية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة كاملة 6A70.7

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي وحيد النوبة ، حالياً في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية لنوبة الاكتئاب سابقاً، ولم تتبقَ أي من الأعراض المزاجية الهامة. لا يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة يمكن أخذها بعين الاعتبار.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، حالياً في هدأة كاملة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة محدد آخر 6A70.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة، غير محدد 6A70.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب اكتئابي متكرر 6A71

الوصف:

يتميز الاضطراب الاكتئابي المتكرر بتاريخ أو نوبتين من الاكتئاب على الأقل تفصل بينهما عدة أشهر على الأقل دون اضطرابات مزاجية هامة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب شبه اليومي أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو الشعور بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، هياج حركي نفسي أو بطء، ونقص الطاقة أو التعب. لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات مختلطة سابقة، مما قد يشير إلى وجود اضطراب ثنائي القطب.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب اكتئابي فصلي

استثناءات:

- اضطراب اكتئابي وحيد النوبة (6A71)
- اضطراب التأقلم (6B43)
- ثنائي القطب أو الاضطرابات ذات الصلة

اضطراب اكتئابي متكرر، النوبة الحالية خفيفة 6A71.0

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، النوبة الحالية خفيفة عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، وتوجد حالياً نوبة اكتئاب خفيفة الشديدة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة، ولكنها ليست كبيرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولا توجد أوهام أو هلاوس.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، النوبة الحالية خفيفة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
6A80.4	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

اضطراب اكتئابي متكرر، النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية 6A71.1

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، وتوجد حالياً نوبة اكتئاب معتدلة الشدة، دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية، ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة	
أو النفاس دون أعراض ذهانية	6E20
اكتئاب ما بعد الولادة NOS	6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية	6E20.Y
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة	6E20.Z
أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج	6A80.0
هجمات هلع في نوبات المزاج	6A80.1
حالياً نوبة اكتئاب متواصلة	6A80.2
حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية	6A80.3
النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية	6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر، معتدل مع أعراض ذهانية 6A71.2

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، النوبة الحالية معتدلة مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، وتوجد حالياً نوبة اكتئاب معتدلة الشدة، مع وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب المعتدل، تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من الأعراض الأقل شدة على العموم. عادة ما يواجه الفرد المصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة، في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية ولكنه لا يزال قادراً على الأداء في العديد من المجالات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، معتدل مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر، شديد دون أعراض ذهانية 6A71.3

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، النوبة الحالية شديدة دون أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، وتوجد حالياً نوبة اكتئاب شديدة، دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

مُشْتَمَلَات:

- اكتئاب باطني دون أعراض ذهانية
- اكتئاب هوسي – اكتئابي، نمط اكتئابي دون أعراض ذهانية
- اكتئاب حيوي متكرر دون أعراض ذهانية
- اكتئاب جسيم متكرر دون أعراض ذهانية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، شديد دون أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

أو النفاس دون أعراض ذهانية 6E20

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20.Y

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة 6E20.Z

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية 6A80.3

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر، شديد مع أعراض ذهانية 6A71.4

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، النوبة الحالية شديدة مع أعراض ذهانية عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، وتوجد حالياً نوبة اكتئاب شديدة، دون وجود هلاوس أو أوهام خلال النوبة. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الشديد، تظهر الكثير من الأعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من الأعراض التي تتظاهر بشدة. عادة ما يكون الفرد المصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الاستمرار في الأداء في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية أو غيرها من المجالات، إلا بدرجة محدودة جداً.

مُشْتَمَلَات:

- اكتئاب باطني مع أعراض ذهانية
- اكتئاب هوسي - اكتئابي، نمط اكتئابي مع أعراض ذهانية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الاكتئابي المتكرر، الشديد مع أعراض ذهانية

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

حالياً نوبة اكتئاب متواصلة 6A80.2

6A80.3 حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.4 النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

اضطراب اكتئابي متكرر، غير محدد الشدة 6A71.5

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، غير محدد الشدة عند استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر، ويوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة، لكن المعلومات لا تكفي لتحديد درجة شدة النوبة الحالية. تتميز نوبة الاكتئاب بفترة من المزاج المكتئب أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة شبه اليومي والتي تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب المفرط أو غير المناسب أو اليأس أو الأفكار عن الموت أو الانتحار، مع تغيرات في الشهية أو النوم، وهياج أو بطء حركي نفسي، ونقص الطاقة أو التعب. في نوبة الاكتئاب الخفيفة، لا تظهر أي من الأعراض بدرجة شديدة. عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الاستمرار في العمل أو الأنشطة الاجتماعية أو المنزلية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، غير محدد

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة

6E20 أو النفاس دون أعراض ذهانية

6E20.0 اكتئاب ما بعد الولادة NOS

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل

6E20.Y أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو

6E20.Z	النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محددة
	اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21	أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية
6A80.0	أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج
6A80.1	هجمات هلع في نوبات المزاج
6A80.2	حالياً نوبة اكتئاب متواصلة
6A80.3	حالياً نوبة اكتئاب مع سوداوية
6A80.4	النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

اضطراب اكتئابي متكرر، حالياً في هدأة جزئية 6A71.6

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، حالياً في هدأة جزئية عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر سابقاً، ولم تعد المتطلبات التعريفية الكاملة الاكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، حالياً في هدأة جزئية، أقرب نوبة تحت هوس

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر، حالياً في هدأة كاملة 6A71.7

الوصف:

يُشخص الاضطراب الاكتئابي المتكرر، حالياً في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء المتطلبات التعريفية للاضطراب الاكتئابي المتكرر سابقاً، ولم تتبق أي من الأعراض المزاجية الهامة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب اكتئابي متكرر، حالياً في هدأة كاملة

لديه تظاهرات (استعمل رموزاً إضافية عند الرغبة):

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر محدد آخر 6A71.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب اكتئابي متكرر، غير محدد 6A71.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابُ سوء المزاج 6A72

الوصف:

يتسم اضطراب سوء المزاج بمزاج اكتئابي متواصل (أي يستمر لمدة عامين أو أكثر)، لمعظم اليوم، والأيام التي يحصل فيها أكثر من الأيام التي لا يحصل فيها. يمكن أن يظهر المزاج المكتئب عند الأطفال والمراهقين على أنه انفعال سائد، ويصاحب المزاج المكتئب أعراض إضافية مثل انخفاض الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة بشكل ملحوظ، وانخفاض التركيز والانتباه أو التردد، وانخفاض تقدير الذات أو الشعور بالذنب المفرط أو غير المناسب، واليأس من المستقبل، اضطراب النوم أو زيادة النوم، انخفاض أو زيادة الشهية أو انخفاض الطاقة أو التعب. خلال أول عامين من الاضطراب، لم تكن هناك فترة أسبوعين كان خلالها عدد ومدة الأعراض كافيين لتلبية متطلبات التشخيص لنوبة اكتئاب. لا يوجد تاريخ من نوبات الهوس أو المختلطة أو تحت الهوس.

مُشْتَمَلَات:

- سوء المزاج

استثناءات:

- قلق اكتئابي (خفيف أو غير متواصل)

اضطراب الاكتئاب والقلق المختلط 6A73

الوصف:

يتسم اضطراب الاكتئاب والقلق المختلط بأعراض كل من القلق والاكتئاب والتي تحصل في أيام أكثر من الأيام الخالية من الأعراض، خلال فترة أسبوعين أو أكثر. لا تعتبر أي مجموعة من الأعراض، عند يتم النظر إليها بشكل منفصل، شديدة أو عديدة أو مستمرة بما يكفي لتبرير تشخيص نوبة اكتئاب أو سوء مزاج أو اضطراب القلق أو اضطراب ذا صلة بالخوف. يجب أن يكون المزاج المكتئب أو الاهتمام المتناقص بالأنشطة مصحوباً بأعراض اكتئاب إضافية بالإضافة إلى أعراض متعددة للقلق. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات مختلطة سابقاً، مما قد يشير إلى وجود اضطراب ثنائي القطب.

اضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث GA34.41

الوصف:

خلال معظم دورات الطمث خلال العام الماضي، هناك نمط من أعراض مزاجية (مزاج مكتئب، وسرعة الانفعال)، وأعراض جسدية (خمول، وآلام في المفاصل، وإفراط في الأكل)، أو أعراض معرفية (صعوبات في التركيز، ونسيان) تبدأ عدة أيام قبل الطمث، ثم تتحسن في غضون أيام قليلة بعد بداية الطمث، ثم تصبح قليلة أو تغيب في غضون أسبوع تقريباً بعد بداية الطمث. يمكن تأكيد العلاقة الزمنية بين الأعراض والمراحل اللوتينية للدورة من خلال مذكرات الأعراض المحتملة. تكون الأعراض شديدة بما يكفي للتسبب في ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة ولا تمثل تفاقماً لاضطراب عقلي.

مُشْتَمَلَات:

- PMDD (اضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث)

استثناءات:

- متلازمة توتر ما قبل الطمث (GA34.40)

اضطراب اكتئابي محدد آخر 6A7Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

اضطراب اكتئابي، غير محدد 6A7Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

أعراض ومسار تظاهرات نوبات المزاج في اضطرابات المزاج 6A80

الوصف:

يمكن تطبيق هذه الفئات لوصف تظاهرات وخصائص نوبات المزاج في سياق الاضطراب الاكتئابي ذو النوبة الواحدة، أو الاضطراب الاكتئابي المتكرر، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط I، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط II. تشير هذه الفئات إلى وجود سمات محددة ومهمة للمظهر السريري أو لمسار الاضطراب، أو بداية وشكل نوبات المزاج. هذه الفئات ليست حصرية، ويمكن إضافة العديد منها حسب ما تقتضي الحاجة.

مضمنة في مكان آخر:

- الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية (6E20)
- الاضطرابات العقلية أو السلوكية المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية (6E21)

ملاحظة للترميز:

لا ينبغي أبداً استخدام هذه الفئات للترميز الأساسي. تم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عند الرغبة في تحديد سمات معينة سريرية لنوبات المزاج في اضطرابات المزاج.

أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج 6A80.0

الوصف:

في سياق نوبة الاكتئاب أو الهوس أو تحت الهوس الحالية، توجد أعراض قلق بارزة وهامة سريرياً في معظم الأوقات خلال الأسبوعين الماضيين (على سبيل المثال، الشعور بالتوتر أو القلق، أو عدم القدرة على التحكم في الأفكار المقلقة، أو الخوف من حدوث شيء فظيع، أو وجود مشكلة في الاسترخاء، والتوتر الحركي، وأعراض الجهاز العصبي الذاتية). إذا كانت هناك نوبات هلع أثناء نوبة اكتئاب أو نوبة مختلطة حالية، فيجب تسجيلها بشكل منفصل. عند استيفاء المتطلبات التشخيصية لكل من اضطراب المزاج والقلق أو اضطراب ذا صلة بالخوف، ينبغي أيضاً تشخيص القلق أو الاضطراب ذا الصلة بالخوف.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى أعراض قلق بارزة في نوبات المزاج

يوجد حالة مُسَبَّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

هجمات هلع في نوبات المزاج 6A80.1

الوصف:

في سياق نوبة مزاجية حالية (هوس، اكتئاب، مختلطة، تحت هوس)، حصلت هجمات هلع متكررة (على سبيل المثال، اثنتان على الأقل) خلال الشهر الماضي والتي تحدث بشكل خاص استجابة للمعرفة المثيرة للقلق والذي يعتبر من سمات نوبة المزاج. إذا حدثت نوبات الهلع بشكل حصري استجابة لمثل هذه الأفكار، فيجب تسجيل نوبات الهلع باستخدام هذا الوصف بدلاً من تعيين تشخيص إضافي متزامن لاضطراب الهلع. إذا كانت بعض هجمات الهلع في سياق نوبة الاكتئاب أو النوبة المختلطة غير

متوقعة وليست استجابة حصرية للأفكار الاكتئابية أو المثيرة للقلق، فيجب وضع تشخيص منفصل لاضطراب الهلع.

الاستثناءات:

- اضطراب الهلع (6B01)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى هجمات هلع في نوبات المزاج

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَّمز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نوبة اكتئاب حالية متواصلة 6A80.2

الوصف:

يتم حالياً استيفاء المتطلبات التشخيصية لنوبة الاكتئاب وتم استيفائها باستمرار على مدار العامين الماضيين على الأقل.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة اكتئاب حالية متواصلة

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَّمز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية 6A80.3

الوصف:

في سياق نوبة الاكتئاب الحالية، ظهرت العديد من الأعراض التالية خلال أسوأ فترة خلال الشهر الماضي: فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة التي عادة ما تكون ممتعة للفرد (أي فقد اللذة السائد)؛ افتقاد التفاعل العاطفي مع المحفزات أو الظروف الممتعة بشكل طبيعي (أي أن المزاج لا يتحسن حتى بشكل عابر مع مثل هذه الظروف السارة)؛ الأرق الختامي (أي الاستيقاظ في الصباح قبل ساعتين أو أكثر من الوقت المعتاد)؛ أعراض الاكتئاب أسوأ في الصباح. البطء النفسي الحركي أو الهياج؛ فقدان ملحوظ للشهية أو فقدان الوزن.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية 6A80.4

الوصف:

في سياق الاضطراب الاكتئابي المتكرر، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط ا، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط اا، كان هناك نمط موسمي منتظم لبداية وهدة نوع واحد على الأقل من النوبات (أي، نوبات الاكتئاب، الهوس، المختلطة، أو تحت الهوس)، حيث الغالبية العظمى من نوبات المزاج تتوافق مع النمط الموسمي. (في الاضطراب ثنائي القطب نمط ا، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط اا، قد لا تتبع جميع أنواع نوبات الحالة المزاجية هذا النمط). يجب التمييز بين النمط الموسمي والنوبة المصادفة

لموسم معين والمرتبطة في الغالب بضغط نفسي تحدث بانتظام في ذلك الوقت من العام (مثل البطالة الموسمية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الموسمي لبداية نوبة الحالة المزاجية

يوجد حالة مُسَبِّبة (رّمز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الدوران السريع 6A80.5

الوصف:

في سياق الاضطراب ثنائي القطب نمط ا، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط اا، كان هناك تكرار كبير لنوبات المزاج (على الأقل أربع نوبات) على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. قد يكون هناك تحول من قطب مزاجي إلى آخر، أو قد يتم الفصل بين نوب المزاج بفترات من الهدأة. في الأفراد الذين يعانون من نوبات مزاجية مرتفعة التواتر، قد يكون لدى بعضهم فترات أقصر من تلك التي يتم ملاحظتها عادةً في الاضطراب ثنائي القطب نمط ا، أو الاضطراب ثنائي القطب نمط اا. قد تستمر فترات الاكتئاب لعدة أيام فقط على وجه الخصوص. إذا تبدلت أعراض الاكتئاب والهوس بسرعة كبيرة (أي من يوم لآخر أو في نفس اليوم)، فيجب تشخيص النوبة المختلطة بدلاً من الدوران السريع.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الدوران السريع

يوجد حالة مُسَبِّبة (رّمز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية 6E20

الوصف:

متلازمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون 6 أسابيع تقريباً بعد الولادة) والتي تنطوي على سمات عقلية وسلوكية كبيرة، وأكثرها شيوعاً أعراض الاكتئاب. لا تشمل المتلازمة أوهام أو هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. إذا كانت الأعراض تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب عقلي معين، فيجب أيضاً وضع هذا التشخيص. لا ينبغي استخدام هذا التعيين لوصف أعراض اكتئاب خفيفة وعابرة لا تفي بالمتطلبات التشخيصية لنوبة اكتئاب، والتي قد تحدث بعد الولادة بفترة وجيزة (ما يسمى كآبة ما بعد الولادة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اكتئاب ما بعد الولادة NOS 6E20.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اكتئاب ما بعد الولادة NOS

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية محددة
أخرى 6E20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية، غير
محددة 6E20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية 6E21

الوصف:

متلازمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون 6 أسابيع تقريباً بعد الولادة) والتي تنطوي على سمات عقلية وسلوكية كبيرة، والتي تشمل أوهام أو هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. عادة ما تظهر أعراض الحالة المزاجية (الاكتئاب و / أو الهوس). إذا كانت الأعراض تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب عقلي معين، فيجب أيضاً وضع هذا التشخيص.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية

يوجد حالة مُسَبِّبة (رَمَز أيضاً)

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات المزاج المُحدّثة بالمواد

اضطراب مزاج مُحدّث بالكحول 6C40.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدّث بالكحول بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث الأعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدّث بالكحول

لديه حالة مسببة (رمزياً):

6C40.0

نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسحاب بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب مزاج مُحدَث بالحشيش 6C41.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بالحشيش بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي

6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هداة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هداة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هداة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C41.3	الانسمام بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكنايينويد الصناعي 6C42.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحَدَّث بالكنايينويد الصناعي بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكنايينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكنايينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكنايينويد الصناعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكنايينويد الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكنايينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكنايينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالكناابينويد الصناعي
لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكناابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكناابينويد الصناعي

اضطراب مزاج مُحدَّث بالأفيون 6C43.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالأفيون بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C43.1 نمط ضار من استعمال الأفيون
- 6C43.10 نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
- 6C43.11 نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
- 6C43.1Z نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
- 6C43.2 الاعتماد على الأفيون
- 6C43.20 الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
- 6C43.21 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
- 6C43.22 الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
- 6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
- 6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رَّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب مزاج مُحدَث بالكوكائين 6C45.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بالكوكائين بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين (6C45.70)
- اضطراب مزاج مُحدَّث بالكاثينون الصناعي (6C47.70)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

اضطراب مزاج مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بالكاثينون الصناعي بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.60

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهلوسات بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات

6C49.10 نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي

6C49.11 نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر

6C49.1Z نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

6C49.2 الاعتماد على المهلوسات

6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
6C49.2Z	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسمام بالمهلوسات

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطيارة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطيارة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطيارة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة 6C49.22

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة 6C4B.23

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمستنشقات الطيارة 6C4B.3

سحب المستنشقات الطيارة 6C4B.4

اضطراب مزاج مُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C4C.0 | نوبة من الاستعمال الضار MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |
| 6C4C.1 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |
| 6C4C.10 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي |
| 6C4C.11 | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر |
| 6C4C.1Z | نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد |
| 6C4C.2 | الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA |

- 6C4C.20 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي
- 6C4C.21 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4C.22 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة جزئية مستدامة
- 6C41.23 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4C.2Z الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال العقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال العقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ

من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال العقاقير المُفارقة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

متلازمة مزاج ثانوية 6E62

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض مزاجية بارزة (مثل الاكتئاب، والمزاج المرتفع والمتهيج) والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض المزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)

- اضطرابات التأقلم (6B43)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة المزاج الثانوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض اكتئابية 6E62.0

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض اكتئابية بارزة (مثل الحالة المزاجية المكتئبة باستمرار، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقاً، أو ظهور علامات كالمظهر الباكي أو الهامد) والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض المزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات:

• هذيان (6D70)

• اضطرابات التأقلم (6B43)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض اكتئابية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض هوس 6E62.1

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض هوس بارزة (مثل حالة المزاج المرتفعة أو المتهيجة والتغيرات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج)، وزيادة النشاط أو الطاقة) والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية.

مُشْتَمَلَات:

- متلازمة مزاج بسبب اضطرابات أو أمراض لا تصنف ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، مع أعراض الهوس

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)

- اضطرابات التأقلم (6B43)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض هوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض مختلطة 6E62.2

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود وجود كل من أعراض الهوس والاكتئاب، إما تحدث معاً أو بالتناوب من يوم لآخر أو خلال اليوم والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. أعراض الهوس قد تشمل حالة المزاج المرتفعة أو المتهيجة والتغيرات السريعة بين حالات المزاج المختلفة (أي تقلب المزاج)، وزيادة النشاط أو الطاقة). أعراض الاكتئاب قد تشمل الحالة المزاجية المكتئبة باستمرار، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقاً، أو ظهور علامات كالمظهر الباهي أو الهامد. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض المزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

• هذيان (6D70)

• اضطرابات التأقلم (6B43)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض غير محددة 6E62.3

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة مزاج ثانوية، مع أعراض غير محددة

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب مزاج محدد آخر 6A7Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

اضطراب مزاج، غير محدد 6A7Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

اضطرابات القلق والاضطرابات ذات الصلة بالخوف

الوصف:

يتسم القلق والاضطرابات ذات الصلة بالخوف بظهور القلق والخوف المفرط والاضطرابات السلوكية ذات الصلة، مع أعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. الخوف والقلق ظاهرتان متصلتان ببعضهما البعض؛ يمثل الخوف رد فعل على التهديد الوشيك المتصور في الوقت الحاضر، على حين أن القلق موجه أكثر نحو المستقبل، في إشارة إلى التهديد المتوقع. من السمات الرئيسية التي تميز بين القلق والاضطرابات ذات الصلة بالخوف بؤر القلق الخاصة بالاضطراب، أي المحفز أو الموقف الذي يثير الخوف أو القلق. يتضمن المظهر السريري للقلق والاضطرابات ذات الصلة بالخوف بشكل نموذجي إدراكات محددة مرتبطة يمكن أن تساعد في التمييز بين الاضطرابات من خلال توضيح بؤرة القلق.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطرابات القلق المحدثة بالمواد
- المراق، توهم المرض (6B23)
- متلازمة قلق ثانوية (6E63)

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المعمم بأعراض ملحوظة للقلق تستمر لعدة أشهر على الأقل، والأيام التي تحصل فيها أعراض القلق تكون أكثر من الأيام الخالية من هذه الأعراض، ويتجلى ذلك إما بالتوجس العام (أي "القلق العائم") أو الجزع المفرط الذي يركز على أحداث يومية متعددة، وغالباً ما تكون متعلقة بالأسرة، والصحة، والشؤون المالية، والمدرسة أو العمل، إلى جانب أعراض إضافية مثل التوتر العضلي أو الاستثارة الحركية، أو النشاط الزائد للجهاز العصبي الودي اللاإرادي، أو الخبرة الذاتية للمزاج العصبي، أو صعوبة الحفاظ على التركيز، أو التهيج، أو اضطراب النوم. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. الأعراض ليست مظهراً من مظاهر حالة صحية أخرى وليست نتيجة لتأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المعمم

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

اضطراب الهلع 6B01

الوصف:

يتسم اضطراب الهلع بهجمات هلع متكررة غير متوقعة لا تقتصر على منبهات أو مواقف معينة. هجمات الهلع هي نوبات متميزة من الخوف أو القلق الشديد مصحوبة ببداية سريعة ومتزامنة للعديد من الأعراض المميزة (على سبيل المثال، خفقان القلب أو زيادة معدل ضربات القلب، والتعرق، والارتجاف، وضيق التنفس، وألم الصدر، والدوخة أو الدوار، والقشعريرة، والهبات الساخنة، والخوف من الموت الوشيك). بالإضافة إلى ذلك، يتسم اضطراب الهلع بالقلق المستمر بشأن تكرار أو خطورة هجمات الهلع، أو السلوكيات التي تهدف إلى تجنب تكرارها، والتي تؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. الأعراض ليست مظهراً من مظاهر حالة صحية أخرى وليست نتيجة لتأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي.

الاستثناءات :

- هجمات الهلع MB23.H

الوصف:

يتسم رهاب الساح بالخوف أو القلق الملحوظ والمفرط الذي يحدث استجابة لمواقف متعددة حيث قد يكون الهروب صعباً أو قد لا تكون المساعدة متاحة، مثل استخدام وسائل النقل العام، أو التواجد في الزحام، أو التواجد خارج المنزل وحيداً (على سبيل المثال، في المتاجر، المسارح والوقوف في الطابور). يشعر الفرد بالقلق المستمر بشأن هذه المواقف بسبب الخوف من نتائج سلبية محددة (على سبيل المثال، هجمات الهلع، وغيرها من الأعراض الجسدية المسببة للعجز أو الإحراج). يتم تجنب المواقف بشكل فعال، ولا يتم التعرض لهذه المواقف إلا في ظل ظروف محددة مثل وجود رفيق موثوق به، أو تحمل الخوف أو القلق الشديد. تستمر الأعراض لعدة أشهر على الأقل، وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب رهاب الساح

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

الرهاب المحدد 6B03

الوصف:

يتسم الرهاب المحدد بالخوف أو القلق الملحوظ والمفرط الذي يحدث باستمرار عند التعرض لواحد أو أكثر من الأشياء أو المواقف المحددة (على سبيل المثال، القرب من حيوانات معينة أو الطيران أو الارتفاعات أو الأماكن المغلقة أو رؤية الدم أو الإصابة) بما لا يتناسب مع الخطر الفعلي. يتم تجنب الأشياء أو المواقف الرهابية أو تحملها مع خوف أو قلق شديد. تستمر الأعراض لعدة أشهر على الأقل وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- رهاب الاحتجاز
- رهاب بسيط
- رهاب المرتفعات

الاستثناءات:

- اضطراب صورة الجسد (6B21)
- داء المراق (6B23)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المعمم

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

الوصف:

يتسم اضطراب القلق الاجتماعي بالخوف أو القلق الملحوظ والمفرط الذي يحدث باستمرار في موقف أو أكثر من المواقف الاجتماعية مثل التفاعلات الاجتماعية (على سبيل المثال، إجراء محادثة)، أو أن يكون تحت الملاحظة (مثل الأكل أو الشرب)، أو الأداء أمام الآخرين (على سبيل المثال، إلقاء خطاب). يشعر الفرد بالقلق من أنه سيتصرف بطريقة ما سيظهر عليه أعراض القلق، والتي سيتم تقييمها بشكل سلبي من قبل الآخرين. يتم تجنب المواقف الاجتماعية باستمرار أو تحملها مع الخوف أو القلق الشديد. تستمر الأعراض لعدة أشهر على الأقل وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- رهاب البشر

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق الاجتماعي

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

اضطراب قلق الانفصال 6B05

الوصف:

يتسم اضطراب قلق الانفصال بالخوف الملحوظ والمفرط أو القلق بشأن الانفصال عن شخصيات مُتعلّق بها محددة. عند الأطفال، يركّز قلق الانفصال عادةً على مقدمي الرعاية أو الآباء أو أفراد الأسرة الآخرين؛ عند البالغين يكون شريكاً رومانسياً أو أطفالاً. قد تشمل مظاهر قلق الانفصال أفكاراً عن الأذى أو الأحداث غير المرغوبة التي قد تصيب شخصيات مُتعلّق بها، والإحجام عن الذهاب إلى المدرسة أو العمل، وتكرار الضيق المفرط عند الانفصال، والإحجام أو رفض النوم بعيداً عن شخصيات مُتعلّق بها، وكوابيس متكررة حول الانفصال. تستمر الأعراض لعدة أشهر على الأقل وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الاستثناءات:

- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)
- الصمت الانتقائي (6B06)
- اضطراب القلق الاجتماعي (B046)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب قلق الانفصال

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

الوصف:

يتميز الصمت الانتقائي بالانتقائية الثابتة في الكلام، بحيث يُظهر الطفل الكفاءة اللغوية الكافية في مواقف اجتماعية محددة، عادةً في المنزل، ولكنه يفشل باستمرار في التحدث في المواقف الأخرى، عادةً في المدرسة. يستمر الاضطراب لمدة شهر واحد على الأقل، ولا يقتصر على الشهر الأول من المدرسة، ويكون من الأهمية الكافية للتداخل مع التحصيل الدراسي أو المهني أو التواصل الاجتماعي. لا يرجع الفشل في الكلام إلى نقص المعرفة أو الراحة مع اللغة المنطوقة المطلوبة في الموقف الاجتماعي (على سبيل المثال، لغة مختلفة يتم التحدث بها في المدرسة عن تلك التي يتم التحدث بها في المنزل).

الاستثناءات:

- الفُصام (6A20)
- الصمت العابر كجزء من القلق الاجتماعي عند الأطفال الصغار (6B05)
- اضطراب طيف التوحد (6A02)

اضطرابات القلق المُحدّثة بالمواد

اضطراب قلق مُحدّث بالكحول 6C40.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدّث بالكحول بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدّث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0

نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب قلق مُحَدَّث بالحشيش 6C41.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالحشيش بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي

- 6C41.21 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C41.22 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C41.23 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C41.2Z الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C41.3 الانسمام بالحشيش
- 6C41.4 سحب الحشيش

اضطراب قلق مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالكانابينويد الصناعي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصناعي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3

الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4

سحب الكانابينويد الصناعي

اضطراب قلق مُحدَّث بالأفيون 6C43.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالأفيون بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رمزياً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة

6C43.22 الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة

6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة

6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب قلق مُحدَث بالكوكائين 6C45.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بالكوكائين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالكوكائين
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون 6C46.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب قلق مُحدَّث بالكوكائين (6C45.71)
- اضطراب قلق مُحدَّث بالكائينون الصناعي (6C47.71)
- اضطراب قلق مُحدَّث بالكافيين (6C48.40)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب قلق مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالكاثينون الصناعي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب قلق مُحدَّث بالكافايين 6C48.40

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالكافايين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكافايين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكافايين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكافايين قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكافايين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكافايين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكافايين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالكافايين

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للكافايين 6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافايين 6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافايين، نوبي 6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافايين، مستمر 6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافايين، غير محدد 6C48.1Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكافايين 6C48.2

اضطراب قلق مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.61

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالمهلوسات بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي 6C49.10

نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر 6C49.11

6C49.1Z نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

6C49.2 الاعتماد على المهلوسات

6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

6C49.21 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة

6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسمام بالمهلوسات

اضطراب قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطيارة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطيارة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود

مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطيارة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالمستنشقات الطيارة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4B.0	نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة
6C4B.1	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة
6C4B.10	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر
6C4B.1Z	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد
6C4B.2	الاعتماد على المستنشقات الطيارة
6C4B.20	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطيارة
6C4B.4	سحب المستنشقات الطيارة

اضطراب قلق مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4C.0	نوبة من الاستعمال الضار MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.1	نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.10	نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي
6C4C.11	نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر
6C4C.1Z	نمط ضار من استعمال MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد
6C4C.2	الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.20	الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي

- 6C4C.21 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4C.22 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة جزئية مستدامة
- 6C41.23 الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4C.2Z الاعتماد على MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطراب قلق مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.61

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال العقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال العقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال العقاقير المُفارقة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطراب قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C4E.0 | نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي |
| 6C4E.1 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي |
| 6C4E.10 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي |
| 6C4E.11 | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر |
| 6C4E.1Z | نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد |

6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4E.3 الانسجام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب قلق مُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير نفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

داء المراق (توهم المرض) 6B23

الوصف:

يتميز داء المراق بالانشغال المستمر أو الخوف من احتمال الإصابة بواحد أو أكثر من الأمراض الخطيرة أو المترقية أو التي تهدد الحياة. يرتبط الانشغال بسوء تفسير كارثي للعلامات أو الأعراض الجسدية، بما في ذلك الأحاسيس الطبيعية أو الشائعة، ويتجلى إما في السلوكيات المتكررة والمفرطة المتعلقة بالصحة أو في سلوكيات التجنب غير القادرة على التكيف المتعلقة بالصحة. إن الانشغال أو الخوف ليس مجرد قلق معقول يتعلق بسياق معين للمريض، ويستمر أو يتكرر على الرغم من التقييم الطبي المناسب والطمأنة. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- عَصَابٌ مُرَاقٍ
- رُهابُ المَرَضِ
- اضطراب قلق المرض

الاستثناءات :

- اضطراب صورة الجسد (6B21)
- اضطراب الضائقة الجسدية (6C20)
- الخوف من السرطان (MG24.0)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى داء المراق

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

داء المراق (توهم المرض) مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B23.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لداء المراق. في كثير من الأحيان، يكون الفرد قادراً على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالاضطراب قد لا تكون صحيحة، وهو على استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. في أوقات محدودة (على سبيل المثال، عندما يكون شديد القلق)، قد لا يظهر الفرد أي بصيرة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى داء المراق مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

داء المراق (توهم المرض) مع فقر إلى غياب البصيرة 6B23.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لداء المراق. في كل الأحيان أو معظمها، يكون الفرد مقتنعاً بأن معتقداته الخاصة بالاضطراب صحيحة، وليس لديه أي استعداد لقبول أي تفسير بديل لتجربته. فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد لا يتغير بشكل ملحوظ تبعاً لمستوى القلق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى داء المراق مع فقر إلى غياب البصيرة

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

داء المراق (توهم المرض)، غير محدد 6B23.Z

الوصف:

هذه الفئة " غير محددة " متبقية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى داء المراق، غير محدد

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

هجمات الهلع MB23.H

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض قلق بارزة والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، أعراض قلق أو هجمات هلع استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض القلق شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

• هذيان (6D70)

• اضطرابات التأقلم (6B43)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة قلق ثانوية

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف محدد آخر 6B0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، غير محدد 6B0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة 6B23

الوصف:

الوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة هي مجموعة من الاضطرابات التي تتميز بالأفكار والسلوكيات المتكررة التي يُعتقد أنها تشترك في أوجه التشابه في المسببات والمدققات التشخيصية الرئيسية. الظواهر المعرفية مثل الوسواس والأفكار المقتحمة والانشغالات تكون جوهرية لتشخيص مجموعة فرعية من هذه الحالات (مثل، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب صورة الجسد، داء المراق، والاضطراب المرجعي الشعي) ويصاحبها سلوكيات متكررة ذات صلة. لا يرتبط اضطراب الاكتناز بأفكار مقتحمة غير مرغوب فيها ولكنه يتميز بالحاجة القهرية لمراكمة الممتلكات والضيق المتعلق عند التخلص منها. كما يتم أيضاً تضمين اضطرابات السلوك المتكرر التي تركز على الجسد في المجموعة، والتي تتميز في المقام الأول بأفعال متكررة واعتيادية موجهة للجسد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد) وتفتقر إلى الجانب المعرفي البارز. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة المحدثة بالمواد
- الوسواس القهري الثانوي أو المتلازمة ذات الصلة
- متلازمة توريت (8A05.00)

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري بوجود وساوس أو أفعال قهرية مستمرة أو الاثنين معاً. الوسواس هي أفكار أو صور أو إلحاحات / دوافع متكررة ومستمرة مقتحمة وغير مرغوب فيها وترتبط عادةً بالقلق. يحاول الفرد تجاهل أو قمع الوسواس أو تحييدها عن طريق الأفعال القهرية. الأفعال القهرية هي سلوكيات متكررة بما في ذلك الأفعال العقلية المتكررة التي يشعر الفرد أنه مدفوع لأدائها استجابة لوسواس، وفقاً لقواعد صارمة، أو لتحقيق شعور "بالاكتمال". من أجل تشخيص اضطراب الوسواس القهري، يجب أن تكون الوسواس والأفعال القهرية مضيعة للوقت (على سبيل المثال، تستغرق أكثر من ساعة في اليوم)، وتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غير ذلك مجالات مهمة من الأداء.

مُشْتَمَلَات:

- عصاب وسواسي

- عصاب وسواس – قهري

استثناءات:

- سلوك وسواسي قهري (MB23.4)

اضطراب الوسواس القهري مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B20.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لاضطراب الوسواس القهري. في كثير من الأحيان، يكون الفرد قادراً على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالاضطراب قد لا تكون صحيحة، وهو على استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. في أوقات محدودة (على سبيل المثال، عندما يكون شديد القلق)، قد لا يظهر الفرد أي بصيرة.

اضطراب الوسواس القهري مع فقر إلى غياب البصيرة 6B20.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لاضطراب الوسواس القهري. في كل الأحيان أو معظمها، يكون الفرد مقتنعاً بأن معتقداته الخاصة بالاضطراب صحيحة، وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد لا يتغير بشكل ملحوظ تبعاً لمستوى القلق.

اضطراب الوسواس القهري، غير محدد 6B20.Z

هذه الفئة "غير محددة" متبقية.

الوصف:

يتسم اضطراب صورة الجسد بالانشغال المستمر بواحد أو أكثر من العيوب أو النقائص المتصورة في المظهر، والتي تكون إما غير ملحوظة أو ملحوظة قليلاً للآخرين. يختبر الأفراد الوعي الذاتي المفرط، وغالباً مع أفكار مرجعية (أي الاقتناع بأن الناس يلاحظون أو يحكمون أو يتحدثون عن العيب أو النقص المتصور). استجابةً لانشغالهم، ينخرط الأفراد في سلوكيات متكررة ومفرطة تشمل الفحص المتكرر لمظهر أو شدة الخلل أو العيب المتصور، أو المحاولات المفرطة لتمويه أو تغيير العيب المتصور، أو التجنب الملحوظ للمواقف الاجتماعية أو المحفزات التي تزيد من الضيق حول العيب أو النقص المتصور. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

استثناءات:

- فقد الشهية العصبي (6B80)
- اضطراب الضائقة الجسدية (6C20)
- قلق حول مظهر الجسم (QD30-QD3Z)

اضطراب صورة الجسد مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B21.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لاضطراب صورة الجسد. في كثير من الأحيان، يكون الفرد قادراً على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالاضطراب قد لا تكون صحيحة، وهو على استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. في أوقات محدودة (على سبيل المثال، عندما يكون شديد القلق)، قد لا يظهر الفرد أي بصيرة.

اضطراب صورة الجسد مع فقر إلى غياب البصيرة 6B21.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريف لاضطراب صورة الجسد. في كل الأحيان أو معظمها، يكون الفرد مقتنعاً بأن معتقداته الخاصة بالاضطراب صحيحة، وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد لا يتغير بشكل ملحوظ تبعاً لمستوى القلق.

اضطراب صورة الجسد، غير محدد 6B21.Z

هذه الفئة "غير محددة" متبقية.

الوصف:

يتميز الاضطراب المرجعي الشبي بالانشغال المستمر بالاعتقاد بأن المرء تنبعث منه رائحة جسم أو نفس كريهة أو بشعة، والتي تكون إما غير ملحوظة أو يمكن ملاحظتها قليلاً من قبل الآخرين. يختبر الأفراد وعياً ذاتياً مفرطاً بشأن الرائحة المحسوسة، غالباً مع أفكار مرجعية (أي الاقتناع بأن الناس يلاحظون الرائحة أو يحكمون عليها أو يتحدثون عنها). استجابةً لانشغالهم، ينخرط الأفراد في سلوكيات متكررة ومفرطة مثل التحقق المتكرر من رائحة الجسم أو التحقق من المصدر المتصور للرائحة، أو السعي المتكرر للحصول على طمأنة، أو محاولات مفرطة للتنمويه، أو تغيير، أو منع الرائحة المتصورة، أو التجنب الملحوظ للمواقف الاجتماعية أو المحفزات التي تزيد من القلق بشأن الرائحة الكريهة أو البشعة. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الاضطراب المرجعي الشبي مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B22.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات لتعريف الاضطراب المرجعي الشبي في كثير من الأحيان، يكون الفرد قادراً على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالاضطراب قد لا تكون صحيحة، وهو على استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. في أوقات محدودة (على سبيل المثال، عندما يكون شديد القلق)، قد لا يظهر الفرد أي بصيرة.

الاضطراب المرجعي الشبي مع فقر إلى غياب البصيرة 6B22.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات لتعريف الاضطراب المرجعي الشبي. في كل الأحيان أو معظمها، يكون الفرد مقتنعاً بأن معتقداته الخاصة بالاضطراب صحيحة، وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد لا يتغير بشكل ملحوظ تبعاً لمستوى القلق.

الاضطراب المرجعي الشبي، غير محدد 6B22.Z

هذه الفئة "غير محددة" متبقية.

الوصف:

يتميز داء المراق بالانشغال المستمر أو الخوف من احتمال الإصابة بواحد أو أكثر من الأمراض الخطيرة أو المترقية أو التي تهدد الحياة. يرتبط الانشغال بسوء تفسير كارثي للعلامات أو الأعراض الجسدية، بما في ذلك الأحاسيس الطبيعية أو الشائعة، ويتجلى إما في السلوكيات المتكررة والمفرطة المتعلقة بالصحة أو في سلوكيات التجنب غير القادرة على التكيف المتعلقة بالصحة. إن الانشغال أو الخوف ليس مجرد قلق معقول يتعلق بسياق معين للمريض، ويستمر أو يتكرر على الرغم من التقييم الطبي المناسب والطمأنة. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- عَصَابٌ مُرَاقٍ
- رُهابُ المَرَضِ
- اضطراب قلق المرض

الاستثناءات :

- اضطراب صورة الجسد (6B21)
- اضطراب الضائقة الجسدية (6C20)
- الخوف من السرطان (MG24.0)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى داء المراق

لديه تظاهرات (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

MB23.H

هجمات الهلع

اضطراب الاكتناز 6B24

الوصف:

يتسم اضطراب الاكتناز بمراكمة الأغراض بسبب الاقتناء المفرط لها أو صعوبة التخلص منها، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. يتميز الاقتناء المفرط بالحوافز أو السلوكيات المتكررة المتعلقة بتكديس المواد أو شرائها. تتميز صعوبة التخلص من الأغراض بالحاجة المتصورة لحفظ الأشياء والضيق المرتبط بالتخلص منها. يؤدي تراكم الأغراض إلى التشوش في مساحات المعيشة لدرجة تجعل من استخدامها معرضة للخطر. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب الاكتناز مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B24.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات لتعريف اضطراب الاكتناز. في كثير من الأحيان، يكون الفرد قادراً على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالاضطراب قد لا تكون صحيحة، وهو على استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. في أوقات محدودة (على سبيل المثال، عندما يكون شديد القلق)، قد لا يظهر الفرد أي بصيرة.

اضطراب الاكتناز مع فقر إلى غياب البصيرة 6B24.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات لتعريف اضطراب الاكتناز. في كل الأحيان أو معظمها، يكون الفرد مقتنعاً بأن معتقداته الخاصة بالاضطراب صحيحة، وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته. فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد لا يتغير بشكل ملحوظ تبعاً لمستوى القلق.

اضطراب الاكتناز، غير محدد 6B24.Z

هذه الفئة "غير محددة" متبقية.

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25

الوصف:

تتسم الاضطرابات السلوكية المتكررة التي تركز على الجسد بأفعال متكررة واعتيادية موجهة للجسد (مثل نتف الشعر، كشط الجلد، عض الشفاه)، مصحوبة عادةً بمحاولات فاشلة لتقليل أو إيقاف السلوك المعني، والتي تؤدي إلى عواقب جلدية (على سبيل المثال، تساقط الشعر، الآفات الجلدية، سحجات الشفاه). قد يحدث السلوك في نوبات وجيزة متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواتراً ولكن أكثر استدامة. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

هوس نتف الأشعار 6B25.0

الوصف:

يتسم هوس نتف الشعر بنتفٍ متكررٍ لشعر المرء يؤدي إلى تساقط كبيرٍ للشعر، مصحوباً بمحاولات فاشلة لتقليل السلوك أو إيقافه. قد يحدث نتف الشعر في أي منطقة من الجسم ينمو فيها الشعر ولكن أكثر المواقع شيوعاً هي فروة الرأس والحاجبين والجفون. قد يحدث نتف الشعر في نوبات وجيزة متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواتراً ولكن أكثر استدامة. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشْتَمَلَات:

- انتزاع الشعر القهري

استثناءات:

(6A06)

- اضطراب الحركة النمطي مع نتف الشعر

اضطراب كشط الجلد 6B25.1

الوصف:

يتسم اضطراب كشط الجلد بالكشط المتكرر لجلد الشخص نفسه مما يؤدي إلى حدوث آفات جلدية، مصحوباً بمحاولات فاشلة لتقليل السلوك أو إيقافه. المواقع الأكثر شيوعاً التي يتم اختيارها هي الوجه والذراعين واليدين، لكن العديد من الأفراد يختارون الكشط من مواقع متعددة للجسم. قد يحدث كشط الجلد في نوبات وجيزة متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواتراً ولكن أكثر استدامة. تؤدي الأعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد، غير محدد 6B25.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة المحدثة بالمواد

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين 6C45.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بالكوكائين إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادةً ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من الكوكائين، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تتميز الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0

نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون 6C46.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين (6C45.72)
- متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحدثة بالكائينون الصناعي (6C47.72)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاينون

لديه حالة مسببة (رّمزاً أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحدّثة بالكاثينون الصناعي 6C47.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بالكاثينون الصناعي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادةً ما تكون مصحوبةً بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أُضِف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة غير المعروفة، أو غير المحددة ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4E.4Z

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد محددة متعددة 6C4F.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد محددة متعددة إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من المواد المحددة المتعددة. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسحاب بمواد محددة متعددة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد المحددة المتعددة قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المواد المحددة المتعددة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المواد المحددة المتعددة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المواد المحددة المتعددة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد محددة متعددة
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمواد المحددة المتعددة 6C4F.0

- 6C4F.1 نمط ضار من استعمال المواد المحددة المتعددة
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال المواد المحددة المتعددة، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال المواد المحددة المتعددة، مستمر
- 6C4F.1Z نمط ضار من استعمال المواد المحددة المتعددة، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على المواد المحددة المتعددة
- 6C4F.20 الاعتماد على المواد المحددة المتعددة، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على المواد المحددة المتعددة، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4F.22 الاعتماد على المواد المحددة المتعددة، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4F.23 الاعتماد على المواد المحددة المتعددة، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على المواد المحددة المتعددة، غير محدد

متلازمة وسواس قهري ثانوية أو متلازمة ذات صلة 6E64

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود وسواس بارزة، أو أفعال قهرية، أو انشغال بالمظهر، أو اكتناز، أو كشط الجلد، أو نتف الشعر، أو سلوكيات متكررة أخرى تركز على الجسم، أو أعراض أخرى مميزة للوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة، والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، اجترار الأفكار استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض المزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي (6C4E.72)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة وسواس قهري ثانوية أو متلازمة ذات صلة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متلازمة توريت 8A05.00

الوصف:

متلازمة توريت هي اضطراب عرّة مزمن يتميز بوجود عرات حركية وصوتية (لفظية) مزمنة، مع ظهور خلال فترة النمو. يتم تعريف العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة. لوضع تشخيص متلازمة توريت، يجب أن تكون كلاً من العرات الحركية والصوتية موجودة منذ عام واحد على الأقل، على الرغم من أنها قد لا تظهر معاً أو باستمرار.

مُشْتَمَلَات:

- اضطراب عرات صوتية وحركية متعددة

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة محدد آخر 6B2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة، غير محدد 6B2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

الاضطرابات المرتبطة مع الكرب تحديداً

الوصف:

ترتبط الاضطرابات المصاحبة للكرب تحديداً ارتباطاً مباشراً بالتعرض لحدث مكرب أو صادم، أو سلسلة من هذه الأحداث أو التجارب المؤذية. لكلٍ من الاضطرابات في هذه المجموعة، يعتبر العامل المكرب المحدد عاملاً سببياً ضرورياً، وإن لم يكن كافياً. وعلى الرغم من أنه ليس جميع الأفراد الذين تعرضوا لعوامل مكربة محددة سيصابون باضطراب، فإن الاضطرابات في هذه المجموعة لم تكن لتحدث دون التعرض للعامل. تقع الأحداث المكربة لبعض الاضطرابات في هذه المجموعة ضمن النطاق الطبيعي لتجارب الحياة (مثل الطلاق، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والفجيرة). تتطلب الاضطرابات الأخرى تجربة كروب ذات طبيعة شديدة الخطورة أو مروعة (أي الأحداث المؤلمة المحتملة). مع جميع الاضطرابات في هذه المجموعة، فإن ما يميز هذه الاضطرابات هو طبيعة ونمط ومدة الأعراض التي تنشأ استجابة للأحداث المكربة -جنباً إلى جنب مع الضعف الوظيفي المصاحب.

الاستثناءات:

- الاحتراق (QD85)
- تفاعل الكرب الحاد (QE84)

الوصف:

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (PTSD) هو اضطراب قد يتطور بعد التعرض لحدث أو سلسلة من الأحداث المهددة أو المروعة للغاية. ويتميز بكل ما يلي: (1) إعادة تجربة الحدث أو الأحداث الصادمة في الوقت الحاضر على شكل ذكريات مقتحمة حية أو ارتجاعات عن الماضي أو كوابيس. عادة ما تكون مصحوبة بمشاعر قوية أو غامرة، خاصة الخوف أو الرعب، وأحاسيس جسدية قوية؛ (2) تجنب الأفكار وذكريات الحدث أو الأحداث، أو تجنب الأنشطة أو المواقف أو الأشخاص الذين يذكرون بالحدث أو الأحداث؛ (3) التصورات المستمرة للتهديد الحالي المتزايد، على سبيل المثال كما يتضح من خلال التنبيه المفرط أو رد الفعل المفاجئ المُضخم للمنبهات مثل الضوضاء غير المتوقعة. تستمر الأعراض لعدة أسابيع على الأقل وتسبب ضعفاً كبيراً في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مُشمِلات:

- عصاب الصدمة

استثناءات:

- تفاعل الكرب الحاد (QE84)
- اضطراب الكرب ما بعد الصدمة المعقد (6B41)

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة المعقد 6B41

الوصف:

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة المعقد هو اضطراب قد يتطور بعد التعرض لحدث أو سلسلة من الأحداث المهددة أو المروعة للغاية، وأشيعها حيث تكون الأحداث مطولة أو متكررة والتي يصعب أو يستحيل الهروب منها (على سبيل المثال، التعذيب، العبودية، وحملات الإبادة الجماعية، والعنف المنزلي المطول، والاعتداء الجنسي أو الجسدي المتكرر خلال الطفولة) تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص لاضطراب الكرب ما بعد الصدمة. بالإضافة إلى ذلك، يتسم اضطراب الكرب ما بعد الصدمة المعقد بوجود ما يلي بشكل حاد ومستمر (1) مشاكل في تنظيم العاطفة؛ (2) معتقدات حول الذات على أنها متضائلة أو مهزومة أو لا قيمة لها، مصحوبة بمشاعر العار أو الذنب أو الفشل المرتبطة بالحدث الصادم؛ (3) صعوبات في الحفاظ على العلاقات والشعور بالقرب من الآخرين. تسبب هذه الأعراض ضعفاً كبيراً في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

استثناءات:

- اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (6B40)

الوصف:

اضطراب الفجيلة المديد هو اضطراب يحدث فيه - بعد وفاة الشريك أو الوالد أو الطفل أو أي شخص آخر قريب من المفجوع - استجابة مستمرة وسائدة للفجيلة تتسم بالشوق للمتوفى أو الانشغال المستمر بالمتوفى مصحوباً بألم عاطفي حادة (مثل الحزن والشعور بالذنب والغضب والإنكار واللوم وصعوبة تقبل الموت والشعور بفقدان جزء من النفس وعدم القدرة على تجربة الحالة المزاجية الإيجابية والخدر العاطفي وصعوبة الانخراط في الأنشطة الاجتماعية أو غيرها). استمرت استجابة الفجيلة لفترة طويلة غير معتادة بعد الخسارة (أكثر من 6 أشهر كحد أدنى) وتتجاوز بوضوح المعايير الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية المتوقعة لثقافة الفرد والسياق. ردود فعل الفجيلة التي استمرت لفترات أطول ضمن فترة معيارية من الفجيلة بالنظر إلى السياق الثقافي والديني للشخص تعتبر ردود فعل عادية على الفجيلة ولا يتم تشخيصها. يتسبب الاضطراب في ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب التأقلم 6B43

الوصف:

اضطراب التأقلم هو رد فعل غير تكيفي مع ضغوط نفسية اجتماعية محددة أو كروب متعددة (مثل الطلاق أو المرض أو الإعاقة أو المشكلات الاجتماعية الاقتصادية أو النزاعات في المنزل أو العمل) والتي تظهر عادة في غضون شهر من الكرب. يتسم الاضطراب بالانشغال بالكرب أو عواقبه، بما في ذلك القلق المفرط، والأفكار المتكررة والمحنة عن الكرب، أو الاجترار المستمر حول تداعياته، وكذلك عدم التأقلم مع الكرب الذي يسبب ضعفاً كبيراً في الشخصية والعائلة أو المجالات الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. الأعراض ليست ذات خصوصية أو شدة كافية لتبرير تشخيص اضطراب عقلي وسلوكي آخر وعادة ما تزول في غضون 6 أشهر، ما لم يستمر الكرب لمدة أطول.

استثناءات:

- اضطراب الفجيرة المديد (6B42)

الوصف:

يتسم اضطراب التعلق التفاعلي بسلوكيات تعلق غير طبيعية بشكل فادح في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تحدث في سياق تاريخ من رعاية الطفل غير الكافية بشكل فادح (مثل الإهمال الشديد، وسوء المعاملة، والحرمان المؤسسي). حتى عندما يتوفر مقدم رعاية أساسي مناسب حديثاً، لا يلجأ الطفل إلى مقدم الرعاية الأساسي للحصول على الراحة والدعم والرعاية، ونادراً ما يظهر سلوكيات البحث عن الأمان تجاه أي شخص بالغ، ولا يستجيب عند تقديم الطمأنينة. لا يمكن تشخيص اضطراب التعلق التفاعلي إلا عند الأطفال، وتتطور سمات الاضطراب خلال السنوات الخمس الأولى من الحياة. ومع ذلك، لا يمكن تشخيص الاضطراب قبل سن عام واحد (أو عمر نمو أقل من 9 أشهر)، أو عندما لا يتم تطوير القدرة على الارتباطات الانتقائية بشكل كامل، أو في سياق اضطراب طيف التوحد.

استثناءات:

- متلازمة اسبرجر (6A02)
- اضطراب التعلق التفاعلي المتحلل في الطفولة (6B45)

اضطراب التعلق التفاعلي المتحلل 6B45

الوصف:

يتسم اضطراب التعلق التفاعلي المتحلل بسلوكيات تعلق غير طبيعية بشكل فادح في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تحدث في سياق تاريخ من رعاية الطفل غير الكافية بشكل فادح (مثل الإهمال الشديد، وسوء المعاملة، والحرمان المؤسسي). يتعامل الطفل مع البالغين بشكل عشوائي، ويفتقر إلى التحفظ على القرب، وسيمضي مع البالغين غير مألوفين، ويظهر سلوكاً ودياً للغاية تجاه الغرباء. لا يمكن تشخيص اضطراب المشاركة الاجتماعية المتحلل إلا عند الأطفال، وتتطور سمات الاضطراب خلال السنوات الخمس الأولى من الحياة. ومع ذلك، لا يمكن تشخيص الاضطراب قبل سن عام واحد (أو عمر نمو أقل من 9 أشهر)، أو عندما لا يتم تطوير القدرة على الارتباطات الانتقائية بشكل كامل، أو في سياق اضطراب طيف التوحد.

استثناءات:

- متلازمة اسبرجر (6A02)
- اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة (6A05)
- اضطراب التأقلم (6B43)
- اضطراب التعلق التفاعلي في الطفولة (6B44)

الاضطرابات المحددة الأخرى المرتبطة مع الكرب تحديداً 6B4Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

الاضطرابات المرتبطة مع الكرب تحديداً، غير محدد 6B4Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات التفارقية

الوصف:

تتسم الاضطرابات التفارقية بالاختلال أو الانقطاع اللاإرادي في الاندماج الطبيعي لواحد أو أكثر مما يلي: الهوية، أو الأحاسيس، أو الإدراك، أو الوجدان، أو الأفكار، أو الذكريات، أو التحكم في حركات الجسم، أو السلوك. قد يكون الاختلال أو الانقطاع كاملاً، ولكن الجزئي أكثر شيوعاً، ويمكن أن يختلف من يوم لآخر أو حتى من ساعة لساعة. لا ترجع أعراض الاضطرابات التفارقية إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم - اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالات الصحية، وليست جزءاً من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة. أعراض التفارق في الاضطرابات التفارقية شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

مضمنة في مكان آخر:

- متلازمة تفارق ثانوية (6E65)

اضطراب العرض العصبي التفارقي 6B60

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي بوجود أعراض حركية أو حسية أو معرفية تشير للانقطاع اللاإرادي في الاندماج الطبيعي للوظائف الحسية، الحركية، أو المعرفية، ولا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا تنجم عن تأثيرات مادة أو دواء على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تأثيرات السحب، أو اضطراب النوم - اليقظة.

الاستثناءات:

- الاضطرابات المُفتعلة (6D50-6D5Z)

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات بصرية 6B60.0

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات بصرية بوجود أعراض بصرية كالعمى، الرؤية الانبوبية، أو تشوهات أو هلاوس لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات سمعية 6B60.1

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات سمعية بوجود أعراض سمعية كفقد السمع أو هلاوس لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع دوخة أو دوار 6B60.2

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع دوخة أو دوار بالإحساس بالدوران أثناء الثبات (دوار) أو دوخة لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلال حسي آخر 6B60.3

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلال حسي آخر بأعراض حسية لم يتم تحديدها في فئات محددة أخرى في هذه المجموعة مثل التنميل، أو الضيق، أو الوخز، أو الحرق، أو الألم، أو الأعراض الأخرى المتعلقة باللمس، أو الشم، أو التذوق، أو التوازن، أو الحس العميق، أو الحس

الحركي، أو الحس الحراري. لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلاجات غير صرعية 6B60.4

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلاجات غير صرعية بأعراض نوب اختلاجية لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الكلام 6B60.5

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلاجات غير صرعية بأعراض مثل صعوبة الكلام (بحة الصوت)، وفقدان القدرة على الكلام (فقدان الصوت) أو صعوبة النطق أو عدم وضوح النطق (عسر الكلام) لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع شلل جزئي أو ضعف 6B60.6

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع شلل جزئي أو ضعف بصعوبة أو عدم القدرة على تحريك أجزاء من الجسم إرادياً أو في تنسيق الحركات لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات المشية 6B60.7

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات المشية بأعراض تشمل قدرة الفرد على المشي أو طريقة المشي، بما في ذلك الرنح وعدم القدرة على الوقوف دون مساعدة، لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة 6B60.8

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة بأعراض مثل رقص، رمع عضلي، رعشة، عسر التوتر العضلي، تشنج الوجه، باركنسونية، أو عسر الحركة لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رمع عضلي 6B60.81

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رمع عضلي بهزات سريعة مفاجئة والتي قد تكون بؤرية أو متعددة البؤر أو معممة لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رعاش 6B60.82

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع رعاش بالتذبذب اللاإرادي لجزء من الجسم لا يتمشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع عسر التوتر العضلي 6B60.83

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع عسر التوتر العضلي بتقلصات عضلية مستمرة تسبب في كثير من الأحيان حركات ملتوية ومتكررة أو أوضاع غير طبيعية لا تتمشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع تشنج الوجه 6B60.84**الوصف:**

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع تشنج الوجه بتقلصات عضلية مستمرة أو نفضات في الوجه لا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع باركنسونية 6B60.85

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع باركنسونية بظهور أعراض لمتلازمة شبيهة بداء باركنسون مع غياب لمرض باركنسون المؤكد الذي لا يحدث حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر. يمكن تمييز اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع باركنسونية، عن داء باركنسون من خلال ميزات مثل البدء المفاجئ، والإعاقة المبكرة، والاهتزاز والبطء الثنائي، والبطء غير المتزايد عند أداء الحركات المتكررة، والمقاومة الإرادية ضد الحركة السلبية دون صلابة العجلة المسننة، والتشتت، والضعف الحركي، تلعثم في الكلام، مشية غريبة، ومجموعة متنوعة من الأعراض السلوكية.

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة، محدد آخر 6B60.8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع اختلالات الحركة، غير محدد 6B60.8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع أعراض معرفية 6B60.9

الوصف:

يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي، مع أعراض معرفية بضعف الأداء المعرفي في الذاكرة أو اللغة أو المجالات المعرفية الأخرى التي تكون غير متسقة داخلياً ولا تتماشى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى، ولا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر.

الاستثناءات:

- النساء التفارقية (B616)

اضطراب العرض العصبي التفارقي، محدد آخر 6B60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرض العصبي التفارقي، غير محدد 6B60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الوصف:

تتسم النسابة التفارقفة بعدم القدرة على استدعاء ذكرفاء السفرة الذاتية المهمة عادةً حول الأحداث المؤلمة أو المكربة مؤخرًا، والتي لا تتوافق مع النسيان العاءف. لا تحدث النسابة حصرفًا أثناء اضطراب تفارقف آخر ولا فمكن تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلف أو سلوكف أو عصفف آخر. لا ترجع النسابة إلى التأثيراء المباشرة لماءة أو دواء على الجهاز العصفف المركزي، بما فف ذلك تأثيراء السحب، ولفس بسبب مرض فف الجهاز العصفف أو إصابة فف الرأس. فنتج عن النسابة ضعف كبفر فف المبالاء الشفصفبة أو الأسفرة أو الاءتماعفة أو الفعلفمفة أو المهنفة أو ففرها من مبالاء الأداء المهمة.

الاستثناءاء:

- النسابة NOS (MB21.1)
- اضطراب النسابة الناجم عن اساءءام الكحول (6D72.10)
- النسابة الفقفمفة (MB21.10)
- النسابة الرافة (MB21.11)
- ملازمة النسابة العصفوفة ففر الكحولفة (6D72.0)
- النسابة الفالفة للصرع (8A60- 8A6Z)

اضطراب الغَيْبَةِ 6B62

الوصف:

يتسم اضطراب الغَيْبَةِ بحالات الغَيْبَةِ التي يوجد فيها تغيير ملحوظ في حالة وعي الفرد أو فقدان الإحساس المألوف للفرد بالهوية الشخصية حيث يختبر الفرد تضيقاً في الوعي بالمحيط المباشر أو تركيزاً انتقائياً ضيقاً بشكل غير عادي على المنبهات البيئية وتحدد في الحركة والوضعة والكلام لتكرار كمية صغيرة يتم اختبارها على أنها خارجة عن سيطرة الفرد. لا تتسم نوبات الغيبة بتجربة الاستبدال بهوية بديلة. نوبات الغَيْبَةِ متكررة، أو إذا كان التشخيص يعتمد على نوبة واحدة، فإن النوبة تستمر لعدة أيام على الأقل. حالة الغَيْبَةِ لا إرادية وغير مرغوب فيها ولا تقبل كجزء من ممارسة ثقافية أو دينية جماعية. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا ترجع إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم - اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالات الصحية، وليست جزءاً من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الوصف:

يتسم اضطراب غَيْبَةِ التملك بحالات الغَيْبَةِ التي يوجد فيها تغيير ملحوظ في حالة وعي الفرد كما أن الإحساس المألوف للفرد بالهوية الشخصية يستبدل بحياسة هوية خارجية، حيث تُختبر مشاعر الفرد أو حركاته على أنها تقع تحت سيطرة العامل الحائز. نوبات غَيْبَةِ الحَيَاةِ متكررة، أو إذا كان التشخيص يعتمد على نوبة واحدة، فإن النوبة تستمر لعدة أيام على الأقل. حالة غَيْبَةِ الحَيَاةِ لا إرادية وغير مرغوب فيها ولا تقبل كجزء من ممارسة ثقافية أو دينية جماعية. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا ترجع إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم - اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالات الصحية، وليست جزءاً من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الاستثناءات:

- الفصام (6A20)
- الاضطرابات الناتجة عن استخدام مواد ذات تأثير نفسي أخرى محددة، بما في ذلك الأدوية (6C4E)
- الاضطراب الذهاني الحاد الوجيز (6A23)
- تغير شخصية ثانوي (6E68)

اضطراب الهوية التفارقي 6B64

الوصف:

يتسم اضطراب الهوية التفارقي باضطراب الهوية حيث توجد حالتان أو أكثر من حالات الشخصية المتميزة (الهويات التفارقية) المرتبطة بانقطاعات ملحوظة في الإحساس بالذات والتحكم. تتضمن كل حالة شخصية نمطها الخاص من التجربة، والإدراك، والتصور، والارتباط بالذات والجسد والبيئة. هناك حالتان مميزتان على الأقل من الشخصية تأخذان بشكل متكرر السيطرة التنفيذية على وعي الفرد وأدائه عند التفاعل مع الآخرين أو مع البيئة، مثل أداء جوانب معينة من الحياة اليومية مثل الأبوة والأمومة، أو العمل، أو استجابة لمواقف معينة (على سبيل المثال، تلك التي يُنظر إليها على أنها تهديد). التغييرات في حالة الشخصية مصحوبة بتغييرات ذات صلة في الإحساس والإدراك والتأثير والإدراك والذاكرة والتحكم الحركي والسلوك. عادة ما تكون هناك نوبات من فقدان الذاكرة، والتي قد تكون شديدة. اضطراب الهوية التفارقي لا إرادي وغير مرغوب فيه ولا يقبل كجزء من ممارسة ثقافية أو دينية جماعية. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا ترجع إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم - اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالات الصحية، وليست جزءاً من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الوصف:

يتسم اضطراب الهوية التفارقي الجزئي باضطراب الهوية حيث توجد حالتان أو أكثر من حالات الشخصية المتميزة (الهويات التفارقية) المرتبطة بانقطاعات ملحوظة في الإحساس بالذات والتحكم. تتضمن كل حالة شخصية نمطها الخاص من التجربة، والإدراك، والتصور، والارتباط بالذات والجسد والبيئة. هناك حالة شخصية واحدة مهيمنة وعادة ما تؤدي في الحياة اليومية، ولكن يتم التطفل عليها من قبل حالة شخصية غير مهيمنة واحدة أو أكثر (التدخلات التفارقية). قد تكون هذه التدخلات معرفية أو عاطفية أو إدراكية أو حركية أو سلوكية. تُختبر هذه التدخلات على أنها تتدخل في أداء حالة الشخصية المهيمنة وعادة ما تكون تدخلات مكروهة. لا تأخذ حالات الشخصية غير المهيمنة بشكل متكرر السيطرة التنفيذية على وعي الفرد وأدائه، ولكن قد تكون هناك فترات عرضية ومحدودة وعابرة تفترض فيها حالة الشخصية المتميزة سيطرة تنفيذية على الانخراط في سلوكيات مقيدة، مثل الاستجابة للحالات العاطفية المتطرفة أو أثناء نوبات إيذاء النفس أو استرجاع الذكريات المؤلمة. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا ترجع إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم - اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي. وتؤدي الأعراض إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب تبدد الشخصية - تبدد الواقع 6B66

الوصف:

يتسم اضطراب تبدد الشخصية - تبدد الواقع بالتجارب المستمرة أو المتكررة لتبدد الشخصية أو تبدد الواقع أو كليهما. يتميز تبدد الشخصية باختبار الذات على أنها غريبة أو غير واقعية، أو الشعور بالانفصال عنها، أو كما لو كان المرء مراقباً خارجياً، لأفكاره أو مشاعره أو أحاسيسه أو جسده أو أفعاله. يتسم تبدد الواقع باختبار أشخاص آخرين أو أشياء أو العالم على أنها غريبة أو غير واقعية (على سبيل المثال، تشبه الحلم، أو بعيدة، أو ضبابية، أو بلا حياة، أو عديمة اللون، أو مشوهة بصرياً) أو الشعور بالانفصال عن محيط المرء. أثناء اختبار تبدد الشخصية أو تبدد الواقع، يظل اختبار الواقع كما هو. لا تحدث حالات تبدد الشخصية أو تبدد الواقع حصرياً أثناء اضطراب تفارقي آخر ولا ترجع إلى التأثيرات المباشرة لدواء أو مادة، بما في ذلك تأثيرات السحب، ولا يتم تفسيرها بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالات الصحية أو أذيات الدماغ. الأعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض تفارق بارزة (على سبيل المثال، تبدد الشخصية، تبدد الواقع) والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ، أو الفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، أعراض قلق أو هجمات هلع استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض القلق شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً مخصصاً.

الاستثناءات :

• هذيان (6D70)

• تفاعل الكرب الحاد (QE84)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة تفارق ثانوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب تفارقي محدد آخر 6B6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب تفارقي، غير محدد 6B6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات التغذية والأكل

الوصف:

تشمل اضطرابات التغذية والأكل سلوكيات غير طبيعية في الأكل أو التغذية لا تفسرها حالة صحية أخرى ولا تتناسب مع الناحية النمائية وليست مقبولة ثقافياً. تتضمن اضطرابات التغذية اضطرابات سلوكية لا تتعلق بوزن الجسم وشكله، مثل تناول مواد غير صالحة للأكل أو ارتجاع إرادي للأطعمة. تشمل اضطرابات الأكل سلوك الأكل غير الطبيعي والانشغال بالطعام بالإضافة إلى مشاكل الوزن والشكل البارزة.

فقد الشهية العصبي 6B80

الوصف:

يتسم فقد الشهية العصبي بانخفاض كبير في وزن الجسم بالنسبة لطول الفرد وعمره ومرحلة نموه (مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 18.5 كجم / م² عند البالغين ومؤشر كتلة الجسم للعمر أقل من خمسة في المئين عند الأطفال والمراهقين) والذي لا يعود لحالة صحية أخرى أو لعدم توفر الغذاء. يترافق انخفاض وزن الجسم مع نمط مستمر من السلوكيات لمنع استعادة الوزن الطبيعي، والتي قد تشمل السلوكيات التي تهدف إلى تقليل الداخل من الطاقة (الأكل المقيد)، وسلوكيات التطهير (على سبيل المثال، التقيؤ الذاتي، وإساءة استخدام المسهلات)، والسلوكيات المستهدفة لزيادة صرف الطاقة (على سبيل المثال، التمرين المفرط)، حيث ترتبط هذه السلوكيات عادةً بالخوف من زيادة الوزن. يعتبر

انخفاض وزن الجسم أو شكله أمراً محورياً للتقييم الذاتي للشخص أو يُنظر إليه بشكل غير دقيق على أنه طبيعي أو حتى مفرط.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي

المترافق مع (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 5B50 نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B51 الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B52 سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B53 التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B54 نقص الوزن عند البالغين

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ 6B80.0

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ يلي جميع المتطلبات التعريفية لفقدان الشهية العصبي، مع مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 كجم / م² و 14 كجم / م² عند البالغين، وبين خمسة إلى 0.3 في المئين عند الأطفال والمراهقين.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ
المترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- | | |
|------|---|
| 5B50 | نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين |
| 5B51 | الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين |
| 5B52 | سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين |
| 5B53 | التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين |
| 5B54 | نقص الوزن عند البالغين |

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، النمط المقيد 6B80.00

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، النمط المقيد يشير إلى الأفراد الذين يستوفون المتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ والذين يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم المنخفض من خلال تناول الطعام المقيد أو الصيام لوحده أو مع زيادة إنفاق الطاقة (مثل الإفراط في ممارسة الرياضة) ولكنهم يفعلون ذلك مع عدم الانخراط في سلوكيات الإفراط في الأكل أو التطهير.

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، نمط الشرهة - التطهير 6B80.01

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، نمط الشرهة - التطهير يشير إلى الأفراد الذين يستوفون المتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ والذين يعانون من نوبات من الإفراط في تناول الطعام أو سلوكيات التطهير. والذين يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم المنخفض من خلال تناول الطعام المقيد، وعادة ما يصاحب ذلك سلوكيات تطهير كبيرة تهدف إلى التخلص من الطعام المبتلع (مثل التقيؤ الذاتي أو استعمال المليينات أو الحقن الشرجية). يشمل هذا النمط أيضاً الأفراد الذين تظهر عليهم نوبات الشرهة عند الأكل ولكنهم لا يقومون بالتطهير.

6B80.0Z فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ، غير محدد

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

6B80.0 فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير يلي جميع المتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي، مع مؤشر كتلة الجسم أقل من 14 كجم / م² عند البالغين، وأقل من 0.3 في المئين عند الأطفال والمراهقين.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير

المترافق مع (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

5B50 نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B51 الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B52 سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B53 التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B54 نقص الوزن عند البالغين

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، النمط المقيد 6B80.10

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، النمط المقيد يشير إلى الأفراد الذين يستوفون المتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير والذين يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم المنخفض من خلال تناول الطعام المقيد أو الصيام لوحده أو مع زيادة إنفاق الطاقة (مثل الإفراط في ممارسة الرياضة) ولكنهم يفعلون ذلك مع عدم الانخراط في سلوكيات الإفراط في الأكل أو التطهير.

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، نمط الشرهية - التطهير 6B80.11

الوصف:

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، نمط الشرهية - التطهير يشير إلى الأفراد الذين يستوفون المتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير والذين يعانون من نوبات من الإفراط في تناول الطعام أو سلوكيات التطهير. والذين يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم المنخفض من خلال تناول الطعام المقيد، وعادة ما يصاحب ذلك سلوكيات تطهير كبيرة تهدف إلى التخلص من الطعام المبتلع (مثل التقيؤ الذاتي أو استعمال المليينات أو الحقن الشرجية). يشمل هذا النمط أيضاً الأفراد الذين تظهر عليهم نوبات الشرهية عند الأكل ولكنهم لا يقومون بالتطهير.

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، غير محدد 6B80.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير، غير محدد

المترافق مع (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 5B50 نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B51 الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B52 سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B53 التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين
- 5B54 نقص الوزن عند البالغين

فقد الشهية العصبي، مع تعافٍ ووزنٍ طبيعي للجسم 6B80.2

الوصف:

بين الأفراد الذين يتعافون من فقد الشهية العصبي والذين يزيد وزن جسمهم عن 18.5 كجم / م 2 للبالغين أو أكثر من خمسة في المئين لمؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر للأطفال والمراهقين، يجب الاحتفاظ بالتشخيص حتى تحقيق الشفاء التام والدائم، كما يتضح من خلال الحفاظ على وزن صحي ووقف السلوكيات التي تهدف إلى تقليل وزن الجسم بشكل مستقل عن توفير العلاج (على سبيل المثال، لمدة عام على الأقل بعد سحب العلاج المكثف).

فقد الشهية العصبي محدد آخر 6B8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ

المترافق مع (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

5B50 نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B51 الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B52 سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B53 التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B54 نقص الوزن عند البالغين

فقد الشهية العصبي، غير محدد 6B8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ

المترافق مع (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

5B50 نقص الوزن عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B51 الهزال عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B52 سوء التغذية الحاد عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B53 التقزم عند الرضع أو الأطفال أو المراهقين

5B54 نقص الوزن عند البالغين

الشهر العصبي 6B81

الوصف:

يتسم الشهر العصبي بنوبات متكررة ومعاودة من الإفراط في تناول الطعام (على سبيل المثال، مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر على مدى شهر واحد على الأقل). نوبة الشراهة عند الأكل هي فترة زمنية مميزة يعاني خلالها الفرد من فقدان ذاتي للسيطرة على الأكل، والأكل بشكل ملحوظ أكثر أو بشكل مختلف عن المعتاد، ويشعر بأنه غير قادر على التوقف عن الأكل أو الحد من نوع أو كمية الطعام الذي يتم تناوله. تكون الشراهة في الأكل مصحوبة بسلوكيات تعويضية متكررة غير ملائمة تهدف إلى منع زيادة الوزن (على سبيل المثال، التقيؤ الذاتي، أو إساءة استخدام المسهلات أو الحقن الشرجية، أو التمارين الشاقة). ينشغل الفرد بشكل الجسم أو وزنه مما يؤثر بشدة على التقييم الذاتي. لا يعاني الفرد من نقص الوزن بشكل ملحوظ وبالتالي لا يفي بالمتطلبات التشخيصية لفقد الشهية العصبي.

الاستثناءات:

- اضطراب الشراهة عند الأكل (6B82)

الوصف:

يتسم اضطراب الشراهة عند الأكل بنوبات متكررة معاودة من الشراهة عند تناول الطعام (على سبيل المثال، مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر على مدى عدة أشهر). نوبة الشراهة عند الأكل هي فترة زمنية مميزة يعاني خلالها الفرد من فقدان ذاتي للسيطرة على الأكل، والأكل بشكل ملحوظ أكثر أو بشكل مختلف عن المعتاد، ويشعر بأنه غير قادر على التوقف عن الأكل أو الحد من نوع أو كمية الطعام الذي يتم تناوله. يعتبر الإفراط في تناول الطعام أمراً مؤلماً للغاية، وغالباً ما يكون مصحوباً بمشاعر سلبية مثل الشعور بالذنب أو الاشمئزاز. ومع ذلك، وعلى عكس الشره العصبي، لا تتبع نوبات الشراهة عند تناول الطعام بانتظام سلوكيات تعويضية غير مناسبة تهدف إلى منع زيادة الوزن (على سبيل المثال، القيء الذاتي، وإساءة استخدام المليينات أو الحقن الشرجية، والتمارين الشاقة).

الاستثناءات:

- الشره العصبي (6B81)

اضطراب تناول الطعام المقيد – التجني 6B83

الوصف:

يتسم اضطراب تناول الطعام المقيد – التجني (ARFID) بسلوكيات غير طبيعية في الأكل أو التغذية تؤدي إلى تناول كمية غير كافية من الطعام أو تنوعه لتلبية متطلبات الطاقة أو التغذية الكافية. سبب نمط الأكل المقيد في خسارة كبيرة في الوزن، أو فشلاً في اكتساب الوزن كما هو متوقع في الطفولة أو الحمل، أو نقصاً غذائياً مهماً سريراً، أو الاعتماد على المكملات الغذائية عن طريق الفم أو التغذية الأنبوبية، أو أثر بشكل سلبي على صحة الفرد أو نتج عنه خلل وظيفي بشكل كبير. لا يعكس نمط سلوك الأكل المخاوف بشأن وزن الجسم أو شكله. إن تناول الطعام المقيد وتأثيره على الوزن، أو الجوانب الأخرى للصحة، أو الأداء لا يُعزى بشكل أفضل إلى نقص توافر الغذاء، أو آثار دواء أو مادة، أو حالة صحية أخرى.

الاستثناءات:

- فقد الشهية العصبي (6B80)
- مشكلة تغذية عند الرضيع (MG43.30)
- مشاكل تغذية حديثي الولادة (KD32)

الوصف:

تتميز بيكا بالاستهلاك المنتظم للمواد غير الغذائية، مثل أشياء ومواد غير الطعام (على سبيل المثال، الطين والتربة والطباشير والجص والبلاستيك والمعادن والورق) أو المكونات الغذائية الخام (على سبيل المثال، كميات كبيرة من الملح أو دقيق الذرة) ويكون هذا الاستهلاك ثابتاً أو شديداً بما يكفي ليتطلب عناية سريرية لدى فرد بلغ سن النمو يتوقع منه التمييز بين المواد الصالحة للأكل والمواد غير الصالحة للأكل (حوالي عامين). أي أن السلوك يسبب ضرراً للصحة أو ضعفاً في الأداء أو خطراً كبيراً بسبب تكرار أو كمية أو طبيعة المواد أو الأشياء التي يتم تناولها.

اضطراب الاجترار والقلس 6B85

الوصف:

يتسم اضطراب الاجترار والقلس بارتجاع الطعام الذي سبق ابتلاعه بشكل متعمد ومتكرر إلى الفم (أي القلس)، والذي يمكن إعادة مضغه وإعادة بلعه (مثل الاجترار)، أو قد يتم بصقه عمداً (ولكن ليس كما في القيء). يتكرر سلوك القلس (عدة مرات في الأسبوع على الأقل) ويستمر على مدى عدة أسابيع على الأقل. لا يتم تفسير سلوك القلس بشكل كامل من خلال حالة صحية أخرى تسبب ارتجاعاً مباشراً (على سبيل المثال، تضيق المريء أو الاضطرابات العصبية والعضلية التي تؤثر على أداء المريء) أو تسبب الغثيان أو القيء (على سبيل المثال، تضيق البواب). يجب تشخيص اضطراب الاجترار والقلس فقط في الأفراد الذين بلغوا من العمر ما لا يقل عن سنتين.

الاستثناءات:

- الغثيان أو القيء (MD90)
- متلازمة الاجترار عند البالغين (DD90.6)

اضطراب تغذية وأكل محدد آخر 6B8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب تغذية وأكل ، غير محدد 6B8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات الإفراغ

الوصف:

تشمل اضطرابات الإفراغ، التفريغ المتكرر للبول في الملابس أو السرير (سلس البول) وتكرار تمرير البراز في أماكن غير مناسبة (سلس البراز). لا ينبغي تشخيص اضطرابات الإفراغ إلا بعد وصول الفرد إلى سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث التحكم في المصبرات (5 سنوات لسلس البول و4 سنوات لسلس البراز). قد يكون سلس البول أو البراز موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو يكون قد نشأ بعد فترة من السيطرة على المثانة أو الأمعاء. لا ينبغي تشخيص اضطراب الإفراغ إذا كان السلوك يعزى بالكامل إلى حالة صحية أخرى تسبب السلس، أو إلى تشوهات خلقية أو مكتسبة في المسالك البولية أو الأمعاء، أو الاستخدام المفرط للملينات أو مدرات البول.

سلس البول 6C00

الوصف:

سلس البول هو الإفراغ المتكرر للبول في الملابس أو الفراش، والذي قد يحدث أثناء النهار أو في الليل، لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث التحكم في المصبرات (5 سنوات). قد يكون سلس البول موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يكون ظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على المثانة. في معظم الحالات، يكون السلوك لا إرادياً ولكن في بعض الحالات يبدو متعمداً. لا ينبغي تشخيص سلس البول إذا كان الإفراغ غير المقصود للبول ناتجاً عن حالة صحية تتداخل مع سلس البول (على سبيل المثال، أمراض الجهاز العصبي أو الاضطرابات

العضلية الهيكلية) أو بسبب تشوهات خلقية أو مكتسبة في المسالك البولية.
مُشْتَمَلَات:

- سلس البول الوظيفي
- سلس البول النفسي المنشأ
- سلس بول لا عضوي

الاستثناءات :

- سلس الكرب (MF50.20)
- سلس الإلحاح (MF50.21)
- عدم حصر البول الوظيفي (MF50.23)
- سلس الإفازة (MF50.2)
- سلس انعكاسي (MF50.24)
- سلس البول خارج الإحليل (MF50.2)

سلس البول الليلي 6C00.0

الوصف:

سلس البول الليلي هو الإفراغ المتكرر للبول في الملابس أو الفراش، والذي يحدث فقط في الليل، لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث التحكم في المصبرات (5 سنوات). قد يكون سلس البول موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يكون ظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على المثانة. في معظم الحالات، يكون السلوك لا إرادياً ولكن في بعض الحالات يبدو متعمداً.

سلس البول النهاري 6C00.1

الوصف:

سلس البول النهاري هو الإفراغ المتكرر للبول في الملابس، والذي يحدث فقط خلال ساعات اليقظة، لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث التحكم في المصبرات (5 سنوات). قد يكون سلس البول موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يكون ظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على المثانة. في معظم الحالات، يكون السلوك لا إرادياً ولكن في بعض الحالات يبدو متعمداً.

سلس البول الليلي - النهاري 6C00.2

الوصف:

سلس البول الليلي - النهاري هو الإفراغ المتكرر للبول في الملابس والفرش، والذي يحدث خلال ساعات اليقظة، أو في النوم (خلال الليل) لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث التحكم في المصبرات (5 سنوات). قد يكون سلس البول موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يكون ظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على المثانة. في معظم الحالات، يكون السلوك لا إرادياً ولكن في بعض الحالات يبدو متعمداً.

سلس البول، غير محدد 6C00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

الوصف:

سلس البراز هو التمرير المتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة. يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل المثال، مرة واحدة على الأقل شهرياً على مدار عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث حصر المصبرات (4 سنوات). قد يكون سلس البراز موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على الأمعاء. لا ينبغي تشخيص سلس البراز إذا كان تمرير البراز يُعزى بالكامل لحالة صحية أخرى (على سبيل المثال، تضخم القولون العقدي، الشوك المشقوق، الخرف)، التشوهات الخلقية أو المكتسبة في الأمعاء، أو العدوى المعدية المعوية، أو الاستخدام المفرط للملينات.

سلس البراز المصحوب بالإمساك والقيض 6C01.0

الوصف:

سلس البراز هو التمرير المتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة. يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل المثال، مرة واحدة على الأقل شهرياً على مدار عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث حصر المصبرات (4 سنوات). قد يكون سلس البراز موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على الأمعاء. يعتبر سلس البراز المصحوب بالإمساك والقيض أكثر أشكال سلس البراز شيوعاً، وينطوي على احتباس البراز وانحشاره. عادة ما يكون البراز - ولكن ليس دائماً - سيئ التكوين (رخوياً أو سائلاً) وقد يتراوح التسرب من عرضي إلى مستمر. غالباً ما يكون هناك تاريخ من تجنب استخدام المرحاض مما يؤدي إلى الإمساك.

سلس البراز المصحوب دون إمساك وفَيْض 6C01.1

الوصف:

سلس البراز هو التمرير المتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة. يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل المثال، مرة واحدة على الأقل شهرياً على مدار عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من المتوقع عادةً حدوث حصر المصبرات (4 سنوات). قد يكون سلس البراز موجوداً منذ الولادة (أي امتداد غير نمطي لسلس الأطفال الطبيعي)، أو قد يظهر بعد فترة من السيطرة المكتسبة على الأمعاء. لا ينطوي سلس البراز غير المصحوب بالإمساك والفَيْض على احتباس البراز وانحشاره. بل تعكس الإحجام أو المقاومة أو الفشل في الامتثال للمعايير الاجتماعية في التغوط في الأماكن المقبولة في سياق السيطرة الفيزيولوجية الطبيعية على التبرز. عادةً ما يكون البراز ذو قوام طبيعي ومن المحتمل أن يكون التغوط غير المناسب متقطعاً.

سلس البراز، غير محدد 6C01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب إفراغ، غير محدد 6C0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية

الوصف:

تتسم اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية باضطرابات في تجربة الشخص مع جسده أو جسدها. يتضمن اضطراب الضائقة الجسدي الأعراض الجسدية التي يجدها الفرد مؤلمة والتي يتوجه الانتباه إليها بشكل مفرط. يتضمن اضطراب كمال الجسد اضطراباً في تجربة الشخص مع الجسد يتجلى في الرغبة المستمرة في الحصول على إعاقة جسدية محددة مصحوبة بعدم الراحة المستمرة، أو الشعور الشديد بعدم الملاءمة فيما يتعلق بتكوين الجسم الحالي غير المعوق.

استثناءات:

- اضطراب العرض العصبي التفارقي B606
- قلق حول مظهر الجسم (QD30-QD3Z)

اضطراب الضائقة الجسدي 6C20

الوصف:

يتسم اضطراب الضائقة الجسدي بوجود أعراض جسدية مؤلمة للفرد والاهتمام المفرط بهذه الأعراض، والذي قد يظهر من خلال الاتصال المتكرر بمقدمي الرعاية الصحية. إذا تسببت حالة صحية أخرى في ظهور الأعراض أو ساهمت فيها، فمن الواضح أن درجة الانتباه المفرطة بالنسبة لطبيعتها وتطورها. الاهتمام المفرط لا يخف عن طريق الفحص والاستقصاءات السريرية المناسبة والطمأننة المناسبة.

الأعراض الجسدية مستمرة، وتظل موجودة في معظم الأيام لعدة أشهر على الأقل. عادةً ما يتضمن اضطراب الضائقة الجسدي أعراضاً جسدية متعددة قد تختلف بمرور الوقت. من حين لآخر هناك عرض واحد - عادة الألم أو التعب - يرتبط بالسمات الأخرى للاضطراب.

الاستثناءات :

- متلازمة توريت (8A05.00)
- هوس نتف الأشعار (6B25.0)
- الاضطرابات التفارقية (6B60-6B6Z)
- نتف الشعر (6B23)
- داء المراق (6B25)
- اضطراب صورة الجسد (6B21)
- اضطراب كشط الجلد (6B25.1)
- لا توافق الجندر (HA60-HA6Z)
- الاختلالات الجنسية (HA00-HA0Z)
- اضطرابات العرة (A058)
- التظاهر بالأعراض (MB23.B)
- اضطراب ألم الإيلاج الجنسي (HA20)

اضطراب الضائقة الجسدي الخفيف 6C20.0

الوصف:

جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة. هناك اهتمام مفرط بالأعراض المؤلمة وعواقبها، والتي قد تؤدي إلى زيارات طبية متكررة، لكن الشخص غير منشغل بالأعراض (على سبيل المثال، يقضي الفرد أقل من ساعة في اليوم في التركيز عليها). على الرغم من أن الفرد يعبر عن قلقه بشأن الأعراض وقد يكون لها بعض التأثير على حياته أو حياتها (على سبيل المثال، التوتر في العلاقات، أو الأداء الأكاديمي أو المهني الأقل فاعلية، أو التخلي عن أنشطة ترفيهية محددة)، لكن لا يوجد ضعف كبير في وظائف الفرد الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب الضائقة الجسدي المعتدل 6C20.1

الوصف:

جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة. كما أن الشخص منشغل بالأعراض (على سبيل المثال، يقضي الفرد أكثر من ساعة في اليوم في التركيز عليها) وتترافق عادةً مع زيارات طبية متكررة. يكرس الشخص الكثير من طاقته للتركيز على الأعراض وعواقبها. تسبب الأعراض وعواقبها ضعفاً في وظائف الفرد الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة (على سبيل المثال، تضارب العلاقات، مشاكل الأداء في العمل، التخلي عن مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية).

اضطراب الضائقة الجسدي الشديد 6C20.2

الوصف:

جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة. وهناك انشغال كبير ومستمر بالأعراض وعواقبها لدرجة أنها قد تصبح النقطة المحورية في حياة الشخص، مما يؤدي عادةً إلى تفاعلات كثيرة مع نظام الرعاية الصحية. تتسبب الأعراض وما يرتبط بها من ضغوط وانشغال في إعاقة خطيرة في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة (على سبيل المثال، عدم القدرة على العمل، والعزلة عن الأصدقاء والعائلة، والتخلي عن جميع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية تقريباً). قد تصبح اهتمامات الشخص ضيقة للغاية بحيث يتم التركيز بشكل حصري تقريباً على أعراضه الجسدية وعواقبها السلبية.

اضطراب الضائقة الجسدي، غير محدد 6C20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

الانزعاج من الكمال الجسدي 6C21

الوصف:

يتسم الانزعاج من الكمال الجسدي برغبة شديدة ومستمرة في أن يصبح الفرد معوقاً جسدياً بشكل كبير (على سبيل المثال، مبتور لطرف رئيسي، مشلول، أعشى)، يكون البدء خلال المراهقة المبكرة مصحوباً بعدم الراحة المستمرة، أو مشاعر شديدة بعدم الملاءمة فيما يتعلق بتكوين الجسم الحالي غير المعوق. تؤدي الرغبة في أن يصبح الفرد معاقاً جسدياً إلى عواقب وخيمة، كما يتجلى من خلال الانشغال بالرغبة (بما في ذلك الوقت الذي يقضيه في التظاهر بالإعاقة) التي تتداخل بشكل كبير في الإنتاجية أو في الأنشطة الترفيهية أو في الأداء الاجتماعي (على سبيل المثال، عدم رغبة الشخص في الحصول على العلاقات الحميمة لأنها ستجعل من الصعب التظاهر) أو من خلال المحاولات بأن يصبح معاقاً فعلياً مما يؤدي إلى تعريض صحة وحياة الفرد لخطر كبير.

اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية محددة أخرى 6C2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية، غير محددة 6C2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات الإدمانية

الوصف:

الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات الإدمانية هي اضطرابات عقلية وسلوكية تتطور نتيجة استخدام المواد ذات التأثير النفسي في الغالب، بما في ذلك الأدوية، أو سلوكيات محددة معززة متكررة ومُكافئة.

الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد

الوصف:

تشمل الاضطرابات الناتجة عن استعمال المخدرات نوبات وحيدة من استعمال مادة الضار، واضطرابات استعمال المواد (استعمال المواد الضار والاعتماد على المواد)، والاضطرابات المُحدثة بالمواد مثل الانسحاب بالمواد، وسحب المواد، والاضطرابات العقلية المُحدثة بالمواد، والاختلالات الجنسية، واضطرابات النوم واليقظة.

مضمنة في مكان آخر:

- كاتاتونيا مُحدثة بمواد ذات تأثير نفسي، متضمنة الأدوية 6A41

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول بنمط استعمال الكحول وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالكحول، فإن للكحول خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الكحول لدى بعض الأشخاص وسحب الكحول عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. الكحول متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للكحول ونمط ضار من استعمال الكحول. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالكحول في تعريف الاستعمال الضار للكحول. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها الكحول وأشكال الضعف المعرفي العصبي المرتبطة بالكحول.

الاستثناءات:

- الاستعمال الخطر للكحول (QE10)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الكحول تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من

أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكحول.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكحول C40.16

• الاعتماد على الكحول 6C40.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للكحول لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالكحول 6C40.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع هلاوس 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع أوهام 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول، غير محدد 6C40.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكحول 6C40.7

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكحول 6C40.71

قلق مُحَدَّث بالكحول 6C40.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكحول 6C40.3

نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16

الوصف:

نمط من استعمال الكحول تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكحول خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المخدرات نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكحول.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكحول 6C40.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكحول لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول، غير محدد

6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول
	(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
6C40.3	الانسمام بالكحول

نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي 6C40.16

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكحول تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكحول خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكحول.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكحول 6C40.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكحول، نوبي
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
--------	------------------

نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر 6C40.16

الوصف:

نمط من استعمال الكحول المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكحول خلا فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكحول.

المُشمَلات:

- إساءة استعمال الكحول المزمنة

الاستثناءات:

الاعتماد على الكحول 6C40.2

- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكحول، مستمر

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالكحول 6C40.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع هلاوس 6C40.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع أوهام 6C40.6

6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول

نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد 6C40.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكحول، غير محدد

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة

6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول
	(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
6C40.3	الانسمام بالكحول

الاعتماد على الكحول 6C40.2

الوصف:

الاعتماد على الكحول هو اضطراب في تنظيم استعمال الكحول ينشأ عن الاستعمال المتكرر أو المستمر للكحول. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الكحول، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية الممنوحة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الكحول. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكحول، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكحول، أو الاستخدام المتكرر للكحول أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الكحول مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

المُشمّلات:

• الكحولية المزمنة

• هَوَسٌ كُحُولِيّ

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16

• نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكحول 6C40.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول 6C40.6

6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول
(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر 6C40.20

الوصف:

نمط من استعمال الكحول المستمر (يوميًا أو شبه يومي) خلال فترة شهر واحد.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16

• نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدَث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي 6C40.21

الوصف:

خلال 12 شهراً الماضية، كان هناك اعتماد على الكحول مع شرب كثير متقطع، مع فترات الامتناع عن الكحول. إذا كان الاستخدام الحالي مستمراً (يوميّاً أو يومياً تقريباً على مدار الشهر الماضي على الأقل)، فيجب وضع تشخيص الاعتماد على الكحول، الاستخدام الحالي، مستمر بدلاً عنه.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدَّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدَّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة 6C40.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكحول، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن شرب الكحول لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدّث بالكحول

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، هدأة مستدامة جزئية 6C40.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكحول، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الكحول لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث شرب متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، هدأة مستدامة جزئية

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحدث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحدث بالكحول، غير محدد
6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، هداة مستدامة كاملة 6C40.24

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكحول، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن شرب الكحول لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16

- نوبة من الاستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، هداة مستدامة كاملة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.5 هذيان مُحدّث بالكحول

6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول

6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع هلاوس

6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أوهام

6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول مع أعراض مختلطة

6C40.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكحول، غير محدد

6C40.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول

6C40.71 اضطراب مزاج مُحدّث بالكحول

6C40.70 قلق مُحدّث بالكحول

6C72.10 اضطراب نساوة مُحدّث بالكحول

6D84.0 خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسحاب بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاعتماد على الكحول، غير محدد 6C40.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكحول، غير محدد

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C40.5	هذيان مُحَدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع هلاوس
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع أوهام
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول مع أعراض مختلطة
6C40.6	اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكحول، غير محدد

6C40.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول
6C40.71	اضطراب مزاج مُحدّث بالكحول
6C40.70	قلق مُحدّث بالكحول
6C72.10	اضطراب نساوة مُحدّث بالكحول
6D84.0	خرف ناجم عن استعمال الكحول

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الانسمام بالكحول 6C40.3

الوصف:

الانسمام بالكحول هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من تناول الكحول والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للكحول وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الكحول المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الكحول من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري ضعف الانتباه، والسلوك غير المناسب أو العدواني، وتقلب المزاج، وضعف المحاكمة، وضعف التناسق، والمشية غير المستقرة، والتلعثم في الكلام. في مستويات أكثر شدة من الانسمام، قد يحدث ذهول أو غيبوبة.

الاستثناءات:

- التسمم بالكحول (NE61)
- اضطراب غَيْبَةِ الحَيَاة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0	نوبة من الاستعمال الضار للكحول
6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W	خفيف
XS0T	معتدل
XS25	شديد

سحب الكحول 6C40.4

الوصف:

سحب الكحول هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكحول لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الكحول أو استخدموا الكحول لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب الكحول فرط النشاط الجهاز العصبي الذاتي، وزيادة رعاش اليد، والغثيان، والتهوع أو القيء، والأرق، والقلق، والإثارة النفسية الحركية، والهلاوس البصرية أو اللمسية أو السمعية، والتشتت. قد تكون حالة السحب معقدة بسبب الاختلاجات وهذا أقل شيوعاً. قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد جداً من الهذيان يتميز بالتخليط وفقدان التوجه والأوهام والهلاوس البصرية أو اللمسية أو السمعية لفترات طويلة. في مثل هذه الحالات، يجب أيضاً وضع تشخيص منفصل للهذيان الناتج عن الكحول.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب الكحول ولا تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في الإدراك أو اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول، غير مختلط

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية 6C40.41

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب الكحول ولا تكون حالة السحب مصحوبة باختلاج. تصبح حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. لا يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للذهيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب الكحول وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات. لا تصبح حالة السحب اضطرابات في الإدراك.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول، مع اختلاجات
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات 6C40.43

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب الكحول وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للذهيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

الوصف:

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكحول، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z الاعتماد على الكحول، غير محدد

الهذيان المُحدث بالكحول 6C40.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالكحول بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام الكحول. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكحول قادرة على إحداث الهذيان. قد تشمل السمات المحددة للهذيان المُحدث بالكحول نقص الوعي مع التخليط، والهلاوس والإخالات الشديدة، والأرق، والأوهام، والاستثارة، واضطراب الانتباه، وما يصاحبها من رعاش وأعراض فيزيولوجية لسحب الكحول. في بعض حالات سحب الكحول، قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد جداً من الهذيان الناجم عن الكحول. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

مُشمّلات:

- الهذيان الرعاشي (الناجم عن الكحول)
- الهذيان الناجم عن سحب الكحول

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0	نوبة من الاستعمال الضار للكحول
6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول 6C40.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب من الكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

مُشتمَلات:

● الغيرة الكحولية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع هلاوس 6C40.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع هلاوس لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0	نوبة من الاستعمال الضار للكحول
6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z

الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3

الانسمام بالكحول

6C40.4

سحب الكحول

6C40.40

سحب الكحول، غير مختلط

6C40.41

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية

6C40.42

سحب الكحول، مع اختلاجات

6C40.43

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C40.4Z

سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أوهام 6C40.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z

الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3

الانسمام بالكحول

6C40.4

سحب الكحول

6C40.40

سحب الكحول، غير مختلط

6C40.41

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية

6C40.42

سحب الكحول، مع اختلاجات

6C40.43

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C40.4Z

سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة 6C40.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z

الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3

الانسمام بالكحول

6C40.4

سحب الكحول

6C40.40

سحب الكحول، غير مختلط

6C40.41

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية

6C40.42

سحب الكحول، مع اختلاجات

6C40.43

سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C40.4Z

سحب الكحول، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول، غير محدد 6C40.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكحول مع غير محدد لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3 الانسحاب بالكحول

6C40.4 سحب الكحول

6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول 6C40.7

مضمنة في مكان آخر:

- اضطراب نساوة مُحدّث بالكحول 6D72.10
- خرف ناجم عن استعمال الكحول 6D84.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكحول
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0	نوبة من الاستعمال الضار للكحول
6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُخَدَّث بالكحول بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب من الكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث الأعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُخَدَّث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بالكحول بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الكحول أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب من الكحول أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكحول، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10

الوصف:

يتسم اضطراب النساوة الناتج عن استعمال الكحول بتطور أعراض النساوة التي تشترك في السمات السريرية الأولية مع اضطراب النساوة، ولكن يُحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة لاستخدام الكحول. تتطور أعراض اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكحول أو السحب منه، لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة المرتبطة عادةً بهذه الحالات. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب النساوة، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض النساوة قد سبقت بداية استخدام المادة أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استخدام المواد.

الاستثناءات:

- متلازمة كورساكوف (5B5A.11)
- متلازمة كورساكوف - فيرنكه (5B5A.1)

ملاحظة للترميز:

لا ينبغي استخدام هذه الفئة لوصف التغيرات المعرفية بسبب نقص الثيامين المرتبط باستعمال الكحول المزمن.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0

نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسحاب بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الوصف:

يتميز الخرف الناتج عن استعمال الكحول بتطور تدهور في القدرات المعرفية مستمر (على سبيل المثال، مشاكل الذاكرة وضعف اللغة وعدم القدرة على أداء المهام الحركية المعقدة) ما يلي المتطلبات التعريفية للخرف والتي تعتبر نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول وتستمر إلى ما بعد المدة المعتادة للانسمام بالكحول أو السحب الحاد. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول كافية للتسبب بالضعف المعرفي. لا يفسر الخلل المعرفي بشكل أفضل عن طريق اضطراب أو مرض لا يسببه الكحول مثل الخرف بسبب اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر.

مُشمِلات:

اضطراب النسابة بسبب استعمال الكحول 6D72.10

الاستثناءات:

• متلازمة كورساكوف (5B5A.11)

• متلازمة كورساكوف - فيرنكه (5B5A.1)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى خرف بسبب استعمال الكحول

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W	خفيف
XS0T	معتدل
XS25	شديد

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكحول 6C40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكحول

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0 نوبة من الاستعمال الضار للكحول

6C40.1 نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.10 نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي

6C40.11 نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر

6C40.1Z نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد

6C40.2 الاعتماد على الكحول

6C40.20 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر

6C40.21 الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة

6C40.23 الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة

6C40.24 الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة

6C40.2Z الاعتماد على الكحول، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3 الانسحاب بالكحول

6C40.4 سحب الكحول

6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

اضطرابات بسبب استعمال الكحول، غير محددة 6C40.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الكحول، غير محددة
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C40.0	نوبة من الاستعمال الضار للكحول
6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي

6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش 6C41

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش بنمط استعمال الحشيش وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالحشيش، فإن للحشيش خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الحشيش لدى بعض الأشخاص وسحب الحشيش عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. الحشيش متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للحشيش ونمط ضار من استعمال الحشيش. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالحشيش في تعريف الاستعمال الضار للحشيش. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها الحشيش.

الاستثناءات:

- الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصناعي (6C42)
- الاستعمال الخطر للحشيش (QE11)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش

6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسمام بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الحشيش تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الحشيش.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1

• الاعتماد على الحشيش 6C41.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للحشيش

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالحشيش 6 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالحشيش 6C41.6

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالحشيش 6C41.7

قلق مُحدَّث بالحشيش 6C41.70

اضطراب مزاج مُحدَّث بالحشيش 6C41.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالحشيش 6C41.3

نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال الحشيش تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الحشيش خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الحشيش نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي

ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الحشيش.

الاستثناءات:

• الاعتماد على الحشيش 6C41.2

• نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الحشيش

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالحشيش 6 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالحشيش 6C41.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالحشيش 6C41.7

قلق مُحدّث بالحشيش 6C41.70

اضطراب مزاج مُحدّث بالحشيش 6C41.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالحشيش 6C41.3

نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي 6C41.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الحشيش تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الحشيش النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الحشيش.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الحشيش 6C41.2
- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الحشيش، نوبي

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالحشيش 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالحشيش 6C41.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالحشيش 6C41.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالحشيش 6C41.3

الوصف:

نمط من استعمال الحشيش المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الحشيش خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الحشيش.

الاستثناءات:

• الاعتماد على الحشيش 6C41.2

• نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الحشيش، مستمر

لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالحشيش 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالحشيش 6C41.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالحشيش 6C41.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالحشيش 6C41.3

نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد 6C41.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الحشيش، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالحشيش 6 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالحشيش 6C41.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالحشيش 6C41.7

قلق مُحَدَّث بالحشيش 6C41.70

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالحشيش 6C41.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالحشيش 6C41.3

الاعتماد على الحشيش 6C41.2

الوصف:

الاعتماد على الحشيش هو اضطراب في تنظيم استعمال الحشيش ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للحشيش. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الحشيش، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الحشيش. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الحشيش، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الحشيش، أو الاستخدام المتكرر للحشيش أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الحشيش مستمر (يوميّاً أو تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|------------------------------|
| 6C41.5 | هذيان مُحدَث بالحشيش |
| 6C41.6 | اضطراب ذهاني مُحدَث بالحشيش |
| 6C41.7 | اضطرابات أخرى مُحدثة بالحشيش |
| 6C41.71 | قلق مُحدَث بالحشيش |
| 6C41.70 | اضطراب مزاج مُحدَث بالحشيش |

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C41.3 الانسحاب بالحشيش

6C41.4 سحب الحشيش

الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي 6C41.20

الوصف:

الاعتماد على الحشيش حالياً مع استعمال للحشيش خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1

- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C41.5 هذيان مُحْدَث بالحشيش

6C41.6 اضطراب ذهاني مُحْدَث بالحشيش

6C41.70 اضطراب مزاج مُحْدَث بالحشيش

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C41.3 الانسحاب بالحشيش

6C41.4 سحب الحشيش

الاعتماد على الحشيش، هدأة كاملة مبكرة 6C41.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الحشيش، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال الحشيش لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C41.5 هذيان مُحَدَّث بالحشيش
- 6C41.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالحشيش
- 6C41.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالحشيش

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C41.3 الانسحاب بالحشيش
- 6C41.4 سحب الحشيش

الاعتماد على الحشيش، هدأة مستدامة جزئية 6C41.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الحشيش، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الحشيش لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش، هدأة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C41.5 هذيان مُحَدَّث بالحشيش
- 6C41.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالحشيش
- 6C41.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالحشيش

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C41.3 الانسحاب بالحشيش
- 6C41.4 سحب الحشيش

الاعتماد على الحشيش، هدأة مستدامة كاملة 6C41.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الحشيش، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال الحشيش لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للحشيش 6C41.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C41.5 هذيان مُحدَث بالحشيش
- 6C41.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالحشيش
- 6C41.70 اضطراب مزاج مُحدَث بالحشيش

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C41.3 الانسحاب بالحشيش
- 6C41.4 سحب الحشيش

الاعتماد على الحشيش، غير محدد 6C41.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الحشيش، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C41.5 هذيان مُحدّث بالحشيش

6C41.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالحشيش

6C41.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالحشيش

6C41.71 قلق مُحدّث بالحشيش

6C41.70 اضطراب مزاج مُحدّث بالحشيش

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C41.3 الانسمام بالحشيش

6C41.4 سحب الحشيش

الانسمام بالحشيش 6C41.3

الوصف:

الانسمام بالحشيش هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الحشيش والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للحشيش وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الحشيش المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الحشيش من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري البهجة غير المناسبة، وضعف الانتباه، ضعف الحكم، التبدلات الإدراكية (مثل الإحساس بالطفو، والإدراك المتبدل للزمن)، والتغيرات في التواصل الاجتماعي، وزيادة الشهية، والقلق، وتكثيف التجارب العادية، وضعف الذاكرة قصيرة المدى، والكسل. تشمل العلامات الجسدية احتقان الملتحمة (العيون الحمراء أو المحترقة بالدم) وتسرع القلب.

الاستثناءات:

- التسمم بالكابابينويد (NE60)
- اضطراب غَيَبَةِ الحَيَازَةِ (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد

6C41.2

الاعتماد على الحشيش

6C41.20

الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي

6C41.21

الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة

6C41.22

الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة

6C41.23

الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة

6C41.2Z

الاعتماد على الحشيش، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

6C41.4 سحب الحشيش

الوصف:

سحب الحشيش هو تجمع واضح سريراً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الحشيش لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الحشيش أو استخدموا الحشيش لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب الحشيش قد تشمل التهيج، والغضب، والرعاش، والأرق، والاستثارة، والقلق، والمزاج المعكر، واضطراب الشهية، وآلام البطن والعضلات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الحشيش

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

الهذيان المُحدث بالحشيش 6C41.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالحشيش بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام الحشيش. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الحشيش قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي

6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الهدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الهدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الهدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C41.3	الانسمام بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالحشيش 6C41.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالحشيش بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال

الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسحاب بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطرابات أخرى مُحدثة بالحشيش 6C41.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بالحشيش

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C41.0 نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
 - 6C41.1 نمط ضار من استعمال الحشيش
 - 6C41.10 نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
 - 6C41.11 نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
 - 6C41.1Z نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
 - 6C41.2 الاعتماد على الحشيش
 - 6C41.20 الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
 - 6C41.21 الاعتماد على الحشيش، الهدأة كاملة مبكرة
 - 6C41.22 الاعتماد على الحشيش، الهدأة جزئية مستدامة
 - 6C41.23 الاعتماد على الحشيش، الهدأة كاملة مستدامة
 - 6C41.2Z الاعتماد على الحشيش، غير محدد
- (مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):
- 6C41.3 الانسحاب بالحشيش
 - 6C41.4 سحب الحشيش

اضطراب مزاج مُحدَّث بالحشيش 6C41.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالحشيش بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث الأعراض المزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي

6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسمام بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطراب قلق مُحَدَّث بالحشيش 6C41.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالحشيش بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالحشيش أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالحشيش أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الحشيش، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالحشيش

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسحاب بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الحشيش 6C41.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الحشيش

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسحاب بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

اضطرابات بسبب استعمال الحشيش، غير محددة 6C41.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الحشيش، غير محددة

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C41.0	نوبة من الاستعمال الضار للحشيش
6C41.1	نمط ضار من استعمال الحشيش
6C41.10	نمط ضار من استعمال الحشيش، نوبي
6C41.11	نمط ضار من استعمال الحشيش، مستمر
6C41.1Z	نمط ضار من استعمال الحشيش، غير محدد
6C41.2	الاعتماد على الحشيش
6C41.20	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي
6C41.21	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مبكرة
6C41.22	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على الحشيش، الاستعمال الحالي، هدأة كاملة مستدامة
6C41.2Z	الاعتماد على الحشيش، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C41.3	الانسحاب بالحشيش
6C41.4	سحب الحشيش

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصناعي 6C42

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصناعي بنمط استعمال الكانابينويد الصناعي وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالكانابينويد الصناعي، فإن للكانابينويد الصناعي خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الكانابينويد الصناعي لدى بعض الأشخاص وسحب الكانابينويد الصناعي عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. الكانابينويد الصناعي متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي ونمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالكانابينويد الصناعي في تعريف الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها الكانابينويد الصناعي.

الاستثناءات:

- الاضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش (6C41)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصناعي لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسحاب بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي 6C42.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الكانابينويد الصناعي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكانابينويد الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكانابينويد الصناعي.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي 6C42.1
- الاعتماد على الكانابينويد الصناعي 6C42.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي 6C42.7
- قلق مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.70
- اضطراب مزاج مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3

الانسمام بالكاناينويد الصناعي

نمط ضار من استعمال الكاناينويد الصناعي 6C42.1

الوصف:

نمط من استعمال الكاناينويد الصناعي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكاناينويد الصناعي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الكاناينويد الصناعي نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكاناينويد الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكاناينويد الصناعي.

الاستثناءات:

• الاعتماد على الكاناينويد الصناعي 6C42.2

• نوبة من الاستعمال الضار للكاناينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاناينويد الصناعي

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C42.5

هذيان مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

6C42.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكابايينويد الصناعي 6C42.7

قلق مُحدّث بالكابايينويد الصناعي 6C42.70

اضطراب مزاج مُحدّث بالكابايينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكابايينويد الصناعي 6C42.3

نمط ضار من استعمال الكابايينويد الصناعي، نوبي 6C42.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكابايينويد الصناعي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكابايينويد الصناعي النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكابايينويد الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكابايينويد الصناعي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكابايينويد الصناعي 6C42.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكابايينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكابايينويد الصناعي، نوبي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C42.5 هذيان مُحدّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي

6C42.70 قلق مُحدّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.71 اضطراب مزاج مُحدّث بالكانابينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، مستمر 6C42.11

الوصف:

نمط من استعمال الكانابينويد الصناعي المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكانابينويد الصناعي خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكانابينويد الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكانابينويد الصناعي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكانابينويد الصناعي 6C42.2

- نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، مستمر لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي 6C42.7

قلق مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.70

اضطراب مزاج مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالكانابينويد الصناعي 6C42.3

نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، محدد آخر 6C42.1Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محدد آخر"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصناعي، محدد آخر لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاباينويد الصناعي 6C42.7

قلق مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.70

اضطراب مزاج مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاباينويد الصناعي 6C42.3

نمط ضار من استعمال الكاباينويد الصناعي، غير محدد 6C42.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاباينويد الصناعي، غير محدد

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.5

اضطراب ذهاني مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاباينويد الصناعي 6C42.7

قلق مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.70

اضطراب مزاج مُحدث بالكاباينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاباينويد الصناعي 6C42.3

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي 6C42.2

الوصف:

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي هو اضطراب في تنظيم استعمال الكانابينويد الصناعي ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للكانابينويد الصناعي. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الكانابينويد الصناعي، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الكانابينويد الصناعي. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكانابينويد الصناعي، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكانابينويد الصناعي، أو الاستخدام المتكرر للكانابينويد الصناعي أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الكانابينويد الصناعي مستمر (يومية أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكانابينويد الصناعي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C42.5 | هذيان مُحدّث بالكانابينويد الصناعي |
| 6C42.6 | اضطراب ذهاني مُحدّث بالكانابينويد الصناعي |
| 6C42.7 | اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي |
| 6C42.70 | قلق مُحدّث بالكانابينويد الصناعي |

اضطراب مزاج مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكانابينويد الصناعي 6C42.3

سحب الكانابينويد الصناعي 6C42.4

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، الاستعمال الحالي 6C42.20

الوصف:

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي حالياً مع استعمال للكانابينويد الصناعي خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصناعي 6C42.1

• نوبة من الاستعمال الضار للكانابينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكانابينويد الصناعي 6C42.7

قلق مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.70

اضطراب مزاج مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C42.3 الانسحاب بالكابايينويد الصناعي
- 6C42.4 سحب الكابايينويد الصناعي

الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، هدأة كاملة مبكرة 6C42.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال الكابايينويد الصناعي لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكابايينويد الصناعي 6C42.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكابايينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

- 6C42.5 هذيان مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي
- 6C42.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي
- 6C42.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكابايينويد الصناعي
- 6C42.70 قلق مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي
- 6C42.71 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكاناينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكاناينويد الصناعي

الاعتماد على الكاناينويد الصناعي، هدأة مستدامة جزئية 6C42.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكاناينويد الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الكاناينويد الصناعي لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاناينويد الصناعي 6C42.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكاناينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاناينويد الصناعي، هدأة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C42.5 هذيان مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

6C42.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

6C42.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكاناينويد الصناعي

6C42.70 قلق مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

6C42.71 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكاناينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسحاب بالكابايينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكابايينويد الصناعي

الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، هدأة مستدامة كاملة 6C42.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال الكابايينويد الصناعي لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكابايينويد الصناعي 6C42.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكابايينويد الصناعي 6C42.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكابايينويد الصناعي، هدأة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C42.5 هذيان مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي

6C42.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي

6C42.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكابايينويد الصناعي

6C42.70 قلق مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي

6C42.71 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكابايينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي محدد آخر 6C42.2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكانابينويد الصناعي محدد آخر

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C42.5 هذيان مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكانابينويد الصناعي

6C42.70 قلق مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.71 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، غير محدد 6C42.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C42.5 هذيان مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكانابينويد الصناعي

6C42.70 قلق مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

6C42.71 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكانابينويد الصناعي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسحاب بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

الانسمام بالكانابينويد الصناعي 6C42.3

الوصف:

الانسمام بالكانابينويد الصناعي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكانابينويد الصناعي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للكانابينويد الصناعي وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الكانابينويد الصناعي المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الكانابينويد الصناعي من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري البهجة غير المناسبة، وضعف الانتباه، ضعف الحكم، التبدلات الإدراكية (مثل الإحساس بالطفو، والإدراك المتبدل للزمن)، والتغيرات في التواصل الاجتماعي، وزيادة الشهية، والقلق، وتكثيف التجارب العادية، وضعف الذاكرة قصيرة المدى، والكسل. تشمل العلامات الجسدية احتقان الملتحمة (العيون الحمراء أو المحتقنة بالدم) وتسرع القلب.

الاستثناءات:

- التسمم بالكانابينويد (NE60)
- اضطراب غَيَبَةِ الحَيَاة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

خفيف XS5W

معتدل XS0T

شديد XS25

سحب الكانابينويد الصناعي 6C42.4

الوصف:

سحب الكانابينويد الصناعي هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكانابينويد الصناعي لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الكانابينويد الصناعي أو استخدموا الكانابينويد الصناعي لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب الكانابينويد الصناعي قد تشمل التهيج، والغضب، والرعاش، والأرق، والاستثارة، والقلق، والمزاج المعكر، واضطراب الشهية، وآلام البطن والعضلات. في المرحلة المبكرة، قد يكون يصاحب سحب الكانابينويد الصناعي سمات متبقية من الانسحاب بالمادة، مثل التفكير المضطهاري، والهلاوس السمعية والبصرية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

الاعتماد على الكانابينويد الصناعي 6C42.2

6C42.20 الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، الاستعمال الحالي

6C42.21 الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هدأة كاملة مبكرة

6C42.22 الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.23 الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، هدأة كاملة مستدامة

6C42.2Y الاعتماد على الكانابينويد الصناعي محدد آخر

6C42.2Z الاعتماد على الكانابينويد الصناعي، غير محدد

الهذيان المُحدث بالكانابينويد الصناعي 6C42.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالكانابينويد الصناعي بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام أو السحب أو أثناء استخدام الكانابينويد الصناعي. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكانابينويد الصناعي قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكنايينويد الصناعي 6C42.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالكنايينويد الصناعي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكنايينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالكنايينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكنايينويد الصناعي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكنايينويد الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكنايينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكنايينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بالكنايينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكنايينويد الصناعي 6C42.3

سحب الكنايينويد الصناعي 6C42.4

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي 6C42.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكانابينويد الصناعي 6C42.3

سحب الكانابينويد الصناعي 6C42.4

اضطراب مزاج مُحدّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدّث بالكانابينويد الصناعي بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصناعي قادرة على إحداث الأعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير

مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالكانابينويد الصناعي

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

اضطراب قلق مُحدَّث بالكانابينويد الصناعي 6C42.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالكانابينويد الصناعي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكانابينويد الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصناعي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالكانابينويد الصناعي
لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C42.3 الانسمام بالكانابينويد الصناعي

6C42.4 سحب الكانابينويد الصناعي

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الأفيون 6C43

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الأفيون بنمط استعمال الأفيون وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالأفيون، فإن للأفيون خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الأفيون لدى بعض الأشخاص وسحب الأفيون عند تقليل الاستعمال أو التوقف عنه. الأفيون متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للأفيون ونمط ضار من استعمال الأفيون. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالأفيون في تعريف الاستعمال الضار للأفيون. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها الأفيون.

الاستثناءات:

- الاستعمال الخطر للأفيون (QE11.0)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الأفيون

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة

6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هداة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هداة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1

الوصف:

نمط من استعمال الأفيون تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الأفيون خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الأفيون نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستعمال مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالأفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الأفيون.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الأفيون 6C43.2

- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الأفيون

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي 6C43.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الأفيون تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الأفيون النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالأفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الأفيون.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الأفيون 6C43.2
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الأفيون، نوبي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر 6C43.11

الوصف:

نمط من استعمال الأفيون المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الأفيون خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى

الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب من الأفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الأفيون.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الأفيون 6C43.2

- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الأفيون، مستمر

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد 6C43.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الأفيون، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على الأفيون 6C43.2

الوصف:

الاعتماد على الأفيون هو اضطراب في تنظيم استعمال الأفيون ينشأ عن الاستعمال المتكرر أو المستمر للأفيون. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الأفيون، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستعمال، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الأفيون. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الأفيون، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الأفيون، أو الاستعمال المتكرر للأفيون أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الأفيون مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الأفيون 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| 6C41.5 | هذيان مُحَدَّث بالأفيون |
| 6C43.6 | اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون |
| 6C43.7 | اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون |
| 6C43.71 | قلق مُحَدَّث بالأفيون |
| 6C43.70 | اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون |

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي 6C43.20

الوصف:

الاعتماد على الأفيون حالياً مع استعمال للأفيون خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة 6C43.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الأفيون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال الأفيون لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحدّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحدّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة جزئية 6C43.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الأفيون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الأفيون لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C41.5 هذيان مُحَدَّث بالأفيون

6C43.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون

6C43.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون

6C43.71 قلق مُحَدَّث بالأفيون

6C43.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة كاملة 6C43.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الأفيون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال الأفيون لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1
- نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون، هدأة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الأفيون، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الانسمام بالأفيون 6C43.3

الوصف:

الانسمام بالأفيون هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الأفيون والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للأفيون وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الأفيون المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتخفي حين يزول الأفيون من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري الميل للنوم، وتغيرات الحالة المزاجية (على سبيل المثال، النشوة غير المناسبة التي تليها اللامبالاة وخلل النطق)، وقلة الحركة، وضعف المحاكمة، والضعف التنفسي، والتلعثم في الكلام، وضعف الذاكرة والانتباه. في حالة التسمم الشديد، قد تحدث غيبوبة. هناك علامة جسدية مميزة هي انقباض حدقة العين ولكن هذه العلامة قد تكون غائبة عندما يكون التسمم عائداً للمواد الأفيونية الاصطناعية. يمكن أن يؤدي التسمم الشديد بالمواد الأفيونية إلى الوفاة بسبب تثبيط الجهاز التنفسي المفرط.

الاستثناءات:

- التسمم بالأفيون (NE60)
- اضطراب غَيْبَةِ الحَيَاة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالأفيون

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون

6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب الأفيون 6C43.4

الوصف:

سحب الأفيون هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الأفيون لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الأفيون أو استخدموا الأفيون لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب الأفيون المزاج المعكر، والتوق لتناول مادة أفيونية، والقلق، والغثيان أو القيء، وآلام البطن والعضلات، والتثاؤب، والتعرق، والهبات الساخنة والباردة، والدَمَعان، وسيلان الأنف، وفُط النوم (عادةً في المرحلة الأولى) أو الأرق، والإسهال، وانتِصابُ الشَّعْر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الأفيون

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الهديان المُحدث بالأفيون 6C43.5

الوصف:

يتسم الهديان المُحدث بالأفيون بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهديان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام الأفيون. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الأفيون قادرة على إحداث الهديان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

المُشمّلات:

الهديان المُحدث بسحب الأفيون

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهديان المُحدث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C43.1 نمط ضار من استعمال الأفيون
- 6C43.10 نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
- 6C43.11 نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
- 6C43.1Z نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
- 6C43.2 الاعتماد على الأفيون
- 6C43.20 الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
- 6C43.21 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
- 6C43.22 الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
- 6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
- 6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالأفيون 6C43.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالأفيون بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب من الأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة

6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد
6C43.0	نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى مُحدثة بالأفيون 6C43.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بالأفيون
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C43.1 نمط ضار من استعمال الأفيون
- 6C43.10 نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
- 6C43.11 نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
- 6C43.1Z نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
- 6C43.2 الاعتماد على الأفيون
- 6C43.20 الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
- 6C43.21 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
- 6C43.22 الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
- 6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
- 6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد
- 6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بالأفيون بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث الأعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة

6C43.23 الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة

6C43.2Z الاعتماد على الأفيون، غير محدد

6C43.0 نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالأفيون بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، والسلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالأفيون أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالأفيون أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الأفيون قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الأفيون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الأفيون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الأفيون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالأفيون

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C43.1 نمط ضار من استعمال الأفيون

6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد
6C43.0	نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نوبة من الاستعمال الضار للأفيون 6C43.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الأفيون تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالأفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من

الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الأفيون.

الاستثناءات:

● نمط ضار من استعمال الأفيون 6C43.1

● الاعتماد على الأفيون 6C413.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالأفيون 6C41.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالأفيون 6C43.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالأفيون 6C43.7

قلق مُحَدَّث بالأفيون 6C43.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالأفيون 6C43.70

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الأفيون 6C43.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الأفيون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد
6C43.0	نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات بسبب استعمال الأفيون، غير محددة 6C43.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الأفيون، غير محددة لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C43.1	نمط ضار من استعمال الأفيون
6C43.10	نمط ضار من استعمال الأفيون، نوبي
6C43.11	نمط ضار من استعمال الأفيون، مستمر
6C43.1Z	نمط ضار من استعمال الأفيون، غير محدد
6C43.2	الاعتماد على الأفيون
6C43.20	الاعتماد على الأفيون، الاستعمال الحالي
6C43.21	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مبكرة
6C43.22	الاعتماد على الأفيون، هدأة جزئية مستدامة
6C43.23	الاعتماد على الأفيون، هدأة كاملة مستدامة
6C43.2Z	الاعتماد على الأفيون، غير محدد
6C43.0	نوبة من الاستعمال الضار للأفيون

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق بنمط استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق، فإن للمهدئات والمنومات ومضادات القلق خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق لدى بعض الأشخاص وسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنها. المهدئات والمنومات ومضادات القلق متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق ونمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق في تعريف الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها المهدئات والمنومات ومضادات القلق.

الاستثناءات:

- الاستعمال الخطر للمهدئات والمنومات ومضادات القلق (QE11.2)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسحاب؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1

• الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

قلق مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى

السلوك الناجم عن الانسحاب من المهدئات والمنومات ومضادات القلق من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق .

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7
- قلق مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70
- (مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي 6C44.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

- 6C44.5 هذيان مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق
 - 6C44.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق
 - 6C44.7 اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق
 - 6C44.71 قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق
 - 6C44.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- (مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر 6C44.11

الوصف:

نمط من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C44.5 هذيان مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.71 قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C44.5 هذيان مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.71 قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2

الوصف:

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق هو اضطراب في تنظيم استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للمهدئات والمنومات ومضادات القلق. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات المهدئات والمنومات ومضادات القلق، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو الاستخدام المتكرر للمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

قلق مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

اضطراب مزاج مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي 6C44.20

الوصف:

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق حالياً مع استعمال للمهدئات والمنومات ومضادات القلق خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

قلق مُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة 6C44.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة جزئية 6C44.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك المهدئات والمنومات ومضادات القلق لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

قلق مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة كاملة 6C44.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

- هذيان مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5
- اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6
- اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7
- قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71
- اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C44.5 هذيان مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.71 قلق مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.70 اضطراب مزاج مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.3

الوصف:

الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للمهدئات والمنومات ومضادات القلق وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المهدئات والمنومات ومضادات القلق المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول المهدئات والمنومات ومضادات القلق من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري نعاس، ضعف في المحاكمة، لعممة في الكلام، ضعف التنسيق الحركي، مشية غير متزنة، تقلب المزاج، بالإضافة إلى ضعف الذاكرة والانتباه والتركيز. الرؤية (حركات العين المتكررة غير المتحكم بها) علامة جسدية شائعة.

المُشمَلات:

- رحلات سيئة (المهدئات والمنومات ومضادات القلق)

الاستثناءات:

- التسمم بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق (NE60)
- اضطراب غَيَبَةِ الحياة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C44.0 | نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق |
| 6C44.1 | نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق |
| 6C44.10 | نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي |

6C44.11	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
6C44.1Z	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الشدة (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.4

الوصف:

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو استخدموا المهدئات والمنومات ومضادات القلق لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أن يحدث سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق أيضاً عند استخدام سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق بالجرعات العلاجية القياسية. قد تشمل تظاهرات سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستثارة النفسية الحركية، والأرق، وزيادة رعاش اليد، والغثيان أو القيء، والأوهام أو الهلاوس البصرية أو اللمسية أو السمعية. قد تكون هناك علامات على فرط النشاط العصبي الذاتي، أو انخفاض ضغط الدم الوضعي. قد تكون حالة السحب معقدة بسبب الاختلاجات وهذا أقل شيوعاً. قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد جداً من الهذيان يتميز بالتخليط وفقدان التوجه والأوهام والهلاوس البصرية أو اللمسية أو السمعية لفترات طويلة. في مثل هذه الحالات، يجب أيضاً وضع تشخيص منفصل للهذيان الناتج عن المهدئات أو المنومات أو مضادات القلق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير مختلط 6C44.40

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق ولا تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في الإدراك أو اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير مختلط

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي

6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة

6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة

6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة

6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية 6C44.41

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق ولا تكون حالة السحب مصحوبة باختلاج. تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. لا يوجد دليل على حدوث تخطيط ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للمهذيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اختلاجات 6C44.42

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات. لا تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اختلاجات لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي

6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة

6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة

6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة

6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات 6C44.43

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للذهيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.4Z

الوصف:

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي

6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة

6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة

6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة

6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الهذيان المُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث الهذيان. قد تشمل الأعراض التخليط وعدم التوجه، وأوهام اضطهادية، وهلاوس بصرية أو لمسية أو سمعية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

مُشمّلات:

- هذيان مُحدث بسحب المهدئات والمنومات ومضادات القلق

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي 6C44.10

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر 6C44.11

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.1Z

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2

الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي 6C44.20

- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.0
- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1
- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي 6C44.10
- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر 6C44.11
- نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.1Z
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.2
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي 6C44.20
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة 6C44.21
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة 6C44.22
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة 6C44.23
- الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد 6C44.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.7

مضمنة في مكان آخر:

- اضطراب نساوة مُحدّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6D72.11
- خرف ناجم عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6D84.1

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تتميز الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث الأعراض المزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق

6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب قلق مُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطرابات بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محددة 6C44.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محددة لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C44.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين 6C45

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين بنمط استعمال الكوكائين وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب من الكوكائين، فإن للكوكائين خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الكوكائين لدى بعض الأشخاص وسحب الكوكائين عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنها. الكوكائين متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للكوكائين ونمط ضار من استعمال الكوكائين. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب من الكوكائين في تعريف الاستعمال الضار للكوكائين. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها الكوكائين.

الاستثناءات:

- الاضطرابات الناتجة عن استخدام المنشطات، بما في ذلك الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكائينون (6C46)
- الاستعمال الخطر للكوكائين (QE11.3)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين

6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الكوكائين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكوكائين .

الاستثناءات:

● نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1

● الاعتماد على الكوكائين 6C45.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين 6C45.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين 6C45.70

قلق مُحدَّث بالكوكائين 6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكوكائين 6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين 6C45.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالكوكائين 6C45.3

نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال الكوكائين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكوكائين خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الكوكائين نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكوكائين.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكوكائين 6C45.2

- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين 6C45.7

اضطراب مزاج مُحدَث بالكوكائين 6C45.70

قلق مُحدَث بالكوكائين 6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالكوكائين 6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بالكوكائين 6C45.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكوكائين 6C45.3

نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي 6C45.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكوكائين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكوكائين النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكوكائين .

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكوكائين 6C45.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين، نوبي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكوكائين 6C45.7

اضطراب مزاج مُحدّث بالكوكائين 6C45.70

قلق مُحدّث بالكوكائين 6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين 6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدّث بالكوكائين 6C45.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكوكائين 6C45.3

الوصف:

نمط من استعمال الكوكائين المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكوكائين خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكوكائين

الاستثناءات:

• الاعتماد على الكوكائين 6C45.2

• نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين، مستمر لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

6C45.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكوكائين
6C45.70	اضطراب مزاج مُحدّث بالكوكائين
6C45.71	قلق مُحدّث بالكوكائين
6C45.73	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين
6C45.72	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدّث بالكوكائين

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
--------	---------------------

نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد 6C45.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين، غير محدد

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C44.5	هذيان مُحدّث بالكوكائين
6C45.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين
6C45.60	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس
6C45.61	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام
6C45.62	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
6C45.6Z	اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد

- اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين 6C45.7
- اضطراب مزاج مُحدَث بالكوكائين 6C45.70
- قلق مُحدَث بالكوكائين 6C45.71
- اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالكوكائين 6C45.73
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بالكوكائين 6C45.72

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسمام بالكوكائين 6C45.3

الاعتماد على الكوكائين 6C45.2

الوصف:

الاعتماد على الكوكائين هو اضطراب في تنظيم استعمال الكوكائين ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للكوكائين. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الكوكائين، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الكوكائين. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكوكائين، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكوكائين، أو الاستخدام المتكرر للكوكائين أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الكوكائين مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C41.1

- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

6C45.6Z	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين، غير محدد
6C45.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكوكائين
6C45.70	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين
6C45.71	قلق مُحدَّث بالكوكائين
6C45.73	اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكوكائين
6C45.72	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين
	متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي 6C45.20

الوصف:

الاعتماد على الكوكائين حالياً مع استعمال للكوكائين خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بالكوكائين 6C44.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكوكائين 6C45.7
- اضطراب مزاج مُحدّث بالكوكائين 6C45.70
- قلق مُحدّث بالكوكائين 6C45.71
- اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين 6C45.73
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدّث بالكوكائين 6C45.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسمام بالكوكائين 6C45.3
- سحب الكوكائين 6C45.4

الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة 6C45.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكوكائين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال الكوكائين لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1

- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكوكائين 6C45.7

اضطراب مزاج مُحدّث بالكوكائين 6C45.70

قلق مُحدّث بالكوكائين 6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين 6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدّث بالكوكائين 6C45.72

متوافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3 الانسحاب بالكوكائين

6C45.4 سحب الكوكائين

الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة جزئية 6C45.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكوكائين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الكوكائين لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1

- نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكوكائين 6C45.7

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.70

قلق مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين 6C45.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكوكائين 6C45.3

سحب الكوكائين 6C45.4

الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة كاملة 6C45.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكوكائين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال الكوكائين لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1

• نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين 6C45.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالكوكائين 6C44.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين 6C45.6

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

6C45.62	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
6C45.6Z	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين، غير محدد
6C45.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين
6C45.70	اضطراب مزاج مُحدَث بالكوكائين
6C45.71	قلق مُحدَث بالكوكائين
6C45.73	اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالكوكائين
6C45.72	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بالكوكائين

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

الاعتماد على الكوكائين، غير محدد 6C45.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C44.5	هذيان مُحدَث بالكوكائين
6C45.6	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين
6C45.60	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع هلاوس
6C45.61	اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أوهام

6C45.62	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
6C45.6Z	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين، غير محدد
6C45.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين
6C45.70	اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين
6C45.71	قلق مُحدَّث بالكوكائين
6C45.73	اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكوكائين
6C45.72	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَّث بالكوكائين
متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

الانسمام بالكوكائين 6C45.3

الوصف:

الانسمام بالكوكائين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكوكائين والتي تنسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للكوكائين وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الكوكائين المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الكوكائين من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري النشوة، القلق، الغضب، ضعف الانتباه، اليقظة المفرطة، الاستثارة النفسية الحركية، التفكير الاضطهادي (في بعض الأحيان يصل شدة الوهم)، الهلوس السمعية، الارتباك، والتغيرات في التواصل الاجتماعي. قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة وغثيان أو قيء وخفقان وألم في الصدر. قد تشمل العلامات

الجسدية عدم انتظام دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتوسع الحديقة. في حالات نادرة، عادة في حالات التسمم الحاد، يمكن أن يؤدي استعمال الكوكائين إلى اختلاجات أو ضعف عضلي أو خلل في الحركة أو خلل التوتر العضلي.

الاستثناءات:

- التسمم بالكوكائين (NE60)
- اضطراب غَيْبَةِ الحياة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

الشدة (استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

خفيف XS5W

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب الكوكائين 6C45.4

الوصف:

سحب الكوكائين هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكوكائين لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الكوكائين أو استخدموا الكوكائين لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أن يحدث سحب الكوكائين أيضاً عند استخدام سحب الكوكائين بالجرعات العلاجية القياسية. قد تشمل مظاهرات سحب الكوكائين، تعكر المزاج، والتهيج، والتعب، والكسل، والكوابيس الحية، والأرق أو فرط النوم، وزيادة الشهية، والقلق، والاستثارة الحركية أو البطء، والتوق للكوكائين.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكوكائين

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C45.2 الاعتماد على الكوكائين

6C45.20 الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

6C45.21 الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة

6C45.22 الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة

6C45.23 الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة

6C45.2Z الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

الهذيان المُحدث بالكوكائين 6C45.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالكوكائين بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام الكوكائين. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكوكائين قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

مُشمّلات:

- هذيان مُحدث بسحب الكوكائين

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة

6C45.23 الاعتماد على الكوكائين، هداة كاملة مستدامة

6C45.22 الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3 الانسمام بالكوكائين

6C45.4 سحب الكوكائين

6C45.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع هلاوس 6C45.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3 الانسمام بالكوكائين

6C45.4 سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين مع أوهام

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C45.0 نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

6C45.1 نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.10 نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي

6C45.11 نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر

6C45.12 نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد

6C45.2 الاعتماد على الكوكائين

6C45.20 الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هداة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هداة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هداة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3 الانسحاب بالكوكائين

6C45.4 سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكوكائين. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C45.0 نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

6C45.1 نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكوكائين، غير محدد 6C45.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكوكائين، غير محدد
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين 6C45.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين 6C45.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالكوكائين بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكوكائين أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالكوكائين أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث الأعراض المزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي

6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هداة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هداة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هداة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب قلق مُحَدَّث بالكوكائين 6C45.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالكوكائين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكوكائين أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكوكائين أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالكوكائين 6C45.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالكوكائين إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادةً ما تكون مصحوبةً بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من الكوكائين، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال الكوكائين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0

نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر

6C45.1Z

نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد

6C45.2

الاعتماد على الكوكائين

6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكوكائين 6C45.73

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بالكوكائين بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحافِز أو الباعِث لأداء عمل مجزي للشخص، على الأقل على المدى القصير، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالكوكائين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز الانسحاب بالكوكائين أو سحب الكوكائين. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال الكوكائين، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو سحبه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكوكائين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين

6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكوكائين 6C45.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكوكائين

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر
6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد

6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C45.3	الانسمام بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

اضطرابات بسبب استعمال الكوكائين، غير محددة 6C45.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الكوكائين، غير محددة
لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C45.0	نوبة من الاستعمال الضار للكوكائين
6C45.1	نمط ضار من استعمال الكوكائين
6C45.10	نمط ضار من استعمال الكوكائين، نوبي
6C45.11	نمط ضار من استعمال الكوكائين، مستمر

6C45.1Z	نمط ضار من استعمال الكوكائين، غير محدد
6C45.2	الاعتماد على الكوكائين
6C45.20	الاعتماد على الكوكائين، الاستعمال الحالي
6C45.21	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مبكرة
6C45.22	الاعتماد على الكوكائين، هدأة جزئية مستدامة
6C45.23	الاعتماد على الكوكائين، هدأة كاملة مستدامة
6C45.2Z	الاعتماد على الكوكائين، غير محدد
متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C45.3	الانسحاب بالكوكائين
6C45.4	سحب الكوكائين

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون بنمط استعمال المنشطات وعواقبها. بالإضافة إلى الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، فإن للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون لدى بعض الأشخاص وسحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنها. المنشطات متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون ونمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون في تعريف الاستعمال الضار للمنشطات. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها المنشطات .

الاستثناءات:

- الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكاينون الصنعي (6C46)
- الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين (6C48)
- الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكاين (6C45)
- الاستعمال الخطر للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون (QE11.4)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين
والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون .

الاستثناءات:

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين
والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون .

الاستثناءات:

- الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، نوبي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

الوصف:

نمط من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:

- (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، مستمر

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

هذان مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد 6C46.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس 6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع أوهام 6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع

أعراض مختلطة 6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون،

غير محدد 6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

والميتكاثينون 6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين

والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.4

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الوصف:

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون هو اضطراب في تنظيم استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، أو الاستخدام المتكرر للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذان مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الوصف:

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون حالياً مع استعمال للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

والميتكاثينون 6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع

6C46.60

هلاوس

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون مع

6C46.61

أوهام

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة 6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد 6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.4

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.1
نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون مع أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد 6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين
والميتكاثينون 6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.4

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.6 والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع

6C46.60

هلاوس

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع

6C46.61

أوهام

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة 6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد 6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين
والميتكاثينون 6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.4

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هداة مستدامة كاملة
6C46.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هداة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع

أعراض مختلطة 6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون،

غير محدد 6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.70

اضطراب قلق مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

والميتكاثينون 6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين

والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.72

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون

6C46.4

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد 6C46.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذان مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.6

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
هلاوس
6C46.60

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أوهام
6C46.61

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع
أعراض مختلطة
6C46.62

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون،
غير محدد
6C46.6Z

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

اضطراب مزاج مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.70

اضطراب قلق مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون
6C46.4

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

الوصف:

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون لكن دون الكافيين والكوكائين والكاثينون الصناعي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري القلق، الغضب، ضعف الانتباه، اليقظة المفرطة، الاستثارة النفسية الحركية، التفكير الاضطهادي (في بعض الأحيان يصل شدة الوهم)، الهلوس السمعية، الارتباك، والتغيرات في التواصل

الاجتماعي. قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة وغيثان أو قيء وخفقان. قد تشمل العلامات الجسدية تسرع دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتوسع الحدقة وخلل في الحركة أو في التوتر العضلي. في حالات نادرة، عادة في حالات التسمم الحاد، يمكن أن يؤدي استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون إلى اختلاجات.

الاستثناءات:

- التسمم بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون (NE60)
- الانسمام بالكافيين (6C48.2)
- الانسمام بالكوكائين (6C45.3)
- الانسمام بالكاثينون الصناعي (6C47.3)
- اضطراب غَيْبَةِ الحِيازة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي 6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر 6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد 6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

الوصف:

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون أو استخدموا المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أن يحدث سحب المنشطات أيضاً عند استخدام المنشطات بالجرعات العلاجية القياسية. قد تشمل مظاهر سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، تعكر المزاج، والتهيج، والتعب، والكسل، والكوابيس الحية، والأرق أو فرط النوم وهو الأشيع، وزيادة الشهية، والقلق، والاستثارة الحركية أو البطء، والتوق للمنشطات.

الاستثناءات:

- سحب الكافيين (6C48.3)
- سحب الكوكاين (6C45.4)
- سحب الكاينون الصناعي (6C47.4)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

الهذيان المُحدث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

الاستثناءات:

- اضطرابات ناتجة عن استعمال الكافيين (6C48)
- الهذيان المُحدث بالكوكائين (6C45.5)
- الهذيان المُحدث بالكاثينون الصناعي (6C47.5)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين (6C45.6)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون (6C47.6)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس 6C46.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

• اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع هلاوس (6C45.60)

• اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون مع هلاوس (6C47.60)

اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع هلاوس

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكاين مع أوهام (6C45.61)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاينون مع هلاوس (6C47.61)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض
مختلطة 6C46.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

استثناءات:

- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة (6C45.62)
- اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة (6C47.62)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون مع أعراض مختلطة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

6C46.4

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب مزاج مُحدَّث بالكوكائين (6C45.70)
- اضطراب مزاج مُحدَّث بالكاثينون الصناعي (6C47.70)

• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

اضطراب قلق مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب قلق مُحدَث بالكوكائين (6C45.71)
- اضطراب قلق مُحدَث بالكاثينون الصناعي (6C47.71)
- اضطراب قلق مُحدَث بالكافيين (6C48.40)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي

6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر

6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاينون 6C46.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاينون إما بأفكار أو انشغالات اقتراميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسحاب بالمنشطات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المنشطات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المنشطات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات).

استثناءات:

- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بالكوكائين (6C45.72)
- متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحدثة بالكائينون الصناعي (6C47.72)
- اضطرابات بسبب استعمال الكافيين (6C48)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاينون

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة الدافع أو الحافِز أو الباعِث لأداء عمل مجزي للشخص، على المدى القصير على الأقل، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون أو سحبه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين
والميتكاثينون 6C46.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين
والميتامفيتامين والميتكاثينون
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، مستمر
6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.1Z

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون 6C46.2

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي
6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة
6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة
6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير محدد
6C46.2Z

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.3

سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.4

اضطرابات بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، غير
محددة 6C46.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين
والميتكاثينون، غير محددة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.0

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون 6C46.1

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، نوبي
6C46.10

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأفيتامين والميتكاثينون، مستمر

6C46.11

نمط ضار من استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.1Z

6C46.2 الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، الاستعمال الحالي

6C46.20

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مبكرة

6C46.21

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة جزئية مستدامة

6C46.22

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، هدأة كاملة مستدامة

6C46.23

الاعتماد على المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون، غير محدد

6C46.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C46.3 الانسحاب بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4 سحب المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصناعي 6C47

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصناعي بنمط استعمال الكاثينون الصناعي وعواقبه. بالإضافة إلى الانسمام بالكاثينون الصناعي، فإن للكاثينون الصناعي خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي لدى بعض الأشخاص وسحب الكاثينون الصناعي عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. الكاثينون الصناعي متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي ونمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسمام بالكاثينون الصناعي في تعريف الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها الكاثينون الصناعي .

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الكاثينون الصناعي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكاثينون الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكاثينون الصناعي.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.1
- الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بالكاثينون الصناعي 6C46.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z

6C47.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي
6C47.70	اضطراب مزاج مُحدّث بالكاثينون الصناعي
6C47.71	اضطراب قلق مُحدّث بالكاثينون الصناعي
6C47.73	اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكاثينون الصناعي
6C47.72	اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالكاثينون الصناعي
	متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):
6C47.3	الانسمام بالكاثينون الصناعي

نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال الكاثينون الصناعي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكاثينون الصناعي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الكاثينون الصناعي نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكاثينون الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكاثينون الصناعي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصناعي
لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C46.5 هذيان مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.60 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس
- 6C47.61 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام
- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، نوبي 6C47.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكاثينون الصناعي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكاثينون الصناعي النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكاثينون الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكاثينون الصناعي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصناعي، نوبي

لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C46.5 | هذيان مُحدَّث بالكاثينون الصناعي |
| 6C47.6 | اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي |
| 6C47.60 | اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس |
| 6C47.61 | اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام |
| 6C47.62 | اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة |
| 6C47.6Z | اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد |

- اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاثينون الصناعي 6C47.7
- اضطراب مزاج مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.70
- اضطراب قلق مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.71
- اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.73
- اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، مستمر 6C47.11

الوصف:

نمط من استعمال الكاثينون الصناعي المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال الكاثينون الصناعي خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالكاثينون الصناعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال الكاثينون الصناعي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصناعي، مستمر لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C46.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكاثينون الصناعي 6C47.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.70
- اضطراب قلق مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71
- اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.73
- اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصناعي، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C46.5 هذيان مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.60 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس
- 6C47.61 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام
- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي

الاعتماد على الكاثينون الصناعي 6C47.2

الوصف:

الاعتماد على الكاثينون الصناعي هو اضطراب في تنظيم استعمال الكاثينون الصناعي ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للكاثينون الصناعي. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام الكاثينون الصناعي، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال الكاثينون الصناعي. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكاثينون الصناعي، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكاثينون الصناعي، أو الاستخدام المتكرر للكاثينون الصناعي أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الكاثينون الصناعي مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C46.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي 6C47.6

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61

- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالكاثينون الصناعي

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

6C47.20 الاعتماد على الكاثينون الصناعي، الاستعمال الحالي

الوصف:

الاعتماد على الكاثينون الصناعي حالياً مع استعمال للكاثينون الصناعي خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.1

• نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C46.5 هذيان مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.60 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس
- 6C47.61 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام
- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالكاثينون الصناعي

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي
- 6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة كاملة مبكرة 6C47.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكاثينون الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال الكاثينون الصناعي لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C46.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالكاثينون الصناعي 6C47.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.70
- اضطراب قلق مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71
- اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.73
- اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.72

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3 الانسحاب بالكاثينون الصناعي

6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة جزئية 6C47.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكاثينون الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك الكاثينون الصناعي لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C46.5 هذيان مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي

6C47.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي

6C47.60 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس

6C47.61 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام

- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدَّث بالكاثينون الصناعي

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة كاملة 6C47.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على الكاثينون الصناعي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال الكاثينون الصناعي لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.1
- نوبة من الاستعمال الضار للكاثينون الصناعي 6C47.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C46.5 هذيان مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.60 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس
- 6C47.61 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام
- 6C47.62 اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة
- 6C47.6Z اضطراب ذهاني مُحدّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد
- 6C47.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي
- 6C47.70 اضطراب مزاج مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.71 اضطراب قلق مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.73 اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكاثينون الصناعي
- 6C47.72 اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحدّث بالكاثينون الصناعي

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C47.3 الانسمام بالكاثينون الصناعي
- 6C47.4 سحب الكاثينون الصناعي

الاعتماد على الكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على الكاثينون الصناعي، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C46.5

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z

اضطرابات أخرى مُحَدَّثة بالكاثينون الصناعي 6C47.7

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.70

اضطراب قلق مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71

اضطراب التحكم بالدافع مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.73

اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة مُحَدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.72

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

الوصف:

الانسمام بالكاثينون الصناعي لكن دون الكافيين والكوكائين والكاثينون الصناعي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكاثينون الصناعي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للكاثينون الصناعي وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الكاثينون الصناعي المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الكاثينون الصناعي من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري القلق، الغضب، ضعف الانتباه، اليقظة المفرطة، الاستثارة النفسية الحركية، التفكير الاضطهادي، الهلوس السمعية، الارتباك، والتغيرات في التواصل الاجتماعي. قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة وغثيان أو قيء وخفقان. قد تشمل العلامات الجسدية تسرع دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتوسع الحدقة وارتفاع الحرارة. في حالات نادرة، عادة في حالات التسمم الحاد، يمكن أن يؤدي استعمال الكاثينون الصناعي إلى اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

الوصف:

سحب الكاثينون الصناعي هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكاثينون الصناعي لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على الكاثينون الصناعي أو استخدموا الكاثينون الصناعي لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل تظاهرات سحب الكاثينون الصناعي، تعكر المزاج، والتعب، والكسل، والكوابيس الحية، والأرق أو فرط النوم، وزيادة الشهية، والقلق، والتوق للكاثينون الصناعي.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الهذيان المُحدث بالكاثينون الصناعي 6C47.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالكاثينون الصناعي بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام الكاثينون الصناعي. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس 6C47.60

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس بوجود هلاوس والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع هلاوس لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسمام بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أوهام 6C47.61

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أوهام بوجود الأوهام والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا توجد هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي مع أوهام

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C47.3

الانسحاب بالكاثينون الصناعي

6C47.4

سحب الكاثينون الصناعي

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة 6C47.62

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة، بشكلٍ أساسي الأوهام والهلاوس، والتي يُعتبر أنها نتيجة مباشرة لاستعمال الكاثينون الصناعي. لا تحدث الأعراض حصرياً أثناء حالات ما قبل النوم أو عند الاستيقاظ، ولا تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)، وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل المثال، الصرع مع أعراض بصرية).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالكاثينون الصناعي مع أعراض مختلطة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالكاثينون الصناعي، غير محدد 6C47.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالكاثينون الصناعي، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي 6C47.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب مزاج مُحدّث بالكاثينون الصناعي 6C47.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدّث بالكاثينون الصناعي بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي

موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب قلق مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بالكاثينون الصناعي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالكاثينون الصناعي
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

متلازمة الوسواس القهري أو متلازمة ذات الصلة مُحدثة بالكاثينون الصناعي 6C47.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بالكاثينون الصناعي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة

(على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بالكاثينون الصناعي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بالكاثينون الصناعي 6C47.73

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بالكاثينون الصناعي بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة الدافع أو الحافز أو الباعث لأداء عمل مجزي للشخص، على المدى القصير على الأقل، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكاثينون الصناعي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز الانسمام بالكاثينون الصناعي أو سحب الكاثينون الصناعي. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصناعي قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال الكاثينون الصناعي، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصناعي أو سحبه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة

باستعمال الكاثينون الصناعي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بالكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصناعي 6C47.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصناعي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصناعي، غير محددة 6C47.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصناعي، غير محددة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكاثينون الصناعي 6C47.3

سحب الكاثينون الصناعي 6C47.4

الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين 6C48

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين بنمط استعمال الكافيين وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالكافيين، فإن سحب الكافيين قد يحصل عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه لدى بعض الأشخاص الذين استعملوا الكافيين لفترات طويلة أو بكميات كبيرة. الكافيين متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للكافيين ونمط ضار من استعمال الكافيين. تم تمييز القلق المُحدث بالكافيين واضطراب النوم - اليقظة المُحدث بالكافيين.

الاستثناءات:

- الاضطرابات الناتجة عن استعمال المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميثكاثينون الاعتماد على الكافيين 6C46
- الاستعمال الخطر للكافيين QE11.5

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C48.0	نوبة من الاستعمال الضار للكافيين
6C48.1	نمط ضار من استعمال الكافيين
6C48.10	نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي
6C48.11	نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر
6C48.1Z	نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2

الانسمام بالكافيين

6C48.3

سحب الكافيين

نوبة من الاستعمال الضار للكافيين 6C48.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال الكافيين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكافيين.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال الكافيين 6C48.1

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2

الانسمام بالكافيين

نمط ضار من استعمال الكافيين 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال الكافيين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أن السلوك المُحدث بالكافيين يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين بشكل ملحوظ. يتضح نمط استعمال الكافيين خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال الكافيين نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً (يومياً أو كل يوم تقريباً). قد يحدث الضرر بالتأثيرات الانسمامية للكافيين، التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو بسبب طريق ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- نوبة من الاستعمال الضار للكافيين 6C48.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكافيين

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكافيين 6C48.2

سحب الكافيين 6C48.3

نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي 6C48.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكافيين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يتضح نمط استعمال الكافيين النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- نوبة من الاستعمال الضار للكافيين 6C48.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكافيين، نوبي

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالكافيين 6C48.2

سحب الكافيين 6C48.3

نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر 6C48.11

الوصف:

نمط من استعمال الكافيين المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يتضح نمط استعمال الكافيين خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق

ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- نوبة من الاستعمال الضار للكافيين 6C48.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكافيين، مستمر

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالكافيين 6C48.2

سحب الكافيين 6C48.3

نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد 6C48.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالكافيين 6C48.2

سحب الكافيين 6C48.3

الانسمام بالكافيين 6C48.2

الوصف:

الانسمام بالكافيين لكن دون الكافيين والكوكائين والكافيين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكافيين والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للكافيين وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية الكافيين المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول الكافيين من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري الأرق، القلق، الاستثارة، الأرق، احمرار الوجه، إدرار البول، اضطرابات الجهاز الهضمي، آلام العضلات، الهياج النفسي الحركي، التعرق أو القشعريرة، والغثيان أو القيء، وقد تحدث نوبات الهلع. تميل الاضطرابات النموذجية للانسمام للحدوث بجرعات عالية نسبياً (على سبيل المثال، < 1 جرام في اليوم). يمكن أن تؤدي الجرعات العالية جداً من الكافيين (على سبيل المثال < 5 جم) إلى ضائقة تنفسية أو اختلاجات يمكن أن تكون مميتة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالكافيين

لديه حالة مسببة (رمزياً):

6C48.0 نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

الشدّة (استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

شديد XS25

سحب الكافيين 6C48.4

الوصف:

سحب الكافيين هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكافيين (عادة على شكل قهوة أو مشروبات تحتوي على كافيين أو كمكون في بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية) لدى الأفراد الذين استعملوا الكافيين لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل تظاهرات سحب الكافيين، صداع، إرهاق أو نعاس، قلق، مزاج معكر، غثيان أو قيء، وصعوبة في التركيز.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب الكافيين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

اضطرابات أخرى مُحدثة بالكافيين 6C48.4

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بالكافيين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C48.0 نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2 الانسحاب بالكافيين

6C48.3 سحب الكافيين

اضطراب قلق مُحَدَّث بالكافيين 6C48.40

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالكافيين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالكافيين أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالكافيين أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكافيين قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكافيين، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكافيين أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكافيين).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحَدَّث بالكافيين

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C48.0 نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2 الانسمام بالكافيين

6C48.3 سحب الكافيين

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين 6C48.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C48.0 نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2 الانسحاب بالكافيين

6C48.3 سحب الكافيين

اضطرابات بسبب استعمال الكافيين، غير محددة 6C48.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال الكافيين، غير محددة لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C48.0 نوبة من الاستعمال الضار للكافيين

6C48.1 نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.10 نمط ضار من استعمال الكافيين، نوبي

6C48.11 نمط ضار من استعمال الكافيين، مستمر

6C48.1Z نمط ضار من استعمال الكافيين، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C48.2 الانسحاب بالكافيين

6C48.3 سحب الكافيين

الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهلوسات 6C49

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهلوسات بنمط استعمال المهلوسات وعواقبه. بالإضافة إلى الانسمام بالمهلوسات، فإن للمهلوسات خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على المهلوسات لدى بعض الأشخاص وسحب المهلوسات عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. المهلوسات متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للمهلوسات ونمط ضار من استعمال المهلوسات. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسمام بالمهلوسات في تعريف الاستعمال الضار للمهلوسات. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها المهلوسات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال المهلوسات

لديه حالة مسببة (رمزياً):

6C49.0	نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات
6C49.1	نمط ضار من استعمال المهلوسات
6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z

الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3

الانسمام بالمهلوسات

نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال المهلوسات تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال المهلوسات.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

- الاعتماد على المهلوسات 6C49.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C46.4	هذيان مُحدَّث بالمهلوسات
6C49.5	اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهلوسات
6C49.6	اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات
6C49.60	اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهلوسات
6C49.61	اضطراب قلق مُحدَّث بالمهلوسات
متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):	
6C49.3	الانسمام بالمهلوسات

نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال المهلوسات تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهلوسات خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المهلوسات نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهلوسات.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهلوسات 6C49.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهلوسات

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحَدَّث بالمهلوسات 6C49.61

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمهلوسات 6C49.3

نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي 6C49.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال المهلوسات تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهلوسات النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهلوسات.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهلوسات 6C49.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهلوسات، نوبي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدَث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدَث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمهلوسات 6C49.3

نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر 6C49.11

الوصف:

نمط من استعمال المهلوسات المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المهلوسات خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:

(1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛

أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب من المهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المهلوسات.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المهلوسات 6C49.2

- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهلوسات، مستمر لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدَث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدَث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب من المهلوسات 6C49.3

نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد 6C49.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدّث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدّث بالمهلوسات 6C49.61

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالمهلوسات 6C49.3

الاعتماد على المهلوسات 6C49.2

الوصف:

الاعتماد على المهلوسات هو اضطراب في تنظيم استعمال المهلوسات ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للمهلوسات. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المهلوسات، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس

شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المهلوسات. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال المهلوسات مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات

لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

- هذيان مُحدَّث بالمهلوسات 6C46.4
- اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.5
- اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات 6C49.6
- اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.60
- اضطراب قلق مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسحاب بالمهلوسات 6C49.3

الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي 6C49.20

الوصف:

الاعتماد على المهلوسات حالياً مع استعمال للمهلوسات خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدّث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدّث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمهلوسات 6C49.3

الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهلوسات، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال المهلوسات لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدَث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدَث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمهلوسات 6C49.3

الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة جزئية 6C49.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهلوسات، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك المهلوسات لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

- نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C46.4 هذيان مُحدَث بالمهلوسات

6C49.5 اضطراب ذهاني مُحدَث بالمهلوسات

6C49.6 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمهلوسات

6C49.60 اضطراب مزاج مُحدَث بالمهلوسات

6C49.61 اضطراب قلق مُحدَث بالمهلوسات

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسحاب بالمهلوسات

الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة كاملة 6C49.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المهلوسات، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال المهلوسات لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

نمط ضار من استعمال المهلوسات 6C49.1

نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدّث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدّث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمهلوسات 6C49.3

الاعتماد على المهلوسات، غير محدد 6C49.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بالمهلوسات 6C46.4

اضطراب ذهاني مُحدّث بالمهلوسات 6C49.5

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.6

اضطراب مزاج مُحدّث بالمهلوسات 6C49.60

اضطراب قلق مُحدّث بالمهلوسات 6C49.61

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمهلوسات 6C49.3

الانسمام بالمهلوسات 6C49.3

الوصف:

الانسمام بالمهلوسات هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال المهلوسات والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للمهلوسات وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المهلوسات المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول المهلوسات من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري الهلاوس والإخالات والتغيرات الإدراكية (مثل تبدد الشخصية، وتبدد الواقع، والحس المتزامن (مزج الحواس، مثل المنبه البصري الذي يثير الرائحة)، والقلق أو الاكتئاب، والأفكار المرجعية، والأفكار الاضطهادية، وضعف المحاكمة، والخفقان، والتعرق، وتغيم الرؤية، الرعاش وعدم التنسيق. قد تشمل العلامات الجسدية تسرع القلب وارتفاع ضغط الدم وتوسع الحدقة، وفي حالات نادرة، قد يؤدي التسمم بالمهلوسات إلى اشتداد السلوك الانتحاري.

الاستثناءات:

- التسمم بالمهلوسات (NE60)
- اضطراب غَيْبَةِ الحَيَاة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

6C49.0	نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات
6C49.1	نمط ضار من استعمال المهلوسات
6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

6C49.2 الاعتماد على المهلوسات

6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

6C49.21 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة

6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

الشددة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الهذيان المُحدث بالمهلوسات 6C49.4

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالمهلوسات بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام المهلوسات. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام المهلوسات قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رمزياً أيضاً):

6C49.0	نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات
6C49.1	نمط ضار من استعمال المهلوسات
6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
6C49.2Z	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3

الانسمام بالمهلوسات

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.5

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهلوسات بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

استثناءات:

• اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة أخرى ذات أثر نفسي (6C4E.6)

• اضطراب ذهاني مُحدَّث بالكحول (6C40.6)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C49.0

نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1	نمط ضار من استعمال المهلوسات
6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
6C49.2Z	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسحاب بالمهلوسات

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات 6C49.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات

6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
6C49.23	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
6C49.2Z	الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسمام بالمهلوسات

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمهلوسات 6C49.60

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمهلوسات بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو

عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات

6C49.10 نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي

6C49.11 نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر

6C49.1Z نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

6C49.2 الاعتماد على المهلوسات

6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

6C49.21 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة

6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسحاب بالمهلوسات

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بالمهلوسات بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجني)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالمهلوسات أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المهلوسات قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المهلوسات، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المهلوسات أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المهلوسات).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالمهلوسات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C49.0	نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات
6C49.1	نمط ضار من استعمال المهلوسات
6C49.10	نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
6C49.1Z	نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
6C49.2	الاعتماد على المهلوسات
6C49.20	الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة

6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسحاب بالمهلوسات

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهلوسات 6C49.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المهلوسات

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات

6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات

6C49.10 نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي

6C49.11 نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر

6C49.1Z نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد

6C49.2 الاعتماد على المهلوسات

6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي

6C49.21 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

- 6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة
- 6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة
- 6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسمام بالمهلوسات

اضطرابات بسبب استعمال المهلوسات، غير محددة 6C49.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال المهلوسات، غير محددة
لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C49.0 نوبة من الاستعمال الضار للمهلوسات
- 6C49.1 نمط ضار من استعمال المهلوسات
- 6C49.10 نمط ضار من استعمال المهلوسات، نوبي
- 6C49.11 نمط ضار من استعمال المهلوسات، مستمر
- 6C49.1Z نمط ضار من استعمال المهلوسات، غير محدد
- 6C49.2 الاعتماد على المهلوسات
- 6C49.20 الاعتماد على المهلوسات، الاستعمال الحالي
- 6C49.21 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مبكرة

6C49.22 الاعتماد على المهلوسات، هدأة جزئية مستدامة

6C49.23 الاعتماد على المهلوسات، هدأة كاملة مستدامة

6C49.2Z الاعتماد على المهلوسات، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C49.3 الانسحاب بالمهلوسات

الاضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين 6C4A

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين بنمط استعمال النيكوتين وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالنيكوتين، فإن للنيكوتين خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على النيكوتين لدى بعض الأشخاص وسحب النيكوتين عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. النيكوتين متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للنيكوتين ونمط ضار من استعمال النيكوتين. تم تمييز اضطراب النوم – اليقظة المُحدث بالنيكوتين.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4A.0	نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين
6C4A.1	نمط ضار من استعمال النيكوتين
6C4A.10	نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي
6C4A.11	نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر
6C4A.1Z	نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد
6C4A.2	الاعتماد على النيكوتين
6C4A.20	الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي
6C4A.21	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة
6C4A.22	الاعتماد على النيكوتين، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مستدامة

6C4A.2Z الاعتماد على النيكوتين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4A.3 الانسمام بالنيكوتين

6C4A.4 سحب النيكوتين

نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال النيكوتين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال النيكوتين.

الاستثناءات:

6C4A.1 نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.2 الاعتماد على النيكوتين

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4A.3 الانسمام بالنيكوتين

نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال النيكوتين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يتضح نمط استعمال النيكوتين خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال النيكوتين نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- الاعتماد على النيكوتين 6C4A.2
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالنيكوتين 6C4A.3

نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي 6C4A.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال النيكوتين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يتضح نمط استعمال النيكوتين النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- الاعتماد على النيكوتين 6C4A.2
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين، نوبي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالنيكوتين 6C4A.3

نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر 6C4A.11

الوصف:

نمط من استعمال النيكوتين المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص. يتضح نمط استعمال النيكوتين خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (2) طريق ضار للاستعمال.

الاستثناءات:

- الاعتماد على النيكوتين 6C4A.2
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين، مستمر

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد 6C4A.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4A.3

الانسمام بالنيكوتين

الاعتماد على النيكوتين 6C4A.2

الوصف:

الاعتماد على النيكوتين هو اضطراب في تنظيم استعمال النيكوتين ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للنيكوتين. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام النيكوتين، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال النيكوتين. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات النيكوتين، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال النيكوتين، أو الاستخدام المتكرر للنيكوتين أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي 6C4A.20

الوصف:

الاعتماد على النيكوتين حالياً مع استعمال للنيكوتين خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة 6C4A.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على النيكوتين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال النيكوتين لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الاعتماد على النيكوتين، هداة مستدامة جزئية 6C4A.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على النيكوتين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك النيكوتين لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين، هداة مستدامة جزئية

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الاعتماد على النيكوتين، هدأة مستدامة كاملة 6C4A.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على النيكوتين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال النيكوتين لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
- نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين، هدأة مستدامة كاملة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الاعتماد على النيكوتين، غير محدد 6C4A.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على النيكوتين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالنيكوتين 6C4A.3

سحب النيكوتين 6C4A.4

الانسمام بالنيكوتين 6C4A.3

الوصف:

الانسمام بالنيكوتين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال النيكوتين والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للنيكوتين وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية النيكوتين المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتخفي حين يزول النيكوتين من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري تملل، هياج حركي نفسي، قلق، تعرق بارد، صداع، أرق، خفقان، تنمل، غثيان أو قيء، آلام البطن، ارتباك، أحلام غريبة، إحساس حرق في الفم، وإفراز اللعاب. في حالات نادرة، قد يحدث تفكير اضطهادي أو اضطرابات في الإدراك أو اختلاجات أو غيبوبة. يحدث تسمم النيكوتين بشكل أكثر شيوعاً عند المستخدم حديث العهد (غير المتحمل) أو بين أولئك الذين يتناولون جرعات أعلى من الجرعات المعتادة.

المُشمَلات:

- رحلات سيئة (النيكوتين)

الاستثناءات:

- الانسمام المقصود به التسمم (NE60)

- اضطراب غَيْبَةِ الحياة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالنيكوتين

لديه حالة مسببة (رَمَزاً أيضاً):

6C4A.0	نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين
6C4A.1	نمط ضار من استعمال النيكوتين
6C4A.10	نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي
6C4A.11	نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر
6C4A.1Z	نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد
6C4A.2	الاعتماد على النيكوتين
6C4A.20	الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي
6C4A.21	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة
6C4A.22	الاعتماد على النيكوتين، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مستدامة
6C4A.2Z	الاعتماد على النيكوتين، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب النيكوتين 6C4A.4

الوصف:

سحب النيكوتين هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال النيكوتين (تستخدم عادة كأحد مكونات التبغ) لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على النيكوتين أو استخدموا النيكوتين لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب النيكوتين المزاج المعكر أو المكتئب، والأرق، والتهيج، والإحباط، والغضب، والقلق، وصعوبة التركيز، والأرق، وبطء القلب، وزيادة الشهية، وزيادة الوزن والتوق للتبغ (أو غيره من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين). قد تشمل الأعراض الجسدية الأخرى زيادة السعال وتقرحات الفم.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب النيكوتين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4A.2

الاعتماد على النيكوتين

6C4A.20

الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي

6C4A.21

الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة

6C4A.22

الاعتماد على النيكوتين، هدأة جزئية مستدامة

6C41.23

الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مستدامة

6C4A.2Z

الاعتماد على النيكوتين، غير محدد

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين 6C4A.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4A.0 نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين

6C4A.1 نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.10 نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي

6C4A.11 نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر

6C4A.1Z نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد

6C4A.2 الاعتماد على النيكوتين

6C4A.20 الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي

6C4A.21 الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة

6C4A.22 الاعتماد على النيكوتين، هدأة جزئية مستدامة

6C41.23 الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مستدامة

6C4A.2Z الاعتماد على النيكوتين، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4A.3 الانسحاب بالنيكوتين

6C4A.4 سحب النيكوتين

اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين، غير محددة 6C4A.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين، غير محددة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4A.0	نوبة من الاستعمال الضار للنيكوتين
6C4A.1	نمط ضار من استعمال النيكوتين
6C4A.10	نمط ضار من استعمال النيكوتين، نوبي
6C4A.11	نمط ضار من استعمال النيكوتين، مستمر
6C4A.1Z	نمط ضار من استعمال النيكوتين، غير محدد
6C4A.2	الاعتماد على النيكوتين
6C4A.20	الاعتماد على النيكوتين، الاستعمال الحالي
6C4A.21	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مبكرة
6C4A.22	الاعتماد على النيكوتين، هدأة جزئية مستدامة
6C41.23	الاعتماد على النيكوتين، هدأة كاملة مستدامة
6C4A.2Z	الاعتماد على النيكوتين، غير محدد
	(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
6C4A.3	الانسحاب بالنيكوتين
6C4A.4	سحب النيكوتين

الاضطرابات الناتجة عن استعمال المستنشقات الطائرة 6C4B

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال المستنشقات الطائرة بنمط استعمال المستنشقات الطائرة وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بالمستنشقات الطائرة، فإن للمستنشقات الطائرة خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على المستنشقات الطائرة لدى بعض الأشخاص وسحب المستنشقات الطائرة عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. المستنشقات الطائرة متورط في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطائرة ونمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالمستنشقات الطائرة في تعريف الاستعمال الضار للمستنشقات الطائرة. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها المستنشقات الطائرة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال المستنشقات الطائرة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطائرة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطائرة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطائرة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطيارة
6C4B.4	سحب المستنشقات الطيارة

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال المستنشقات الطيارة تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال المستنشقات الطيارة.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1
- الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة
لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحدَّثة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسمام بالمستنشقات الطيارة

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال المستنشقات الطيارة تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المستنشقات الطيارة خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المستنشقات الطيارة نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المستنشقات الطيارة.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المستنشقات الطيارة لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

- هذيان مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.5
- اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.6
- اضطرابات أخرى مُحدثة بالمستنشقات الطيارة 6C4B.7
- اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.70
- قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.71

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسمام بالمستنشقات الطيارة 6C4B.3

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال المستنشقات الطيارة تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المستنشقات الطيارة النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء

وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمستنشقات الطائرة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المستنشقات الطائرة.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المستنشقات الطائرة 6C4B.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطائرة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المستنشقات الطائرة، نوبي لديه تظاهرات (رّمزياً):

- هذيان مُحدّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمستنشقات الطائرة 6C4B.7
- اضطراب مزاج مُحدّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.70
- قلق مُحدّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.71

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- الانسمام بالمستنشقات الطائرة 6C4B.3

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C4B.11

الوصف:

نمط من استعمال المستنشقات الطيارة المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال المستنشقات الطيارة خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالمستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال المستنشقات الطيارة.

الاستثناءات:

- الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2
- نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|---|
| 6C4B.5 | هذيان مُحدّث بالمستنشقات الطيارة |
| 6C4B.6 | اضطراب ذهاني مُحدّث بالمستنشقات الطيارة |
| 6C4B.7 | اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمستنشقات الطيارة |
| 6C4B.70 | اضطراب مزاج مُحدّث بالمستنشقات الطيارة |
| 6C4B.71 | قلق مُحدّث بالمستنشقات الطيارة |

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3

الانسمام بالمستنشقات الطيارة

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C4B.5

هذيان مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71

قلق مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3

الانسمام بالمستنشقات الطيارة

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الوصف:

الاعتماد على المستنشقات الطيارة هو اضطراب في تنظيم استعمال المستنشقات الطيارة ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للمستنشقات الطيارة. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المستنشقات الطيارة، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المستنشقات الطيارة. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات المستنشقات الطيارة، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال المستنشقات الطيارة، أو الاستخدام المتكرر للمستنشقات الطيارة أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال المستنشقات الطيارة مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4B.5 هذيان مُحدَث بالمستنشقات الطيارة
- 6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالمستنشقات الطيارة
- 6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمستنشقات الطيارة
- 6C4B.70 اضطراب مزاج مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسمام بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

6C4B.20 الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي

الوصف:

الاعتماد على المستنشقات الطيارة حالياً مع استعمال للمستنشقات الطيارة خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسحاب بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C4B.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المستنشقات الطيارة، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال المستنشقات الطيارة لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسمام بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة مستدامة جزئية 6C4B.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المستنشقات الطيارة، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك المستنشقات الطيارة لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسحاب بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة مستدامة كاملة 6C4B.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على المستنشقات الطيارة، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال المستنشقات الطيارة لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

• نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحَدَّث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسمام بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

6C4B.2Z الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C4B.5 هذيان مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.6 اضطراب ذهاني مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بالمستنشقات الطيارة

6C4B.70 اضطراب مزاج مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

6C4B.71 قلق مُحدَث بالمستنشقات الطيارة

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4B.3 الانسمام بالمستنشقات الطيارة

6C4B.4 سحب المستنشقات الطيارة

الانسمام بالمستنشقات الطائرة 6C4B.3

الوصف:

الانسمام بالمستنشقات الطائرة هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال المستنشقات الطائرة والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للمستنشقات الطائرة وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المستنشقات الطائرة المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول المستنشقات الطائرة من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري البهجة غير المناسبة، ضعف المحاكمة عدوانية، نعاس، غيبوبة، دوار، رعاش، اختلال التنسيق، كلام مشوش، مشية غير متزنة، خمول ولا مبالاة، بطء حركي نفسي، واضطراب بصري. قد يحدث ضعف العضلات والشفع. قد يؤدي استخدام المستنشقات المتطايرة إلى اللانظمية القلبية وتوقف القلب والوفاة. قد تسبب المستنشقات المحتوية على الرصاص (مثل بعض أشكال البترول / البنزين) حدوث تخطيط وهياج وغيبوبة واختلاجات.

الاستثناءات:

- اضطراب غَيْبَةِ الحياة (B636)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالمستنشقات الطائرة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطائرة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطائرة 6C4B.2

6C4B.20	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد
الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب المستنشقات الطيارة 6C4B.4

الوصف:

سحب المستنشقات الطيارة هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المستنشقات الطيارة لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المستنشقات الطيارة أو استخدموا المستنشقات الطيارة لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب المستنشقات الطيارة الأرق، والقلق، والهياج، وتعكر المزاج، والرعاش، والتعرق، والغثيان، والإخالات العابرة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب المستنشقات الطيارة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4B.2 الاعتماد على المستنشقات الطيارة

6C4B.20	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمستنشقات الطائرة بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمستنشقات الطائرة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تتميز الانسحاب بالمستنشقات الطائرة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطائرة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطائرة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطائرة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطائرة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالمستنشقات الطائرة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

	نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة	6C4B.0
	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة	6C4B.1
6C4B.10	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي	
6C49.11	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر	
6C4B.1Z	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد	
	الاعتماد على المستنشقات الطيارة	6C4B.2
6C4B.20	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي	
6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة	
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة	
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة	
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد	

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطيارة	
6C4B.4	سحب المستنشقات الطيارة	

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمستنشقات الطيارة 6C4B.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالمستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة 6C49.22

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة 6C4B.23

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.2Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمستنشقات الطيارة 6C4B.3

سحب المستنشقات الطيارة 6C4B.4

اضطراب مزاج مُحدَّث بالمستنشقات الطيارة 6C4B.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطيارة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطيارة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطيارة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالمستنشقات الطيارة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطائرة، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطائرة
6C4B.4	سحب المستنشقات الطائرة

اضطراب قلق مُحَدَّث بالمستنشقات الطائرة 6C4B.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحَدَّث بالمستنشقات الطائرة بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وحيزة من الانسمام بالمستنشقات الطائرة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بالمستنشقات الطائرة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المستنشقات الطائرة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المستنشقات الطائرة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المستنشقات الطائرة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المستنشقات الطائرة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالمستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

6C4B.0	نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة
6C4B.1	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة
6C4B.10	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي
6C49.11	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر
6C4B.1Z	نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد
6C4B.2	الاعتماد على المستنشقات الطيارة
6C4B.20	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي
6C49.21	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة
6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4B.3	الانسمام بالمستنشقات الطيارة
6C4B.4	سحب المستنشقات الطيارة

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال المستنشقات الطيارة لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة 6C49.22

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة 6C4B.23

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمستنشقات الطيارة 6C4B.3

سحب المستنشقات الطيارة 6C4B.4

اضطرابات بسبب استعمال المستنشقات الطيارة، غير محددة 6C4B.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال المستنشقات الطيارة، غير محددة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطيارة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة 6C49.22

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة 6C4B.23

الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد 6C4B.2Z

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بالمستنشقات الطيارة 6C4B.3

سحب المستنشقات الطيارة 6C4B.4

الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA بنمط استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA وعواقبها. بالإضافة إلى الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، فإن لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لدى بعض الأشخاص وسحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA ونمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA في تعريف الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA.

الاستثناءات:

- الاستعمال الخطر لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA (QE11.6)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4D.0	نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.1	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.10	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي

- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسحاب؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال

الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDMA.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.1
- الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C41.1

الوصف:

نمط من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA6C4C.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

6C4C.71

قلق مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4C.3

الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي 6C4C.1

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، نوبي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C4C.5	هذيان مُحدّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.6	اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.7	اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.70	اضطراب مزاج مُحدّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.71	قلق مُحدّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4C.3

الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر 6C4C.11

الوصف:

نمط من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، مستمر

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C4C.5

هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد 6C4C.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4C.3

الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.2

الوصف:

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA هو اضطراب في تنظيم استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر لمادة MDMA والمواد ذات الصلة. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام مادة MDMA والمواد ذات الصلة، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات مادة MDMA والمواد ذات الصلة، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة، أو الاستخدام المتكرر لمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي 6C4C.20

الوصف:

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA حالياً مع استعمال لمادة MDMA والمواد ذات الصلة خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، الاستعمال الحالي لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

6C4C.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.7	اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.70	اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.71	قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4C.3	الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
6C4C.4	سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة 6C4C.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة مستدامة جزئية 6C4C.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هدأة مستدامة

جزئية

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هداة مستدامة كاملة 6C4C.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA 6C4C.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، هداة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسحاب بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد 6C4C.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4C.5 هذيان مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

- 6C4C.70 اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.71 قلق مُحدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4C.3 الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.3

الوصف:

الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة لمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين يزول مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري الاهتمام والنشاط الجنسي المتزايد أو غير المناسب، القلق، الأرق، الهياج، والتعرق. في حالات نادرة، وعادةً في حالات التسمم الحاد، يمكن أن يؤدي استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA إلى خلل التوتر العضلي والاختلاجات. الموت المفاجئ هو من المضاعفات النادرة ولكنها معروفة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة وMDA من ضمنها 6C4C.4

الوصف:

سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA أو استخدموا مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. قد تشمل مظاهر سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA التعب والخلل في النوم أو الأرق والمزاج المكتئب والقلق والتهيج والشهوة وصعوبة التركيز واضطراب الشهية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4D.2	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.20	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
6C4D.21	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
6C4D.22	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
6C4D.23	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
6C4D.2Z	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة و MDA من ضمنها 6C4C.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحَدَّث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|--|
| 6C4D.0 | نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.1 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.10 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي |
| 6C4D.11 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر |
| 6C4D.1Z | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد |
| 6C4D.2 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |

6C4D.20	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
6C4D.21	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
6C4D.22	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
6C4D.23	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
6C4D.2Z	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3	الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4C.4	سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة **MDMA** والمواد ذات الصلة و **MDA** من ضمنها **6C4C.7**

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4D.0	نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.1	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.10	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
6C4D.11	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
6C4D.1Z	نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
6C4D.2	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطراب مزاج مُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة و MDA من ضمنها 6C4C.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال

MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطراب قلق مُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة و MDA من ضمنها 6C4C.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بمادة MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال MDMA والمواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال MDMA والمواد ذات الصلة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA والمواد ذات الصلة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال MDMA والمواد ذات الصلة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بمادة MDMA والمواد ذات الصلة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|--|
| 6C4D.0 | نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.1 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.10 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي |
| 6C4D.11 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر |
| 6C4D.1Z | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد |
| 6C4D.2 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين |
| 6C4D.20 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي |

- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة **MDMA** والمواد ذات الصلة و**MDA** من ضمنها **6C4C.Y**

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر

- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

اضطرابات بسبب استعمال مادة **MDMA** والمواد ذات الصلة متضمناً **MDA**، غير محددة
6C4C.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA، غير محددة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4C.4 سحب مادة MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً MDA

الاضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين بنمط استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين وعواقبها. بالإضافة إلى الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، فإن للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين لدى بعض الأشخاص وسحب العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين عند تقليل الاستخدام أو التوقف عنه. العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين ونمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين في تعريف الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي يسببها العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين.

الاستثناءات:

- الاستعمال الخطر للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين (QE11.7)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4D.0	نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.1	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.10	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
6C4D.11	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
6C4D.1Z	نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

6C4D.2	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
6C4D.20	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
6C4D.21	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
6C4D.22	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
6C4D.23	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
6C4D.2Z	الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3	الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
--------	---

نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين C4D.06

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين C4D.16

• الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.60

قلق مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.3

نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.1

الوصف:

نمط من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستخدام مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر

الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين.

الاستثناءات:

- الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.2
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6
- اضطراب مزاج مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60
- قلق مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3

نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، نوبي 6C4D.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين.

الاستثناءات:

- الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.2
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، نوبي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.4
- اضطراب ذهاني مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.5
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.6
- اضطراب مزاج مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.60
- قلق مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، مستمر 6C4D.11

الوصف:

نمط من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين.

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.2

نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين، مستمر لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

6C4D.4

هذيان مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

6C4D.5

اضطراب ذهاني مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

اضطرابات أخرى مُحدثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3

نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد 6C4D.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحدثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.2

الوصف:

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين هو اضطراب في تنظيم استعمال للعقاقير المُفارقة ينشأ عن الاستخدام المتكرر أو المستمر للعقاقير المُفارقة. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام العقاقير المُفارقة، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستخدام، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات العقاقير المُفارقة، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال للعقاقير المُفارقة، أو الاستخدام المتكرر للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C41.1
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4D.4 هذيان مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين
- 6C4D.5 اضطراب ذهاني مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين
- 6C4D.6 اضطرابات أخرى مُحدثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، الاستعمال الحالي 6C4D.20

الوصف:

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين حالياً مع استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

• نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.1

• نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحدثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة كاملة مبكرة 6C4D.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.1
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة جزئية 6C4D.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.1
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحَدَثَة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحَدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4D.3

الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة كاملة 6C4D.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.1
- نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، هدأة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.4

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.5

اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

اضطراب مزاج مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.60

قلق مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.61

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد 6C4D.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محدد

لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

6C4D.4

هذيان مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

6C4D.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

6C4D.6

اضطرابات أخرى مُحدثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

6C4D.60

اضطراب مزاج مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

6C4D.61

قلق مُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.3

الوصف:

الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال للعقاقير المُفارقة والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة للعقاقير المُفارقة وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية العقاقير المُفارقة المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين تزول العقاقير المُفارقة من الجسم. قد تتضمن ميزات المظهر السريري العدوانية، والاندفاعية، والتقلب، والقلق، والاستثارة الحركية، وضعف المحاكمة، وخدر أو ضعف الاستجابة للألم، والكلام المتلعثم، وخلل التوتر العضلي. تشمل العلامات الجسدية رآة (حركات العين المتكررة وغير المنضبطة)، وتسرع القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتنميل، والرنح، وعسر الكلام، وتصلب العضلات. في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي استخدام العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين إلى حدوث اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- | | |
|---------|--|
| 6C4D.0 | نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين |
| 6C4D.1 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين |
| 6C4D.10 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، نوبي |
| 6C4D.11 | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، مستمر |
| 6C4D.1Z | نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، غير محدد |
| 6C4D.2 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين |
| 6C4D.20 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، الاستعمال الحالي |
| 6C4D.21 | الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة كاملة مبكرة |

- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هداة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هداة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين 6C4D.4

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام العقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.12 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطراب ذهاني مُحَدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.5

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تتميز الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على

سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال للعقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال للعقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال للعقاقير المُفارقة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطرابات أخرى مُحدّثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين 6C4D.6

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدّثة بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رّمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين

اضطراب مزاج مُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.60

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض مزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتنائي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال للعقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال للعقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال للعقاقير المُفارقة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.12 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي

- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطراب قلق مُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين 6C4D.61

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدّث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بالعقاقير المُفارقة أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير المُفارقة قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال للعقاقير المُفارقة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال للعقاقير المُفارقة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال للعقاقير المُفارقة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هُدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هُدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هُدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين
6C4D.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيتامين

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيتامين

اضطرابات بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محددة
6C4D.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين، غير محددة لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4D.0 نوبة من الاستعمال الضار للعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.1 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.10 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، نوبي
- 6C4D.11 نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، مستمر
- 6C4D.1Z نمط ضار من استعمال العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، غير محدد
- 6C4D.2 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين
- 6C4D.20 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، الاستعمال الحالي
- 6C4D.21 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4D.22 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة جزئية مستدامة
- 6C4D.23 الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4D.2Z الاعتماد على العقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4D.3 الانسحاب بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP أو الكيثامين

الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6C4E

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية بنمط استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، فإن للمادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على هذه المادة المحددة ذات التأثير النفسي لدى بعض الأشخاص وسحبها عند تقليل الاستعمال أو التوقف عنه. تكون هذه المادة المحددة ذات التأثير النفسي متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار لهذه المادة ونمط ضار من استعمال هذه المادة. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بهذه المادة في تعريف الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي

يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7
- اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70
- قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1

الوصف:

نمط من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستعمال مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4E.5 هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.71 قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي 6C4E.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4E.5 هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.71 قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.72
- 6C4E.73 اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- 6C4E.3 الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر 6C4E.11

الوصف:

نمط من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي من جانب

الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي .
الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7
- اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70
- قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4E.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C4E.5 هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.71 قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.72

6C4E.73 اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.2

الوصف:

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي هو اضطراب في تنظيم استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي ينشأ عن الاستعمال المتكرر أو المستمر لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستعمال، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، أو الاستعمال المتكرر لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70

قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4E.4Z

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي 6C4E.20

الوصف:

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي حالياً مع استعمال لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- هذيان مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5
- اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
- اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7
- اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70
- قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C4E.43

6C4E.4Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة 6C4E.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C4E.5

هذيان مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.6	اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.7	اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.70	اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.71	قلق مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.72	اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.73	اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C4E.3	الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.4	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.40	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
6C4E.41	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
6C4E.42	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
6C4E.43	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4E.4Z	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة جزئية 6C4E.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70
- قلق مُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4E.3	الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.4	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
6C4E.40	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
6C4E.41	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
6C4E.42	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
6C4E.43	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4E.4Z	سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة 6C4E.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4E.5 هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.71 قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.72
- 6C4E.73 اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- (مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
- 6C4E.3 الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C4E.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4E.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7

اضطراب مزاج مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70

قلق مُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية 6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4E.43

6C4E.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.3

الوصف:

الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المادة المحددة أخرى ذات التأثير النفسي المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين تزول المادة المحددة من الجسم.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الشدة (استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.4

الوصف:

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المادة لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المادة أو استخدموا المادة لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أيضاً أن يحدث سحب من المواد ذات التأثير النفسي عند استخدام الأدوية ذات التأثير النفسي الموصوفة ضمن الجرعات العلاجية القياسية. تعتمد الميزات المحددة لحالة السحب على الخصائص الدوائية للمادة المحددة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C40.40

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في الإدراك أو اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية 6C40.41

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باختلاج. تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلاوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. لا يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للبهديان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C40.42

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات. لا تصبح حالة السحب اضطرابات في الإدراك.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات 6C40.43

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلاوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للذهيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C40.4Z

الوصف:

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الهذيان المُحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو السحب أو أثناء استخدام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- (متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب ذهاني مُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط

- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منه. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي قادرة على إحداث الأعراض المزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منه، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب قلق مُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي

- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحافِز أو الباعِث لأداء عمل مجزي للشخص، على الأقل على المدى القصير، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب من المادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز الانسحاب من مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي أو سحبها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المادة المحددة قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال المادة، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال هذه المادة أو سحبها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة).

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محددة 6C4E.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محددة لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4E.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4E.3 الانسحاب بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

6C4E.4 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

- 6C4E.40 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4E.41 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4E.42 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- 6C4E.43 سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C40.4Z سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6C4F

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية بنمط استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، فإن للمواد المحددة ذات التأثير النفسي خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على هذه المواد المحددة ذات التأثير النفسي لدى بعض الأشخاص وسحبها عند تقليل الاستعمال أو التوقف عنه. تكون هذه المواد المحددة ذات التأثير النفسي متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار لهذه المواد ونمط ضار من استعمال هذه المواد. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب بهذه المواد في تعريف الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.0	نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4E.1	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.10	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4F.11	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4E.1Z	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- (متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1

الوصف:

نمط من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المواد المتعددة المحددة ذات التأثير النفسي نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستعمال مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4F.5 هذيان مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.71 قلق مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.73

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي 6C4F.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

اضطراب ذهاني مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

اضطرابات أخرى مُحدَثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.73

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر 6C4F.11

الوصف:

نمط من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي المستمر (يوميّاً أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي

يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسحاب بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي .

الاستثناءات:

- الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر لديه تظاهرات (رمزياً أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70
- قلق مُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بـ مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4F.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.2

الوصف:

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي هو اضطراب في تنظيم استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي ينشأ عن الاستعمال المتكرر أو المستمر لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المواد المتعددة المحددة، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستعمال، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المواد المتعددة المحددة. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات المواد المتعددة المحددة، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال المواد المتعددة المحددة، أو الاستعمال المتكرر لهذه المواد المتعددة المحددة أو المواد المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي مستمر (يومياً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي 6C4F.20

الوصف:

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي حالياً مع استعمال لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة 6C4F.21

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

6C4F.5 هذيان مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.71 قلق مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.73

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة جزئية 6C4F.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة جزئية لديه تظاهرات (رمزاً أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70
- قلق مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة كاملة 6C4F.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة كاملة لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70
- قلق مُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4F.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

اضطراب ذهاني مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

اضطرابات أخرى مُحدّثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

اضطراب مزاج مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

قلق مُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.3

الوصف:

الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. تحدث هذه الاضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية المعروفة لهذه المواد وترتبط شدتها ارتباطاً وثيقاً بكمية المواد المحددة ذات التأثير النفسي المستهلكة. وهي محددة زمنياً وتختفي حين تزول المواد المحددة من الجسم.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C4F.0	نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4E.1	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.10	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4F.11	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4E.1Z	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الشدة (استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.4

الوصف:

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المواد لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المواد أو استخدموا المواد لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أيضاً أن يحدث سحب من المواد ذات التأثير النفسي عند استخدام الأدوية ذات التأثير النفسي الموصوفة ضمن الجرعات العلاجية القياسية. تعتمد الميزات المحددة لحالة السحب على الخصائص الدوائية للمادة المحددة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

<p>سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C40.40</p>
--

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في الإدراك أو اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية 6C40.41

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باختلاج. تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلاوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. لا يوجد دليل على حدوث تخطيط ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للمهذيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C40.42

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات. لا تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات 6C40.43

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للذهيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C40.4Z

الوصف:

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الهذيان المُحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي قادرة على إحداث الهذيان. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب

عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.0	نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4E.1	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.10	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4F.11	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4E.1Z	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب ذهاني مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات الشبيهة بالذهان في الإدراك أو المجالات المعرفية أو السلوكية التي تميز الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض ذهانية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمزياً):

6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى مُحدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب مزاج مُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن الاضطرابات المزاجية التي تميز الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد قادرة على إحداث الأعراض المزاجية. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المواد، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المواد أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب قلق مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز الانسحاب بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض قلق. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة التي تميز الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المواد، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمالها أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو

الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال هذه المواد.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4F.0	نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4E.1	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.10	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4F.11	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4E.1Z	نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4F.2	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
6C4F.20	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4F.21	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4F.22	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4F.2Z	الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.73

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحافِز أو الباعِث لأداء عمل مجزي للشخص، على الأقل على المدى القصير، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منه. تزيد شدة الأعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز الانسمام بهذه المواد أو سحبها. يجب أن تكون كمية ومدة استعمال المواد المحددة قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال المواد، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال هذه المواد أو سحبها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المواد).

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي 6C4F.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية "محددة أخرى"

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محددة 6C4F.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محددة لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

- 6C4F.0 نوبة من الاستعمال الضار لمواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.10 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4F.11 نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4F.2 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4F.20 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4F.21 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مبكرة

- 6C4F.22 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4F.2Z الاعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G

الوصف:

تتميز الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بنمط استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي وعواقبه. بالإضافة إلى الانسحاب من مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، فإن للمواد غير المعروفة أو غير المحددة ذات التأثير النفسي خصائص تحفز الاعتماد، مما يؤدي إلى الاعتماد على هذه المواد غير المعروفة أو غير المحددة ذات التأثير النفسي لدى بعض الأشخاص وسحبها عند تقليل الاستعمال أو التوقف عنه. تكون هذه المواد غير المعروفة أو غير المحددة ذات التأثير النفسي متورطة في مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم، والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الاستعمال الضار لهذه المواد ونمط ضار من استعمال هذه المواد. تم تضمين الأذى الذي يلحق بالآخرين نتيجة السلوك أثناء الانسحاب من هذه المواد في تعريف الاستعمال الضار لمواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية. تم تمييز العديد من الاضطرابات العقلية التي تسببها مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

نوبة من الاستعمال الضار لمواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

الوصف:

نوبة واحدة من استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الاستعمال الضار. لا ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- الاعتماد على مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نوبة من الاستعمال الضار لمواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.73

(متر افق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1

الوصف:

نمط من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً إذا كان استعمال المادة المتعددة المحددة ذات التأثير النفسي نوبياً، أو شهراً واحداً على الأقل إذا كان الاستعمال مستمراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي .

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.72 نفسي
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي 6C4G.10

الوصف:

نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي النوبي خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي .

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.5
- اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6
- اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.7
- اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.70
- قلق مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر 6C4G.11

الوصف:

نمط من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي المستمر (يوميًا أو شبه يومي) تسبب في الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. يتضح نمط استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي خلال فترة شهر واحد على الأقل. يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي: (1) السلوك المرتبط بالانسمام؛ (2) التأثيرات السامة المباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو (3) طريق ضار للاستعمال. يشمل الضرر الذي يلحق بصحة الآخرين أي شكل من أشكال الأذى الجسدي، بما في ذلك الصدمة، أو الاضطراب العقلي الذي يُعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لاستعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي.

الاستثناءات:

- الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.73

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4G.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

لديه تظاهرات (رمز أيضاً):

هذيان مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.5

اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6

اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.7

اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.70

قلق مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.72

اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.73

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2**الوصف:**

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي هو اضطراب في تنظيم استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ينشأ عن الاستعمال المتكرر أو المستمر للمادة. السمة المميزة هي دافع داخلي قوي لاستخدام المادة غير المحددة أو غير المعروفة، والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الاستعمال، وزيادة الأولوية المعطاة للاستخدام على الأنشطة الأخرى واستمرار الاستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية. غالباً ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخصي بالرغبة أو التوق لاستعمال المادة. قد تكون السمات الفيزيولوجية للاعتماد موجودة أيضاً، بما في ذلك التحمل لتأثيرات المادة، وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال المادة، أو الاستعمال المتكرر لهذه المادة غير المحددة أو غير المعروفة أو المادة المماثلة دوائياً لمنع أو تخفيف أعراض السحب. عادة ما تظهر سمات الاعتماد على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي مستمر (يوميّاً أو يومياً تقريباً) لمدة شهر واحد على الأقل.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه تظاهرات (رّمزاً أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C4G.43
- 6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي 6C4G.20

الوصف:

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي حالياً مع استعمال للمادة خلال الشهر السابق.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.72 نفسي
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3	الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.4	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.40	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط
6C4G.41	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
6C4G.42	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
6C4G.43	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4E.4Z	سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.21 الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الفرد عن استعمال المادة لفترة تتراوح بين شهر و12 شهراً.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

هذيان مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.5

- اضطراب ذهاني مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6
- اضطرابات أخرى مُحدَّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.7
- اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.70
- قلق مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.3
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.4
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C4G.40
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية 6C4G.41
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C4G.42
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات 6C4G.43
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4E.4Z

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة جزئية 6C4G.22

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، هناك انخفاض كبير في استهلاك المادة لأكثر من 12 شهراً، بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خلال هذا الفترة، لم يتم استيفاء متطلبات تعريف الاعتماد.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هداة مستدامة جزئية

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- هذيان مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.5
- اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6
- اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.7
- اضطراب مزاج مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.70
- قلق مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.73

(مترافق مع، استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات

6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة 6C4G.23

الوصف:

بعد تشخيص الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، وغالباً بعد نوبة علاج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل المساعدة الذاتية)، امتنع الشخص عن استعمال المادة لمدة 12 شهراً أو أكثر.

الاستثناءات:

- نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.1
- نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.0

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحدّثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.72
- اضطراب التحكم بالدافع المُحدّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.73

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات
- سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
- 6C4G.43
- 6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C4G.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاعتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

- 6C4G.5 هذيان مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.6 اضطراب ذهاني مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.7 اضطرابات أخرى مُحَدَّثَة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.70 اضطراب مزاج مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.71 قلق مُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.72 نفسي
- اضطراب التحكم بالدافع المُحَدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.73

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

- 6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
- 6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط
- 6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية
- 6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4E.4Z

الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.3

الوصف:

الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي والتي تنسم باضطرابات في الوعي أو المعرفة أو الإدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق. يجب وضع هذا التشخيص فقط عندما يكون هناك دليل قوي على استعمال مادة غير محددة ولا يمكن تفسير الأعراض باضطراب أو مرض آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.4

الوصف:

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي هو تجمع واضح سريرياً من الأعراض والسلوكيات و / أو السمات الفيزيولوجية، والتي تتفاوت في درجة الشدة والمدة، وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال المادة لدى الأفراد الذين طوروا الاعتماد على المادة أو استخدموا المادة لفترة طويلة أو بكميات كبيرة. يمكن أيضاً أن يحدث سحب من المادة ذات التأثير النفسي عند استخدام الأدوية ذات التأثير النفسي الموصوفة ضمن الجرعات العلاجية القياسية. تعتمد الميزات المحددة لحالة السحب على الخصائص الدوائية للمادة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.22

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط 6C40.40

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في الإدراك أو اختلاجات.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.2Z

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية 6C40.41

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي ولا تكون حالة السحب مصحوبة باختلاج. تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلاوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. لا يوجد دليل على حدوث تخطيط ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للمهذيان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات 6C40.42

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات. لا تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة

6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.22

الوصف:

استوفيت جميع المتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي وتكون حالة السحب مصحوبة باختلاجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في الإدراك (على سبيل المثال، الهلوس أو الأوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم. ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص الأخرى للهيديان.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.22

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد 6C40.4Z

الوصف:

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.2

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

الهذيان المُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.5

الوصف:

يتسم الهذيان المُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بحالة حادة من الاضطراب في الانتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب أو أثناء استخدام مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي، أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها، أو من خلال حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان المُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.12

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة

6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب ذهاني مُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.6

الوصف:

يتميز الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، الأوهام، والهلاوس، والتفكير غير المنظم، والسلوك المضطرب بشكل كبير)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، الفصام، واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال المادة غير المحددة ذات التأثير النفسي، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة غير المحددة ذات التأثير النفسي أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض ذهانية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة غير المحددة ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب الذهاني المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.12

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.7

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى مُحدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات

6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب مزاج مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.70

الوصف:

يتسم اضطراب المزاج المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بأعراض مزاجية، (على سبيل المثال، الاكتئاب أو المزاج المرتفع، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الممتعة، وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منه. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب اكتئابي، واضطراب ثنائي القطب، اضطراب الفصام الوجداني)، كما قد يكون الحال إذا كانت الأعراض المزاجية قد سبقت بداية استعمال المادة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض مزاجية (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب المزاج المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب قلق مُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.71

الوصف:

يتسم اضطراب القلق المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بأعراض قلق (على سبيل المثال، التوجس والخوف، وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي، السلوك التجنبي)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف، اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال المادة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال المادة أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض قلق (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة المحددة الأخرى ذات التأثير النفسي).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب القلق المُحدَّث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.12

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.72

الوصف:

يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي إما بأفكار أو انشغالات اقتحاميه متكررة، ترتبط عادةً بالقلق وعادةً ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابةً لذلك، أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل المثال، نتف الشعر، كشط الجلد)، والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسجام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منها. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (خصوصاً، اضطراب الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة)، كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الاضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال المادة، أو عند استمرار الأعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمالها أو السحب منها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مصحوباً بأعراض الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال هذه المادة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الوسواس القهري أو الاضطراب ذا الصلة المُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات إدراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب التحكم بالدافع مُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.73

الوصف:

يتسم اضطراب التحكم بالدافع المُحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحافز أو الباعث لأداء عمل مجزي للشخص، على الأقل على المدى القصير، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين (على سبيل المثال، إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح، أو السلوك الجنسي المتكرر، أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي أو السحب منه. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أولي (على سبيل المثال، اضطراب التحكم بالدافع، اضطراب بسبب السلوكيات الإدمانية)، كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال المادة، أو إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال هذه المادة أو سحبها، أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقاً مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل المثال، تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال المادة).

لديه حالة مسببة (رمزياً أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي

6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر

6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

6C4G.12

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي
6C4G.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
 6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
 6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
 6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
 6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
 6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
 6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هداة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسمام بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطرابات بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محددة
6C4G.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير
محددة

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

6C4G.0 نوبة من الاستعمال الضار لمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.1 نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، نوبي
6C4G.10

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.1Z

6C4G.2 الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
6C4G.20

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C40.23

الاعتماد على مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد
6C4G.2Z

(مترافق مع، استعمال رمزاً اضافياً عند الرغبة):

6C4G.3 الانسحاب بمادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.4 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي

6C4G.40 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير مختلط

6C4G.41 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية

6C4G.42 سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اختلاجات

سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات

6C4G.43

6C4E.4Z سحب مادة غير معروفة، أو غير محددة ذات تأثير نفسي، غير محدد

الاضطرابات الناتجة عن السلوكيات الإدمانية

الوصف:

يمكن التعرف على الاضطرابات الناجمة عن السلوكيات التي تسبب الإدمان والمتلازمات الهامة سريراً المرتبطة بالضائقة أو التداخل في الوظائف الشخصية والتي تتطور نتيجة لسلوكيات المكافأة المتكررة باستثناء استعمال المواد المسببة للاعتماد. تشمل الاضطرابات الناتجة عن السلوكيات الإدمانية اضطراب المقامرة واضطراب اللعب، والذي قد يشمل السلوك عند الاتصال بالإنترنت أو عند عدم الاتصال بالإنترنت.

اضطراب المقامرة 6C50

الوصف:

يتسم اضطراب المقامرة بنمط من سلوك المقامرة المستمر أو المتكرر، والذي قد يكون عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في المقامرة (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛
2. زيادة الأولوية الممنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه المقامرة بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛
3. واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

قد يكون نمط سلوك القمار مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك المقامرة والسّمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.

المُشمّلات:

- المقامرة القهرية

الاستثناءات:

- الاضطراب ثنائي القطب I (6A60)
- الاضطراب ثنائي القطب II (6A61)
- المقامرة الخطرة أو الرهان (QE21)

اضطراب المقامرة، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت 6C50.0

الوصف:

يتسم اضطراب المقامرة بنمط من سلوك المقامرة المستمر أو المتكرر، والذي لا يكون عبر الإنترنت بشكلٍ أساسي، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في المقامرة (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛
 2. زيادة الأولوية الممنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه المقامرة بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛
 3. واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.
- قد يكون نمط سلوك القمار مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك المقامرة والسمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.

الاستثناءات:

- المقامرة الخطرة أو الرهان (QE21)

اضطراب المقامرة، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C50.1

الوصف:

يتسم اضطراب المقامرة بنمط من سلوك المقامرة المستمر أو المتكرر، والذي يكون عبر الإنترنت بشكلٍ أساسي، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في المقامرة (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛
 2. زيادة الأولوية الممنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه المقامرة بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛
 3. واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.
- قد يكون نمط سلوك القمار مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك المقامرة والسمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.
- الاستثناءات:

- المقامرة الخطرة أو الرهان (QE21)

اضطراب المقامرة، غير المحدد 6C50.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب اللعب 6C51

الوصف:

يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب المستمر أو المتكرر، ("ألعاب رقمية" أو "ألعاب فيديو") والذي قد يكون عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في اللعب (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛

2. زيادة الأولوية الممنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛

3. واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

قد يكون نمط سلوك اللعب مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.

الاستثناءات:

- الاضطراب ثنائي القطب I (6A60)

• الاضطراب ثنائي القطب II (6A61)

• اللعب الخطر (QE22)

اضطراب اللعب، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C51.0

الوصف:

يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب المستمر أو المتكرر، ("ألعاب رقمية" أو "ألعاب فيديو") والذي يكون عبر الإنترنت بشكلٍ أساسي، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في اللعب (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛

2. زيادة الأولوية الممنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛

3. واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

قد يكون نمط سلوك اللعب مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.

اضطراب اللعب، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت 6C51.1

الوصف:

يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب المستمر أو المتكرر، ("ألعاب رقمية" أو "ألعاب فيديو") والذي لا يكون عبر الإنترنت بشكلٍ أساسي، ويتجلى ذلك في:

1. ضعف التحكم في اللعب (على سبيل المثال، البداية، التكرار، الشدة، المدة، الإنهاء، السياق)؛
 2. زيادة الأولوية الممنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب بالأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية؛
 3. واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.
- قد يكون نمط سلوك اللعب مستمراً أو نوبياً ومتكرراً. عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات الأخرى ظاهرة على مدى فترة لا تقل عن 12 شهراً من أجل وضع التشخيص، على الرغم من أنه قد يتم تقصير المدة المطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة.

اضطراب اللعب، غير المحدد 6C50.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب ناتج عن السلوكيات الإدمانية محدد آخر 6C5Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ناتج عن السلوكيات الإدمانية، غير محدد 6C5Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات التحكم بالدافع

الوصف:

تتسم اضطرابات التحكم بالدافع بفشل متكرر في مقاومة دافع أو حافز أو باعث لأداء عمل مجزي للشخص، على الأقل على المدى القصير، على الرغم من ضرره على المدى الطويل إما للفرد أو للآخرين، أو الضائقة الملاحظة بشأن نمط السلوك، أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. تتضمن اضطرابات السيطرة على الانفعالات مجموعة من السلوكيات المحددة، بما في ذلك إشعال النار والسرقة والسلوك الجنسي والاندفاعات الانفجارية.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطرابات التحكم بالدافع المُحدثة بمادة
- اضطراب المقامرة 6C50
- اضطراب اللعب 6C51
- متلازمة تحكم بالدافع ثانوية 6E66
- اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25

هوس الحرائق 6C70

الوصف:

يتسم هوس الحرائق بفشل متكرر في التحكم في الدوافع القوية لإشعال الحرائق، مما يؤدي إلى أفعال متعددة، أو محاولات لإشعال النار في الممتلكات أو الأشياء الأخرى، في غياب دافع واضح (على سبيل المثال، المكسب النقدي، الانتقام، التخريب، بيان سياسي لجذب الانتباه أو الاعتراف). هناك شعور متزايد بالتوتر أو الاستثارة العاطفية قبل حالات إشعال النار أو الانبهار المستمر أو الانشغال بالنيران والمثيرات ذات الصلة (على سبيل المثال، مشاهدة الحرائق، حرائق المباني، الانبهار بمعدات مكافحة الحرائق)، والشعور بالمتعة والإثارة والراحة أو الإشباع أثناء عملية إشعال النار أو مشاهدة آثارها أو المشاركة في نتائجها. لا يتم تفسير السلوك بشكل أفضل من خلال الإعاقة الذهنية، أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر، أو الانسمام بمادة.

المُشتملات:

- إشعال النار المُرضي

الاستثناءات:

- اضطراب سوك لا اجتماعي (6C91)
- الاضطراب ثنائي القطب I (6A60)
- الفصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية الأخرى (6A20-6A2Z)
- تم استبعاد إشعال النار كسبب لملاحظة الاضطرابات العقلية أو السلوكية المشتبه بها (QA02.3)

الوصف:

يتسم هوس السرقة بفشل متكرر في التحكم في الدوافع القوية لسرقة الأشياء في غياب دافع واضح (على سبيل المثال، لا يتم الحصول على الأشياء للاستخدام الشخصي أو الكسب المادي). ههناك شعور متزايد بالتوتر أو الاستثارة العاطفية قبل حالات السرقة والشعور بالمتعة أو الإثارة أو الراحة أو الإشباع أثناء السرقة وبعدها مباشرة. لا يتم تفسير السلوك بشكل أفضل من خلال الإعاقة الذهنية، أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر، أو الانسمام بمادة.

المُشمات:

- السرقة المَرَضِيَّة

الاستثناءات:

- تم استبعاد السرقة من المتاجر كسبب للمراقبة للاشتباه في وجود اضطراب عقلي (QA02.3)
- ملاحظة للترميز:
- إذا حدثت السرقة في سياق اضطراب سلوك لا اجتماعي أو نوبة هوس، فلا ينبغي تشخيص هوس السرقة بشكل منفصل.

اضطراب السلوك الجنسي القهري 6C72

الوصف:

يتسم اضطراب السلوك الجنسي القهري بنمط مستمر من الفشل في السيطرة على الدوافع أو الرغبات الجنسية الشديدة والمتكررة التي تؤدي إلى سلوك جنسي متكرر. قد تشمل الأعراض أنشطة جنسية متكررة والتي قد تصبح محوراً رئيسياً في حياة الشخص لدرجة إهمال الصحة والعناية الشخصية أو الاهتمامات والأنشطة والمسؤوليات الأخرى؛ العديد من الجهود غير الناجحة للحد بشكل كبير من السلوك الجنسي المتكرر؛ واستمرار السلوك الجنسي المتكرر على الرغم من العواقب السلبية أو الحصول على رضی قليل أو عدم الرضا عنه. يتجلى نمط الفشل في السيطرة على الدوافع أو الرغبات الجنسية الشديدة وما ينتج عنها من سلوك جنسي متكرر على مدى فترة طويلة من الزمن (على سبيل المثال، 6 أشهر أو أكثر)، ويسبب ضائقة ملحوظة أو ضعفاً كبيراً في المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية والتعليمية، المهنية، أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. الضيق المرتبط تماماً بالأحكام الأخلاقية وعدم الموافقة على الدوافع أو الحوافز أو السلوكيات الجنسية لا يكفي لتلبية هذا المطلب.

الاستثناءات:

- اضطرابات الولع الجنسي (6D30-6D3Z)

الوصف:

يتسم الاضطراب الانفجاري المتقطع بنوبات وجيزة متكررة من الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو تدمير الممتلكات التي تمثل فشلاً في السيطرة على الاندفاعات العدوانية، حيث تكون شدة الاندفاع أو درجة العدوانية غير متناسبة بشكل صارخ مع الاستفزاز أو الضغوط النفسية والاجتماعية المؤهبة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي أو سلوكي أو نمائي عصبي آخر وليست جزءاً من نمط الغضب المزمن والتهيج (على سبيل المثال، في اضطراب المعارض المتحدي). نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

الاستثناءات:

- اضطراب المعارض المتحدي (6C90)
- اضطرابات التحكم بالدافع المُحدّثة بمادة

اضطرابات التحكم بالدافع المُحدّثة بمادة

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكوكائين 6C45.73

يمكن مراجعة الاضطراب في قسم الاضطرابات المُحدّثة بالكوكائين

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون
6C46.73

يمكن مراجعة الاضطراب في قسم الاضطرابات المُحدّثة بالمنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

اضطراب التحكم بالدافع مُحدّث بالكاثينون الصناعي 6C47.73

يمكن مراجعة الاضطراب في قسم الاضطرابات المُحدّثة بالكاثينون الصناعي

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6C4E.73

يمكن مراجعة الاضطراب في قسم الاضطرابات المُحدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي

اضطراب التحكم بالدافع مُحدَث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي 6C4G.73

يمكن مراجعة الاضطراب في قسم الاضطرابات المُحدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي

اضطراب المقامرة 6C50

يمكن مراجعة قسم اضطراب المقامرة

اضطراب المقامرة، الشكل المسيطرون الاتصال بالإنترنت 6C50.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب المقامرة، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C50.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب المقامرة، غير المحدد 6C50.Z

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب اللعب 6C51

يمكن مراجعة قسم اضطراب اللعب

اضطراب اللعب، الشكل المسيطر عبر الإنترنت 6C51.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب اللعب، الشكل المسيطر دون الاتصال بالإنترنت 6C51.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب اللعب، غير المحدد 6C50.Z

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66

الوصف:

متلازمة تتميز بوجود أعراض بارزة من السيطرة على الاندفاعات المضطربة (على سبيل المثال، القمار المفرط، والسرقة، وإشعال النار، والاندفاع العدواني، والسلوك الجنسي القهري) والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. لا تُفسر الأعراض عن طريق الهذيان أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية وسيطة لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، كجزء من اضطراب التكيف استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب الأساسي أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون أعراض التحكم في الاندفاعات شديدة بما يكفي لتبرير اهتمام سريري محدد.

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

هوس نتف الأشعار 6B25.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب كشط الجلد 6B25.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد، غير محدد 6B25.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات التحكم بالدافع محددة أخرى 6C7Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات التحكم بالدافع، غير محدد 6C7Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية

الوصف:

يتسم السلوك المضطرب والاضطرابات الاجتماعية بمشاكل سلوكية مستمرة تتراوح من السلوكيات التي تتسم بالتحدي أو العصيان أو الاستفزاز أو الكراهية (أي السلوك المضطرب) بشكل ملحوظ ومستمر إلى تلك التي تنتهك باستمرار الحقوق الأساسية للآخرين أو الأعراف والقواعد المجتمعية الملائمة للعمر، أو القوانين (أي اللاتجتماعية). غالباً ما تكون بداية السلوك المضطرب والاضطرابات الاجتماعية، وإن لم يكن دائماً، أثناء الطفولة.

اضطراب التحدي المعارض 6C90

الوصف:

اضطراب التحدي المعارض هو نمط مستمر (على سبيل المثال، 6 أشهر أو أكثر) من السلوك المتحدي أو المعاند أو الاستفزازي أو الحاد بشكل ملحوظ والذي يحدث بشكل متكرر أكثر مما يتم ملاحظته عادةً لدى الأفراد من نفس العمر ومستوى النمو ولا يقتصر على التفاعل مع الأشقاء. قد يتجلى اضطراب التحدي المعارض في الحالة المزاجية الغاضبة السائدة، وغالباً ما تكون مصحوبة بنوبات شديدة من الغضب أو بالعناد والجدل والتحدي. يكون النمط السلوكي هام بحيث يؤدي إلى ضعف كبير في المجالات الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب التحدي المعارض نمط التهيج - الغضب 6C90.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب التحدي المعارض. يتميز هذا النوع من اضطراب لتحدي المعارض بالمزاج الغاضب السائد والمستمر أو المزاج العصبي والذي قد يكون موجوداً بشكل مستقل عن أي استفزاز واضح. غالباً ما يكون المزاج السلبي مصحوباً بثورات شديدة تحدث باستمرار والتي لا تتناسب بشكل صارخ من حيث الشدة أو المدة مع الاستفزاز. يعتبر الهياج المزمن والغضب سمة من سمات أداء الفرد كل يوم تقريباً، ويمكن ملاحظتهما عبر أماكن أو مجالات عمل متعددة (على سبيل المثال، المنزل والمدرسة والعلاقات الاجتماعية)، ولا تقتصر على علاقة الفرد بالديه / والديه أو الأوصياء عليه. لا يقتصر نمط التهيج المزمن والغضب على النوبات المتفرقة (على سبيل المثال، التهيج النمائي النموذجي) أو في فترات مميزة (على سبيل المثال، المزاج العصبي في سياق نوبات الهوس أو الاكتئاب).

اضطراب التحدي المعارض دون تهيج مزمن - غضب 6C90.1

الوصف:

يفي بجميع متطلبات التعريف لاضطراب التحدي المعارض. لا يتسم هذا النوع من اضطراب التحدي المعارض بالمزاج الغاضب السائد والمستمر أو المزاج العصبي أو سريع الانفعال، ولكنه يتميز بالسلوك العنيد والجدل والتحدي.

اضطراب التحدي المعارض، غير محدد 6C90

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

يتسم اضطراب السلوك الانشقاقي بنمط سلوك متكرر ومستمر تنتهك فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو الأعراف أو القواعد أو القوانين الاجتماعية الرئيسية الملائمة للعمر مثل الاعتداء على الأشخاص أو الحيوانات؛ تدمير الممتلكات؛ الغش أو السرقة. وانتهاكات خطيرة للقواعد. نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. من أجل التشخيص، يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، 12 شهراً أو أكثر). وبالتالي، فإن الأعمال الإجرامية أو الانفصالية المنفردة ليست في حد ذاتها أسباباً للتشخيص.

اضطراب المسلك الاجتماعي 6C91

الوصف:

يتسم اضطراب المسلك الاجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تُنتهك فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو الأعراف أو القواعد أو القوانين الاجتماعية الرئيسية الملائمة للعمر مثل الاعتداء على الأشخاص أو الحيوانات؛ تدمير الممتلكات؛ الغش أو السرقة. وانتهاكات خطيرة للقوانين. نمط المسلك يبلغ من الشدة ما يكفي لينتج عنه ضعف كبير في مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة. من أجل التشخيص، يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، 12 شهراً أو أكثر). وبالتالي، فإن الأعمال الإجرامية أو الاجتماعية المنفردة ليست في حد ذاتها أسباباً للتشخيص.

اضطراب المسلك اللااجتماعي، بدء في الطفولة 6C91.0

الوصف:

يتسم اضطراب المسلك اللااجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تُنتهك فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو الأعراف أو القواعد أو القوانين الاجتماعية الرئيسية الملائمة للعمر مثل الاعتداء على الأشخاص أو الحيوانات؛ تدمير الممتلكات؛ الغش أو السرقة. لوضع هذا التشخيص يجب أن توجد سمات للاضطراب أثناء الطفولة قبل المراهقة (على سبيل المثال، قبل سن 10 سنوات). من أجل التشخيص، يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، 12 شهراً أو أكثر). وبالتالي، فإن الأعمال الإجرامية أو الانفصالية المنفردة ليست في حد ذاتها أسباباً للتشخيص.

اضطراب المسلك اللااجتماعي، بدء في المراهقة 6C91.1

الوصف:

يتسم اضطراب المسلك اللااجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تُنتهك فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو الأعراف أو القواعد أو القوانين الاجتماعية الرئيسية الملائمة للعمر مثل الاعتداء على الأشخاص أو الحيوانات؛ تدمير الممتلكات؛ الغش أو السرقة.. لا توجد سمات للاضطراب أثناء الطفولة قبل المراهقة (على سبيل المثال، قبل سن 10 سنوات). من أجل التشخيص، يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، 12 شهراً أو أكثر). وبالتالي، فإن الأعمال الإجرامية أو الانفصالية المنفردة ليست في حد ذاتها أسباباً للتشخيص.

اضطراب المسلك الاجتماعي، غير محدد 6C91.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية محددة أخرى 6C9Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

السلوك المضطرب أو الاضطرابات الاجتماعية، غير محدد 6C9Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات الشخصية والسمات ذات الصلة

مضمنة في مكان آخر:

- تغير الشخصية الثانوي 6E68

اضطراب الشخصية 6D10

الوصف:

يتسم اضطراب الشخصية بمشاكل في أداء جوانب الذات (على سبيل المثال، الهوية، تقدير الذات، دقة النظرة الذاتية، التوجيه الذاتي)، و / أو الخلل الوظيفي مع الآخرين (على سبيل المثال، القدرة على تطوير علاقة وثيقة والحفاظ عليها بشكل مرضي للطرفين، والقدرة على فهم وجهات نظر الآخرين وإدارة الخلاف في العلاقات) والذي استمر لفترة طويلة من الزمن (على سبيل المثال، سنتان أو أكثر). يظهر الاضطراب في أنماط المعرفة، والتجربة العاطفية، والتعبير العاطفي، والسلوك غير القادر على التكيف (على سبيل المثال، غير المرن أو غير المنظم بشكل سيئ) ويتجلى في مجموعة من المواقف الشخصية والاجتماعية (أي لا يقتصر على علاقات وأدوار اجتماعية محددة). أنماط السلوك التي تميز الاضطراب لا تتناسب مع الناحية النمائية ولا يمكن تفسيرها في المقام الأول من خلال عوامل اجتماعية أو ثقافية، بما في ذلك الصراع الاجتماعي والسياسي. يرتبط الاضطراب بضائقة كبيرة أو ضعف كبير في المجالات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

اضطراب الشخصية الخفيف 6D10.0

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لاضطراب الشخصية. تؤثر الاختلالات على بعض مجالات أداء الشخصية دون غيرها (على سبيل المثال، مشاكل التوجيه الذاتي في غياب مشاكل الاستقرار وتماسك الهوية أو تقدير الذات)، وقد لا تكون ظاهرة في بعض السياقات. توجد مشاكل في العديد من العلاقات الشخصية و / أو في أداء الأدوار المهنية والاجتماعية المتوقعة، ولكن يتم الحفاظ على بعض العلاقات و / أو تنفيذ بعض الأدوار. عادة ما تكون المظاهر المحددة لاضطرابات الشخصية خفيفة الشدة. لا يرتبط اضطراب الشخصية الخفيف عادةً بإلحاق ضرر كبير بالنفس أو للآخرين، ولكنه قد يرتبط بضائقة كبيرة أو ضعف في مجالات الأداء الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من المجالات المهمة التي تقتصر إما على مجالات محددة (على سبيل المثال، العلاقات الرومانسية؛ العمل) أو قد توجد في مجالات أكثر ولكنها خفيفة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الشخصية الخفيف

المترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D11	سمات أو أنماط شخصية بارزة
6D11.0	الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسْر الشخصية
6D11.1	الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسْر الشخصية
6D11.2	اللااجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسْر الشخصية
6D11.3	التحلل في اضطراب الشخصية وعُسْر الشخصية
6D11.4	الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسْر الشخصية
6D11.5	النمط الحدي

اضطراب الشخصية المعتدل 6D10.1

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لاضطراب الشخصية. تؤثر الاختلالات على العديد من مجالات أداء الشخصية دون غيرها (على سبيل المثال، الهوية أو الإحساس بالذات، والقدرة على تكوين علاقات حميمة، والقدرة على التحكم في الدوافع وتعديل السلوك)، وعموماً قد يكون الأداء في بعض السياقات أقل تأثراً. هناك مشاكل ملحوظة في معظم العلاقات الشخصية، كما أن أداء معظم الأدوار الاجتماعية والمهنية المتوقعة معرض للخطر إلى حد ما. على الغالب ستميز العلاقات بالخلاف أو التجنب أو الانسحاب أو التبعية الشديدة (على سبيل المثال، عدد قليل من الصداقات التي يتم الحفاظ عليها، والخلاف المستمر في علاقات العمل والمشاكل المهنية المترتبة على ذلك، والعلاقات الرومانسية التي تتميز بالخلل الخطير أو الخضوع غير المناسب). عادة ما تكون المظاهر المحددة لاضطراب الشخصية معتدلة الشدة. وأحياناً يرتبط اضطراب الشخصية المعتدل بإيذاء الذات أو الآخرين، ويرتبط بضعف ملحوظ في مجالات الأداء الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة، على الرغم من أن استمرار الأداء في مجالات محددة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الشخصية المعتدل

المترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

سمات أو أنماط شخصية بارزة	6D11
الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية	6D11.0
الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية	6D11.1
اللااجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية	6D11.2
التحلل في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية	6D11.3
الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية	6D11.4
النمط الحدي	6D11.5

اضطراب الشخصية الشديد 6D10.2

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لاضطراب الشخصية. هناك اضطرابات شديدة في أداء الذات (على سبيل المثال، قد يكون الإحساس بالذات غير مستقر لدرجة أن الأفراد يذكرون عدم وجود إحساس بذاتهم أو أنهم صارمون لدرجة أنهم يرفضون المشاركة في المواقف إلا مجموعة ضيقة للغاية؛ النظرة الذاتية قد تتسم بازدراء الذات أو أن يكون مغروراً أو غريب الأطوار للغاية). تؤثر المشكلات في الأداء الشخصي بشكل خطير على جميع العلاقات تقريباً، كما أن القدرة والاستعداد لأداء الأدوار الاجتماعية والمهنية المتوقعة غائبة أو معرضة للخطر بشدة. المظاهر المحددة لاضطراب الشخصية شديدة وتؤثر على معظم، إن لم يكن كل، مجالات أداء الشخصية. غالباً ما يرتبط اضطراب الشخصية الشديد بإيذاء الذات أو الآخرين، ويرتبط بضعف شديد في جميع مجالات الحياة أو معظمها، بما في ذلك مجالات العمل الشخصية والعائلية والاجتماعية والتعليمية والمهنية وغيرها من مجالات الأداء المهمة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الشخصية الشديد

المتوافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D11	سمات أو أنماط شخصية بارزة
6D11.0	الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية
6D11.1	الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية
6D11.2	اللااجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية
6D11.3	التحلل في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية
6D11.4	الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية
6D11.5	النمط الحدي

اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة 6D10.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

سمات أو أنماط شخصية بارزة 6D11

الوصف:

يمكن تطبيق محددات مجال السمات على اضطرابات الشخصية أو عسر الشخصية لوصف خصائص شخصية الفرد الأكثر بروزاً والتي تساهم في اضطراب الشخصية. مجالات السمات تتماشى مع خصائص الشخصية الطبيعية لدى الأفراد الذين لا يعانون من اضطراب في الشخصية أو عسر الشخصية. مجالات السمات ليست فئات تشخيصية، ولكنها تمثل مجموعة من الأبعاد التي تتوافق مع البنية الأساسية للشخصية. يمكن تطبيق العديد من محددات مجال السمات حسب الضرورة لوصف أداء الشخصية. يميل الأفراد المصابون باضطراب أكثر حدة في الشخصية إلى امتلاك عدد أكبر من نطاقات السمات البارزة.

الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية 6D11.0

الوصف:

الخاصة الأساسية لمجال سمة الوجدان السلبي هي الميل لتجربة مجموعة واسعة من المشاعر السلبية. تشمل المظاهر الشائعة للوجدان السلبي، والتي قد لا تكون كلها موجودة في فرد معين في وقت معين، ما يلي: تجربة مجموعة واسعة من المشاعر السلبية بتواتر وشدة لا تتناسب مع الموقف؛ التقلب العاطفي وسوء تنظيم العاطفة؛ المواقف السلبية؛ تدني احترام الذات والثقة بالنفس؛ وعدم الثقة.

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عُسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

QE50.7	عُسر الشخصية
6D10	اضطراب الشخصية
6D10.0	اضطراب الشخصية الخفيف
6D10.1	اضطراب الشخصية المعتدل
6D10.2	اضطراب الشخصية الشديد
6D10.Z	اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية 6D11.1

الوصف:

الخاصة الأساسية لمجال سمة الانفصال هي الميل إلى الحفاظ على المسافة مع الأشخاص (الانفصال الاجتماعي) والمسافة العاطفية (الانفصال العاطفي). تشمل المظاهر الشائعة للانفصال، والتي قد لا تكون جميعها موجودة في فرد معين في وقت معين: الانفصال الاجتماعي (تجنب التفاعلات الاجتماعية، ونقص الصداقات، وتجنب العلاقة الحميمة): والانفصال العاطفي (التحفظ، والابتعاد، والتعبير والخبرة العاطفية المحدودة).

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عُسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الانفصال في اضطراب الشخصية أو عُسر الشخصية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

QE50.7 عُسر الشخصية

6D10 اضطراب الشخصية

6D10.0 اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.1 اضطراب الشخصية المعتدل

6D10.2 اضطراب الشخصية الشديد

6D10.Z اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

اللااجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.2

الوصف:

الخاصة الأساسية لمجال سمة اللااجتماعية هي تجاهل حقوق الآخرين ومشاعرهم، بما في ذلك كل من التمرکز حول الذات وعدم التعاطف. تشمل المظاهر الشائعة للاجتماعية، والتي قد لا تكون جميعها موجودة في فرد معين في وقت معين، ما يلي: التركيز على الذات (على سبيل المثال، الإحساس بالاستحقاق، وتوقع إعجاب الآخرين، والسلوكيات الإيجابية أو السلبية الساعية إلى الاهتمام، والاهتمام بالاحتياجات الخاصة والرغبات والراحة الشخصية وليس احتياجات الآخرين)؛ ونقص التعاطف (أي اللامبالاة فيما إذا كانت تصرفات المرء تزعج الآخرين، والتي قد تشمل الخداع والتلاعب والاستغلال للآخرين، والفظاظة والعدوانية الجسدية، والقسوة في الاستجابة لمعاناة الآخرين، والقسوة في تحقيق أهداف المرء).

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اللااجتماعية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

QE50.7 عُسر الشخصية

6D10 اضطراب الشخصية

6D10.0 اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.1 اضطراب الشخصية المعتدل

6D10.2 اضطراب الشخصية الشديد

6D10.Z اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

التحلل في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.3

الوصف:

الخاصة الأساسية لمجال سمة التحلل هي الميل إلى التصرف بتهور بناءً على محفزات خارجية أو داخلية مباشرة (مثل الأحاسيس والعواطف والأفكار)، دون النظر في العواقب السلبية المحتملة. تشمل المظاهر الشائعة للتحلل، والتي قد لا تكون جميعها موجودة في فرد معين في وقت معين، ما يلي: التشتت، غياب المسؤولية، التهور، ونقص التخطيط.

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عُسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى التحلل في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

QE50.7	عُسر الشخصية
6D10	اضطراب الشخصية
6D10.0	اضطراب الشخصية الخفيف
6D10.1	اضطراب الشخصية المعتدل
6D10.2	اضطراب الشخصية الشديد
6D10.Z	اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية 6D11.4

الوصف:

الخاصة الأساسية لنطاق سمة الوسواسية هي التركيز الضيق على المعيار الصارم للكمال والحق والخطأ، وعلى التحكم في سلوك الفرد وسلوك الآخرين والسيطرة على المواقف لضمان الامتثال لهذه المعايير. تشمل المظاهر الشائعة للوسواسية، والتي قد لا تكون كلها موجودة في فرد معين في وقت معين: الكمال (على سبيل المثال، الاهتمام بالقواعد الاجتماعية والالتزامات ومعايير الصواب والخطأ، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والصلابة، والمنهجية، الروتين اليومي، والجدولة المفرطة والتخطيط، والتركيز على التنظيم، والنظام، والأناقة)؛ والقيود العاطفية والسلوكية (على سبيل المثال، السيطرة الصارمة على التعبير العاطفي، والعناد وعدم المرونة، وتجنب المخاطر، والدأب، والنقاشية).

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عُسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الوسواسية في اضطراب الشخصية وعُسر الشخصية لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

QE50.7	عُسر الشخصية
6D10	اضطراب الشخصية
6D10.0	اضطراب الشخصية الخفيف
6D10.1	اضطراب الشخصية المعتدل
6D10.2	اضطراب الشخصية الشديد
6D10.Z	اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

النمط الحدي 6D11.5

الوصف:

يمكن تطبيق واصف النمط الحدي على الأفراد الذين يتميز نمط اضطراب الشخصية لديهم بنمط سائد من عدم استقرار العلاقات الشخصية، والصورة الذاتية، والوجدان، والاندفاعية الملحوظة، كما يتضح في العديد مما يلي: جهود محمومة لتجنب هجر حقيقي أو متخيل؛ نمط من العلاقات الشخصية غير المستقرة والمكثفة؛ اضطراب الهوية الذي يتجلى في صورة ذاتية أو إحساس بالذات غير مستقر بشكل ملحوظ ومستمر؛ الميل إلى التصرف بتهور في حالات الوجدان السلبي الشديد، مما يؤدي إلى سلوكيات قد تدمر الذات؛ نوبات متكررة من إيذاء النفس. عدم الاستقرار العاطفي بسبب رد الفعل الملحوظ للمزاج؛ الشعور المزمن بالفراغ؛ والغضب الشديد غير المناسب أو صعوبة السيطرة على الغضب؛ أعراض تفارقية عابرة أو سمات شبيهة بالذهان في حالات الإثارة العاطفية العالية.

ملاحظة للترميز:

يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر الشخصية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى النمط الحدي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

QE50.7	عُسر الشخصية
6D10	اضطراب الشخصية
6D10.0	اضطراب الشخصية الخفيف
6D10.1	اضطراب الشخصية المعتدل
6D10.2	اضطراب الشخصية الشديد
6D10.Z	اضطراب الشخصية، الشدة غير محددة

الوصف:

متلازمة تتميز باضطراب دائم في الشخصية يمثل تغيراً عن نمط الشخصية المميزة السابقة للفرد والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ والفحص الجسدي، أو النتائج المخبرية. لا يتم تفسير الأعراض عن طريق الهذيان أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية بوساطة لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، الانسحاب الاجتماعي أو التجنب أو الاعتماد استجابة لتشخيص يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون أعراض الشخصية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً محدداً.

الاستثناءات :

- هذيان (6D70)
- عسر الشخصية (QE50.7)
- اضطراب الشخصية (6D10)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى تغير الشخصية الثانوي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطرابات الولع الجنسي

الوصف:

تتسم اضطرابات الولع الجنسي بالأنماط المستمرة والشديدة من الاستثارة الجنسية غير النمطية، والتي تتجلى في الأفكار الجنسية أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات، قد يكون التركيز على الآخرين الذين تجعلهم أعمارهم أو حالتهم غير راغبين أو غير قادرين على الموافقة والتي كان الشخص قد تصرف بمقتضاها أو تسببت بضائقة له/لها بشكل ملحوظ. قد تشمل اضطرابات الولع الجنسي أنماط الاستثارة التي تنطوي على سلوكيات إنفرادية أو موافقة الأفراد، والتي تؤدي إلى ضائقة واضحة، ليس نتيجة للرفض أو خوف الرفض لنمط الاستثارة من قبل الآخرين فحسب، وإنما لوجود خطر كبير للإصابة أو الموت.

مُشمَلات:

- الولع الجنسي

اضطراب الاستعراء 6D30

الوصف:

يتسم اضطراب الاستعراء بنمط مستدام ومركّز ومكثف من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار والتخيلات أو الدوافع أو السلوكيات الجنسية المستمرة - التي تتضمن إظهار الأعضاء التناسلية لفرد مطمئن في الأماكن العامة، عادةً دون دعوة أو نية اتصال وثيق. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تشخيص اضطراب الاستعراء، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخيلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. يستثني اضطراب الاستعراء على وجه التحديد السلوكيات الاستعراضية التوافقية التي تحدث بموافقة الشخص أو الأشخاص المعنيين بالإضافة إلى أشكال الاستعراض المسموح بها اجتماعياً.

اضطراب التلصص 6D31

الوصف:

يتسم اضطراب التلصص بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار والتخيلات أو الدوافع أو السلوكيات الجنسية المستمرة والتي تتضمن مراقبة فرد غير مرتاب والذي يكون عارياً، أو أثناء عملية نزع الثياب أو الانخراط في نشاط جنسي. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تشخيص اضطراب التلصص، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخيلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. يستبعد اضطراب التلصص على وجه التحديد السلوكيات التلصصية التوافقية التي تحدث بموافقة الشخص أو الأشخاص الذين يتم ملاحظتهم.

اضطراب الولع بالأطفال 6D32

الوصف:

يتسم اضطراب الولع بالأطفال بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار الجنسية المستمرة أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات التي تشمل الأطفال قبل سن البلوغ. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تشخيص اضطراب الولع بالأطفال، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخیلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. لا ينطبق هذا التشخيص على السلوكيات الجنسية بين الأطفال في سن ما قبل أو بعد البلوغ مع أقرانهم الذين في سن مقاربة.

اضطراب السادية الجنسي القسري 6D33

الوصف:

يتسم اضطراب السادية الجنسي القسري بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار الجنسية المستمرة أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات التي تنطوي على إلحاق معاناة جسدية أو نفسية بشخص غير موافق. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تشخيص اضطراب السادية الجنسي القسري، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخیلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. يستبعد اضطراب السادية الجنسي القسري على وجه التحديد السادية الجنسية التوافقية والمازوخية.

اضطراب التحرش 6D34

الوصف:

يتسم اضطراب التحرش بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار الجنسية المستمرة أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات التي تتضمن لمس أو حك شخص غير موافق في الأماكن العامة المزدحمة. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تشخيص اضطراب التحرش، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخیلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. يستبعد اضطراب التحرش على وجه التحديد اللمس أو الحك لشخص أو أشخاص بموافقتهم.

اضطراب الولع الجنسي الآخر الذي يشمل أفراداً غير موافقين 6D35

الوصف:

يتسم اضطراب الولع الجنسي الآخر الذي يشمل أفراداً غير موافقين بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار الجنسية المستمرة أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات التي تتضمن تركيز نمط الاستثارة على أشخاص آخرين غير راغبين أو غير قادرين على الموافقة ولكن هذا الولع لم يتم وصفه على وجه التحديد في أي من الفئات الأخرى في اضطرابات الولع الجنسي (على سبيل المثال، أنماط الإثارة التي تشمل الجثث أو الحيوانات). بالإضافة إلى ذلك، من أجل تشخيص اضطراب الولع الجنسي الآخر الذي يشمل أفراداً غير موافقين، يجب أن يكون الفرد قد تصرف بناءً على هذه الأفكار أو التخیلات أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها. يستبعد اضطراب الولع الجنسي الآخر الذي يشمل أفراداً غير موافقين على وجه التحديد السلوكيات الجنسية التي تشمل أشخاصاً آخرين بموافقتهم، على اعتبار أنهم قادرين على منح الموافقة.

اضطراب الولع الجنسي الذي يشمل السلوك الانفرادي أو الأفراد الموافقين 6D36

الوصف:

يتسم اضطراب الولع الجنسي الذي يشمل السلوك الانفرادي أو الأفراد الموافقين بنمط مستدام ومركّز وشديد من الإثارة الجنسية - كما يتجلى في الأفكار الجنسية المستمرة أو التخیلات أو الدوافع أو السلوكيات التي تتضمن أشخاصاً موافقين أو سلوك انفرادي. يجب أن يكون أحد العنصرين التاليين حاضراً: (1) يشعر الشخص بالضائقة بشكل ملحوظ بسبب طبيعة نمط الاستثارة وليس الضيق نتيجة للرفض أو خوف الرفض لنمط الاستثارة من قبل الآخرين فحسب؛ أو (2) طبيعة سلوك الولع الجنسي تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة أو الموت إما للفرد أو للشريك (على سبيل المثال، الاختناق).

اضطراب الولع الجنسي، غير محدد 6D3Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات المُفتعلة

الوصف:

تتسم الاضطرابات المفتعلة بالتظاهر المتعمد أو تزييف أو تحريض أو مفاخرة العلامات والأعراض الطبية أو النفسية أو السلوكية أو الإصابة للشخص أو عند شخص آخر، والأكثر شيوعاً حصول الاضطراب للأطفال المعالين، والمرتبطة بخداع محدد. قد يكون هناك اضطراب أو مرض موجود مسبقاً، لكن الفرد وعن قصد يُفاقم الأعراض الموجودة أو يزور أو يُحدث أعراضاً إضافية. يسعى الأفراد المصابون بالاضطراب المفتعل إلى العلاج أو يقدمون أنفسهم أو غيرهم على أنهم مرضى أو مصابين أو معاقين بناءً على العلامات أو الأعراض أو الإصابات المزيفة أو المتعمدة. لا يكون السلوك المخادع مدفوعاً فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل المثال، الحصول على مدفوعات الإعاقة أو التهرب من الملاحقة الجنائية). وهذا على عكس التمارض، حيث تحفز المكافآت أو الحوافز الخارجية الواضحة السلوك.

استثناءات:

- التمارض (QC30)

الاضطراب المفتعل المفروض على الذات 6D50

الوصف:

يتسم الاضطراب المفتعل المفروض على الذات بالتظاهر أو تزيف أو تحريض العلامات والأعراض الطبية أو النفسية أو السلوكية أو الإصابة المرتبطة بخداع محدد. في حالة وجود اضطراب أو مرض موجود مسبقاً، يسبب الفرد عن قصد تفاقم الأعراض الموجودة أو تزوير أو إحداث أعراض إضافية. يسعى الفرد للعلاج أو يعرض نفسه بطريقة أخرى على أنه مريض أو مصاب أو ضعيف بناءً على العلامات أو الأعراض أو الإصابات المزيفة أو المتعمدة التي يسببها الذات. لا يكون السلوك المخادع مدفوعاً فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل المثال، الحصول على مدفوعات الإعاقة أو التهرب من الملاحقة الجنائية). وهذا على عكس التمارض، حيث تحفز المكافآت أو الحوافز الخارجية الواضحة السلوك.

مُشمِلات:

- متلازمة مونشهاوزن

استثناءات:

- التمارض (QC30)
- اضطراب كشط الجلد (6B25.1)

الاضطراب المفتعل المفروض على الغير 6D51

الوصف:

يتسم الاضطراب المفتعل المفروض على الغير بالتظاهر أو تزيف أو تحريض العلامات والأعراض الطبية أو النفسية أو السلوكية أو الإصابة على شخص آخر وتكون مرتبطة بخداع محدد. في حالة وجود اضطراب أو مرض موجود مسبقاً في الشخص الآخر، يقوم الفرد عن قصد بمفاقمة الأعراض الموجودة أو تزوير أو إحداث أعراض إضافية. يسعى الفرد إلى علاج الشخص الآخر أو يعرضه بطريقة أخرى على أنه مريض أو مصاب أو ضعيف بناءً على العلامات أو الأعراض أو الإصابات المزيفة أو المتعمدة. لا يكون السلوك المخادع مدفوعاً فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل المثال، الحصول على مدفوعات الإعاقة أو تجنب الملاحقة الجنائية لإساءة معاملة الأطفال أو كبار السن).

استثناءات:

- التمارض (QC30)

الاضطراب المفتعل، غير محدد 6D5Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات المعرفية العصبية

الوصف:

تتسم الاضطرابات المعرفية العصبية بالعجز السريري الأولي في الوظائف المعرفية المكتسبة وليست التطورية. أي أن الاضطرابات المعرفية العصبية لا تشمل الاضطرابات التي تتميز بخلل في الوظيفة المعرفية وجد منذ الولادة أو نشأ خلال فترة النمو، والتي تصنف ضمن مجموعة اضطرابات النمو العصبية. بدلاً من ذلك، تمثل الاضطرابات المعرفية العصبية انخفاضاً عن مستوى الأداء الذي تم بلوغه سابقاً. على الرغم من وجود العجز المعرفي في العديد من الاضطرابات العقلية (على سبيل المثال، الفصام والاضطرابات ثنائية القطب)، يتم تضمين الاضطرابات التي تكون سماتها الأساسية معرفية فقط في مجموعة الاضطرابات المعرفية العصبية. في الحالات التي يمكن فيها تحديد الباثولوجيا المرضية الأساسية ومسببات الاضطرابات العصبية المعرفية، فيجب تصنيف المسببات المحددة بشكل منفصل.

مضمنة في مكان آخر:

- المتلازمة المعرفية العصبية الثانوية (E676)

الوصف:

يتسم الهديان باضطراب الانتباه (أي انخفاض القدرة على توجيه الانتباه والتركيز والمحافظة عليه وتحويله) والوعي (أي انخفاض التوجه نحو البيئة) الذي يتطور خلال فترة زمنية قصيرة ويميل إلى التقلب خلال مسار اليوم، مصحوباً بضعف معرفي آخر مثل عجز الذاكرة أو التخليط أو ضعف اللغة أو القدرة البصرية المكانية أو الإدراك. قد يكون هناك أيضاً اضطراب في دورة النوم والاستيقاظ (انخفاض يََقْظَة حاد البدء أو فقدان النوم التام مع عكس دورة النوم والاستيقاظ). تُعزى الأعراض إلى اضطراب أو مرض لا يُصنف ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية أو التسمم بمادة أو السحب من مادة أو إلى دواء.

الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان. هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية على أن الهذيان ناتج عن العواقب الفيزيولوجية المباشرة لاضطراب أو مرض مصنف في مكان آخر.

ملاحظة للترميز:

يجب تصنيف المسببات المحددة بشكل منفصل.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان. هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية على أن الهذيان ناتج عن العواقب الفيزيولوجية المباشرة لمادة أو دواء (متضمناً السحب). إذا جرى تحديد المادة المحددة التي تسبب الهذيان، فيجب تصنيفها باستخدام الفئة الفرعية المناسبة (على سبيل المثال، الهذيان الناتج عن الكحول).

مضمنة في مكان آخر:

- الهذيان الناتج عن الكحول (6C40.5)
- الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)
- الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)
- الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)
- الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)
- الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)
- الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)
- الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)
- الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)
- الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5)
- الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)
- الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4)
- الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)

- الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)
- الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5)

يمكن الرجوع لأي من هذه الحالات في القسم المخصص

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان. هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية على أن الهذيان يُعزى إلى عوامل مسببة متعددة، والتي قد تشمل الاضطرابات أو الأمراض غير المصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، أو التسمم بالمواد أو السحب منها، أو الأدوية.

ملاحظة للترميز:

يجب تصنيف المسببات المحددة بشكل منفصل.

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أو لا يمكن تحديدها 6D70.3

الوصف:

تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان. المسببات النوعية للهذيان غير محددة أو لا يمكن تحديدها.

الوصف:

يتميز الاضطراب العصبي المعرفي الخفيف بالاختبار الذاتي للانحدار عن المستوى السابق من الأداء المعرفي، مصحوباً بدليل موضوعي على ضعف في الأداء في واحد أو أكثر من المجالات المعرفية مقارنة بما هو متوقع نظراً لعمر الفرد والمستوى العام للأداء الفكري، وهذا التدني ليس شديداً بما يكفي للتدخل بشكل كبير في استقلال أداء الشخص لأنشطة الحياة اليومية. لا يُعزى الضعف المعرفي بالكامل إلى الشيخوخة الطبيعية. قد يُعزى الضعف المعرفي إلى مرض أساسي في الجهاز العصبي، أو صدمة، أو عدوى أو عملية مرضية أخرى تؤثر على مناطق معينة من الدماغ، أو إلى الاستخدام المزمن لمواد أو أدوية معينة، أو قد تكون المسببات غير محددة.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطراب العصبي المعرفي الخفيف

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب النساوة 6D72

الوصف:

يتسم اضطراب النساوة بضعف شديد في الذاكرة بالنسبة لعمر الفرد والمستوى العام للأداء الفكري الذي لا يتناسب مع الضعف في المجالات المعرفية الأخرى. يتجلى ذلك من خلال عجز حاد في اكتساب الذكريات أو تعلم معلومات جديدة أو عدم القدرة على تذكر المعلومات المكتسبة سابقاً، دون اضطراب في الوعي أو ضعف معرفي عام. عادة ما تكون الذاكرة الحديثة مضطربة أكثر من الذاكرة البعيدة وعادة ما يتم الاحتفاظ بالاستدعاء الفوري. لا يُعزى ضعف الذاكرة إلى التسمم بالمواد أو السحب من المواد، ويُفترض أنه يُعزى إلى حالة عصبية كامنة أو صدمة أو عدوى أو ورم أو عملية مرضية أخرى تؤثر على مناطق معينة من الدماغ أو إلى الاستخدام المزمن لمواد أو أدوية معينة.

استثناءات:

- الهذيان 6D70
- الخرف (6D80-6D8Z)
- الاضطراب العصبي المعرفي الخفيف 6D71

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النساوة

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب النساء ناتج عن أمراض مصنفة في مكان آخر 6D72

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب النساء. هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية على أن الاضطراب ناجم عن العواقب الفيزيولوجية المباشرة لاضطراب أو مرض مصنف في مكان آخر. يجب تصنيف المسببات المحددة بشكل منفصل.

الاستثناءات:

- فقدان الذاكرة الرجعي (MB21.11)
- متلازمة كورساكوف، الناتجة عن الكحول أو غير المحددة (8D44)
- النساء التفارقية (6B61)
- فقدان الذاكرة المتقدم (MB21.10)
- فقدان الذاكرة NOS (MB21.1)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النساء ناتج عن أمراض مصنفة في مكان آخر

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب النسالة ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D72.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب النسالة. ويستمر ضعف الذاكرة إلى ما بعد المدة المعتادة للانسمام بالمواد أو السحب منها. هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية على أن الاضطراب ناجم عن العواقب الفيزيولوجية المباشرة لاستخدام مادة أو دواء. إذا تم تحديد المادة المحددة المسببة لاضطراب النسالة، فينبغي تصنيفها باستخدام الفئة الفرعية المناسبة (على سبيل المثال، اضطراب النسالة بسبب استعمال الكحول).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النسالة ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10

يرجى العودة للقسم المخصص

اضطراب النساوة الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6D72.11

الوصف:

يتميز اضطراب النساوة الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق بتطور متلازمة ضعف الذاكرة التي تشترك في السمات السريرية الأولية مع اضطراب النساوة، والتي يُحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة لاستخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق. تتطور أعراض اضطراب النساوة بسبب استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسحاب بالمهدئات والمنومات ومضادات القلق أو السحب منها، لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة المرتبطة عادةً بهذه الحالات. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب لا يعود لاستعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، كالخرف أو اضطراب النساوة الناتج عن أسباب غير استعمال المواد.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النساوة الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6C44.1

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي 6C44.10

نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر 6C44.11

6C44.1Z	نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
6C44.2	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
6C44.20	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
6C44.21	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
6C44.22	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
6C44.23	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
6C44.2Z	الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الوصف:

يتميز اضطراب النسالة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية بتطور متلازمة ضعف الذاكرة التي تشترك في السمات السريرية الأولية مع اضطراب النسالة، والتي يُحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة لاستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي. تتطور أعراض اضطراب النسالة بسبب استعمال المادة أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمادة أو السحب منها، لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة المرتبطة عادةً بهذه الحالات. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام المادة معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب لا يعود لاستعمال المادة المحددة ذات التأثير النفسي، كالخرف أو اضطراب النسالة الناتج عن أسباب غير استعمال المواد متضمناً الأدوية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب النسالة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية.

الأدوية (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

اضطراب النسابة الناتج عن استعمال المستنشقات الطيارة 6D72.13

الوصف:

يتميز اضطراب النسابة الناتج عن استعمال المستنشقات الطيارة بتطور متلازمة ضعف الذاكرة التي تشترك في السمات السريرية الأولية مع اضطراب النسابة، والتي يُحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة لاستخدام المستنشقات الطيارة. تتطور أعراض اضطراب النسابة بسبب استعمال المستنشقات الطيارة أثناء أو بعد فترة وجيزة من الانسمام بالمستنشقات الطيارة أو السحب منها، لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة المرتبطة عادةً بهذه الحالات. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام المستنشقات الطيارة معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة. لا يتم تفسير الأعراض بشكل أفضل من خلال اضطراب لا يعود لاستعمال المستنشقات الطيارة، كالخرف أو اضطراب النسابة الناتج عن أسباب غير استعمال المواد.

اضطراب النساوة الناتج عن عوامل مرضية مسببة غير معروفة أو غير محددة 6D72.2

تم استيفاء جميع المتطلبات التعريفية لاضطراب النساوة. المسببات المحددة للاضطراب غير محددة أو لا يمكن تحديدها.

اضطراب نساوة محدد آخر 6D72Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب النساوة، غير محدد 6D72Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الخرف

الوصف:

الخرف هو متلازمة دماغية مكتسبة تتميز بانخفاض عن المستوى السابق للأداء المعرفي مع ضعف في مجالين أو أكثر من المجالات المعرفية (مثل الذاكرة والوظائف التنفيذية والانتباه واللغة والمعرفة الاجتماعية والمحاكمة والسرعة النفسية الحركية والقدرات الإدراكية البصرية والإبصارية الفَرَاعِيَّة). لا يُعزى الضعف المعرفي بالكامل إلى الشيخوخة الطبيعية ويتعارض بشكل كبير مع الاستقلال في أداء الشخص لأنشطة الحياة اليومية. بناءً على الأدلة المتاحة، يُعزى الضعف المعرفي أو يُفترض أنه يُعزى إلى حالة عصبية أو طبية تؤثر على الدماغ أو الصدمة أو نقص التغذية أو الاستخدام المزمن لمواد أو أدوية معينة أو التعرض للمعادن الثقيلة أو السموم الأخرى.

مُشمِّلات:

- الخرف NOS

الاستثناءات:

- الغيبوبة (MB20.1)
- الهذيان (6D70)
- اضطرابات النمو الذهني (6A00)
- اضطرابات النمو العصبية (6A00-6A0Z)
- الذهول (MB20.0)
- الشيخوخة (الشيخوخة) (MG2A)

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون

الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

الخرف الناتج عن مرض الزهايمر 6D80

الوصف:

الخرف الناتج عن مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعاً. البداية مُخاتلة حيث ضعف الذاكرة هو عادة الشكوى الأولية. الدورة المميزة هي انخفاض بطيء ولكنه ثابت عن المستوى السابق للأداء المعرفي مع ضعف في المجالات المعرفية الإضافية (مثل الذاكرة والوظائف التنفيذية والانتباه واللغة والمعرفة الاجتماعية والمحاكمة والسرعة النفسية الحركية والقدرات الإدراكية البصرية والإبصارية الفَرَغِيَّة) الناشئة مع تطور المرض. غالباً ما يصاحب الخرف الناتج عن مرض الزهايمر أعراض عقلية وسلوكية مثل المزاج المكتئب واللامبالاة في المراحل الأولى من المرض وقد يكون مصحوباً بأعراض ذهانية وتهيج وعدوانية وتشوش وتشوهات في المشي والحركة واختلاجات في المراحل الأخيرة. تُشير الاختبارات الجينية الإيجابية والتاريخ العائلي والتدهور المعرفي التدريجي إلى الإصابة بالخرف الناتج عن مرض الزهايمر.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن مرض الزهايمر

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

- 6D86.2 أعراض القلق في الخرف
- 6D86.3 التَّبَلُّد في الخرف
- 6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف
- 6D86.5 التحلل في الخرف
- 6D86.6 تجول في الخرف
- 6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
- 6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة
- الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء باكراً 6D80.0

الوصف:

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر حيث تظهر الأعراض قبل سن 65 سنة. وهو نادر نسبياً، ويمثل أقل من 5٪ من جميع الحالات، ويمكن تحديده وراثياً (مرض الزهايمر السائد وراثياً). قد يكون العرض السريري مشابهاً للحالات ذات الظهور المتأخر، لكن نسبة كبيرة من الحالات تظهر أعراضاً غير نمطية، مع ضعف ذاكرة أقل حدة نسبياً.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون

الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء باكر

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَبَلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء متأخر 6D80.1

الوصف:

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر حيث تظهر الأعراض بعد سن 65 سنة. وهو الشائع، ويمثل أكثر من 95٪ من جميع الحالات.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء متأخر

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَبَلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر، نمط مختلط مع داء وعائي دماغي 6D80.2

الوصف:

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر الذي يرافقه داء وعائي دماغي.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر، نمط مختلط مع داء وعائي دماغي

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر، نمط مختلط مع عوامل مرضية غير وعائية 6D80.3

الوصف:

الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر الذي يرافقه عامل مرضي آخر، لا يشمل الداء الوعائي الدماغي.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر، نمط مختلط مع عوامل مرضية غير وعائية

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن مرض الزهايمر، بدء غير محدد أو غير معروف 6D80.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

ملاحظة للرميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن مرض الزهايمر، بدء غير محدد أو غير معروف
لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

داء الزهايمر 8A20

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن داء وعائي 6D81

الوصف:

ينجم الخرف الوعائي عن إصابة كبيرة لنسيج الدماغ الناتجة عن داء وعائي دماغي (نقص تروية أو نزيف). يرتبط ظهور العجز المعرفي مؤقتاً بواحد أو أكثر من أحداث الأوعية الدموية. عادةً ما يكون التدهور المعرفي أكثر بروزاً في سرعة معالجة المعلومات، والانتباه المعقد، والأداء التنفيذي الجبهي. هناك أدلة على وجود داء وعائي دماغي والذي يعتبر كافياً لتفسير العجز العصبي المعرفي من التاريخ والفحص الجسدي والتصوير العصبي.

استثناءات:

- الخَرَف الناتج عن مرض الزهايمر، نمط مختلط مع داء وعائي دماغي 6D80.2

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن داء وعائي

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَّبلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي 6D82

الوصف:

يعد الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي ثاني أكثر أشكال الخرف شيوعاً بين كبار السن بعد الزهايمر. المسببات الدقيقة غير معروفة ولكنها تنطوي على انثناء غير طبيعي لبروتين ألفا سينوكلين وتجمعه لتكوين جسيم ليوي، والذي يتركز بشكل أساسي في القشرة وجذع الدماغ. يكون البدء مخاتلاً مع عجز وظيفي وعجز في الانتباه عادةً ما يتظاهر على أنه الشكوى الأولية. غالباً ما تكون هذه العيوب المعرفية مصحوبة بهلاوس بصرية وأعراض اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة. قد تكون الهلاوس في الطرق الحسية الأخرى وقد تظهر أعراض الاكتئاب وقد تتواجد الأوهام أيضاً. عادة ما يختلف تظاهر الأعراض بشكل كبير على مدار الأيام مما يستلزم التقييم المستمر والتمييز عن الهذيان. يعد الظهور التلقائي لداء باركنسون خلال عام واحد تقريباً من ظهور الأعراض المعرفية من سمات الداء.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

داء جسيمات ليوي 8A22

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

- 6D86.3 التَّبلُّد في الخرف
- 6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف
- 6D86.5 التحلل في الخرف
- 6D86.6 تجول في الخرف
- 6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
- 6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة
- الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الجبهي الصدغي 6D83

الوصف:

الخَرَف الجبهي الصدغي (FTD) هو مجموعة من الاضطرابات العصبية التنكسية الأولية التي تؤثر بشكل أساسي على الفصين الجبهي والصدغي. عادة ما تكون البداية مختلة مع مسار تدريجي يزداد سوءاً. تم وصف العديد من المتغيرات في عرض المتلازمة (بعضها له أساس وراثي أو عائلي محدد)، قد تشمل المظاهر تغيرات شخصية وسلوكية سائدة (مثل الخلل الوظيفي التنفيذي، واللامبالاة، وتدهور المعرفة الاجتماعية، والسلوكيات المتكررة، والتغيرات الغذائية) أو مع أوجه القصور اللغوية سائدة (التي تشمل الأشكال الدلالية، وفقد الطلاقة/فقد القواعد، وحبسة الأسماء والتكرار)، أو مع مزيج من هذه العيوب. غالباً ما تظل وظائف الذاكرة، والسرعة النفسية الحركية، وكذلك القدرات الإدراكية البصرية والإبصارية الفَرَاعِيَّة سليمة نسبياً، لا سيما خلال المراحل المبكرة من الاضطراب.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الجبهي الصدغي

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

تنكس جبهي صدغي 8A23

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

- 6D86.2 أعراض القلق في الخرف
- 6D86.3 التَّبَلُّد في الخرف
- 6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف
- 6D86.5 التحلل في الخرف
- 6D86.6 تجول في الخرف
- 6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
- 6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة
- الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D84

الوصف:

يشمل الخرف الناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية، أشكالاً من الخرف التي تعتبر نتيجة مباشرة لاستعمال المواد والتي تستمر إلى ما بعد المدة المعتادة للتأثير أو متلازمة السحب المرتبطة بهذه المادة. يجب أن تكون كمية ومدة استخدام المواد كافية لإنتاج الضعف المعرفي. لا يُعزى الضعف المعرفي بشكل أفضل إلى اضطراب لا تسببه المواد، مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.

استثناءات:

- الخرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى (6D85.2)

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي

6C4E.21	الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
6C4E.22	الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
6C40.23	الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
6C4E.2Z	الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف بسبب استعمال الكحول 6D84.0

الوصف:

يتميز الخرف الناتج عن استعمال الكحول بتطور تدرج في القدرات المعرفية مستمر (على سبيل المثال، مشاكل الذاكرة وضعف اللغة وعدم القدرة على أداء المهام الحركية المعقدة) ما يلي المتطلبات التعريفية للخرف والتي تعتبر نتيجة مباشرة لاستعمال الكحول وتستمر إلى ما بعد المدة المعتادة للانسحاب من الكحول أو السحب الحاد. يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول كافية للتسبب بالضعف المعرفي. لا يفسر الخلل المعرفي بشكل أفضل عن طريق اضطراب أو مرض لا يسببه الكحول مثل الخرف بسبب اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر.

مُشمَلات:

- اضطراب النساء بسبب استعمال الكحول 6D72.10

الاستثناءات:

- متلازمة كورساكوف (5B5A.11)
- متلازمة كورساكوف - فيرنكه (5B5A.1)

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

لا ينبغي استخدام هذه الفئة لوصف التغيرات المعرفية بسبب نقص الثيامين المرتبط باستعمال الكحول المزمن.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى خرف بسبب استعمال الكحول

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

6C40.1	نمط ضار من استعمال الكحول
6C40.10	نمط ضار من استعمال الكحول، نوبي
6C40.11	نمط ضار من استعمال الكحول، مستمر
6C40.1Z	نمط ضار من استعمال الكحول، غير محدد
6C40.2	الاعتماد على الكحول
6C40.20	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، مستمر
6C40.21	الاعتماد على الكحول، الاستعمال الحالي، نوبي
6C40.22	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مبكرة
6C40.23	الاعتماد على الكحول، هدأة جزئية مستدامة
6C40.24	الاعتماد على الكحول، هدأة كاملة مستدامة
6C40.2Z	الاعتماد على الكحول، غير محدد
(متر افق مع، استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
6C40.3	الانسمام بالكحول
6C40.4	سحب الكحول
6C40.40	سحب الكحول، غير مختلط
6C40.41	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية
6C40.42	سحب الكحول، مع اختلاجات
6C40.43	سحب الكحول، مع اضطرابات ادراكية واختلاجات
6C40.4Z	سحب الكحول، غير محدد
الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):	
XS5W خفيف	

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق 6D84.1

الوصف:

يتميز الخَرَف الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق بتطور العيوب المعرفية المستمرة (على سبيل المثال، مشاكل الذاكرة، وضعف اللغة، وعدم القدرة على أداء المهام الحركية المعقدة) التي تلي المتطلبات التعريفية للخرف والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة مباشرة لاستخدام المهدئات والمنومات ومضادات القلق والتي تستمر إلى ما بعد المدة المعتادة للفعل أو متلازمة السحب المرتبطة بالمادة. يجب أن تكون كمية ومدة الاستعمال للمهدئات والمنومات ومضادات القلق كافية لإنتاج الضعف المعرفي. لا يتم تفسير الخلل المعرفي بشكل أفضل عن طريق الاضطراب الذي لا تسببه المهدئات أو المنومات أو مضادات القلق مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.

مُشمَلات:

- اضطراب ذهاني متأخر تسببه مادة ذات تأثير نفسي
- اضطراب الإدراك التالي للمهلوس

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

- 6C44.1 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.10 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، نوبي
- 6C44.11 نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، مستمر
- 6C44.1Z نمط ضار من استعمال المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد
- 6C44.2 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق
- 6C44.20 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، الاستعمال الحالي
- 6C44.21 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مبكرة
- 6C44.22 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة جزئية مستدامة
- 6C44.23 الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، هدأة كاملة مستدامة
- 6C44.2Z الاعتماد على المهدئات والمنومات ومضادات القلق، غير محدد

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن استعمال المستنشقات الطائرة 6D84.2

الوصف:

يتميز الخرف الناتج عن استعمال المستنشقات الطائرة بتطور العيوب المعرفية المستمرة (على سبيل المثال، مشاكل الذاكرة، وضعف اللغة، وعدم القدرة على أداء المهام الحركية المعقدة) التي تلبي المتطلبات التعريفية للخرف والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة مباشرة لاستخدام المستنشقات الطائرة والتي تستمر إلى ما بعد المدة المعتادة للفعل أو متلازمة السحب المرتبطة بالمادة. يجب أن تكون كمية ومدة الاستعمال للمستنشقات الطائرة كافية لإنتاج الضعف المعرفي. لا يتم تفسير الخلل المعرفي بشكل أفضل عن طريق الاضطراب الذي لا تسببه المستنشقات الطائرة مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن استعمال المستنشقات الطائرة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة 6C4B.1

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، نوبي 6C4B.10

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، مستمر 6C49.11

نمط ضار من استعمال المستنشقات الطائرة، غير محدد 6C4B.1Z

الاعتماد على المستنشقات الطائرة 6C4B.2

الاعتماد على المستنشقات الطائرة، الاستعمال الحالي 6C4B.20

الاعتماد على المستنشقات الطائرة، هدأة كاملة مبكرة 6C49.21

6C49.22	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة جزئية مستدامة
6C4B.23	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، هدأة كاملة مستدامة
6C4B.2Z	الاعتماد على المستنشقات الطيارة، غير محدد
	الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):
XS5W	خفيف
XS0T	معتدل
XS25	شديد

الخرف الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي 6D84.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

- 6C4E.1 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.10 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، نوبي
- 6C4E.11 نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، مستمر
- 6C4E.1Z نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد
- 6C4E.2 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي
- 6C4E.20 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، الاستعمال الحالي
- 6C4E.21 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مبكرة
- 6C4E.22 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة جزئية مستدامة
- 6C40.23 الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، هدأة كاملة مستدامة
- 6C4E.2Z الاعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفسي، غير محدد

مترافق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

- 6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف
- 6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف
- 6D86.2 أعراض القلق في الخرف
- 6D86.3 التَبَلُّد في الخرف
- 6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف
- 6D86.5 التحلل في الخرف
- 6D86.6 تجول في الخرف
- 6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
- 6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة
- الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن داء مصنف في مكان آخر 6D85

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن داء مصنف في مكان آخر

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَبَلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن داء باركنسون 6D85.0

الوصف:

يتطور الخرف الناتج عن داء باركنسون بين الأفراد المصابين بمرض باركنسون مجهول السبب ويتميز بضعف في الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية والإبصارِيَّة الفَرَاغِيَّة وكذلك الأعراض السلوكية والنفسية مثل التغيرات في العاطفة واللامبالاة والهلاوس. البداية مختلة والمسار المرضي عبارة عن حالة تدهور تدريجي للأعراض. الارتباط المرضي الأساسي هو التنكس بجسيم ليوي في الغالب، المتموضع في العقد القاعدية وليس في القشرة كما هو الحال في الخرف بسبب داء جسيم ليوي.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن داء باركنسون

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن داء هنتنغتون 6D85.1

الوصف:

يحدث الخرف الناتج عن داء هنتنغتون كجزء من تنكس واسع للدماغ بسبب توسع ثلاثي النوكليوتيد المتكرر في جين HTT، والذي ينتقل من بالسيادة الجسدية. تظهر الأعراض بشكلٍ مخاتل في العقد الثالث والرابع من العمر مع تقدم تدريجي وبطيء. تشمل الأعراض الأولية عادةً ضعفاً في الوظائف التنفيذية مع تجنب الذاكرة نسبياً، قبل ظهور العجز الحركي (بطء الحركة والرقص) الذي يميز مرض هنتنغتون.

مُشتملات:

- داء هنتنغتون

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن هنتنغتون

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

داء هنتنغتون 8A01.10

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَبَلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى 6D85.2

الوصف:

الخرف الناجم عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى ينتج عن التعرض السام لمعادن ثقيلة معينة مثل الألمنيوم من مياه غسيل الكلى أو الرصاص أو الزئبق أو المنغنيز. تعتمد العيوب المعرفية المميزة في الخرف بسبب التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى على المعدن الثقيل أو السم الذي تعرض له الفرد ولكن يمكن أن يؤثر على جميع المجالات المعرفية. ويرتبط بدء الأعراض بالتعرض للمعدن ويمكن أن يكون التدهور سريعاً خاصةً مع التعرض الحاد. في كثير من الحالات، تكون الأعراض قابلة للعكس عندما يتم تحديد التعرض وإيقافه. قد تكون الاختبارات مثل تصوير الدماغ أو الاختبارات العصبية الفيزيولوجية غير طبيعية. يرتبط التسمم بالرصاص بالتشوهات في تصوير الدماغ بما في ذلك التكلس على نطاق واسع وزيادة الإشارة على الصور في التصوير بالرنين المغناطيسي T2 للمادة البيضاء حول البطينين والعقد القاعدية تحت المهاد والجسور. قد يُظهر الخرف الناتج عن سمية الألومنيوم تغييرات مميزة في مخطط كهربية الدماغ ذات الجهد العالي الدوري. قد يظهر الفحص سمات أخرى

واضحة مثل الاعتلال العصبي المحيطي في حالة الرصاص أو الزرنيخ أو الزئبق.

استثناءات:

- الخرف ناتج عن مواد ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D84

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم الأخرى

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

خفيف XS5W

معتدل XS0T

شديد XS25

الخرف الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية 6D85.3

الوصف:

يتطور الخرف الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية خلال مسار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المؤكد، في غياب مرض أو حالة متزامنة أخرى غير عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتي يمكن أن تفسر السمات السريرية. على الرغم من إمكانية وجود مجموعة متنوعة من أنماط العجز المعرفي اعتماداً على المكان الذي وقعت فيه العمليات المسببة لمرض فيروس نقص المناعة البشرية، فإن أوجه القصور عادةً تتبع نمطاً تحت القشرة مع ضعف في الوظيفة التنفيذية وسرعة المعالجة والانتباه وتعلم معلومات جديدة. يختلف مسار الخرف الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية بما في ذلك زوال الأعراض، والانخفاض التدريجي في الأداء، والتحسين، أو التقلب في الأعراض. من النادر حدوث انخفاض سريع في الوظائف المعرفية مع ظهور الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن فيروس نقص المناعة البشرية

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

1C60.3

المرحلة السريرية 4 لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالسل

ساركوما كابوسي المرتبطة بمرض فيروس العوز المناعي البشري المرتبط بالسل

1C60.30

المرحلة السريرية 4 الأخرى المحددة لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالسل

1C60.3Y

المرحلة السريرية 4 لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالسل، غير محددة

1C60.3Z

1C61.3 المرحلة السريرية 4 لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالملاريا

ساركوما كابوسي المرتبطة بمرض فيروس العوز المناعي البشري المرتبط بالملاريا

1C61.30

المرحلة السريرية 4 الأخرى المحددة لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالملاريا

1C61.3Y

المرحلة السريرية 4 لمرض فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بالملاريا، غير محددة

1C61.3Z

المرحلة السريرية 4 لمرض فيروس نقص المناعة البشرية دون ذكر للملاريا أو السل

1C62.3

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن التصلب اللويجي 6D85.4

الوصف:

الخرف الناجم عن التصلب اللويجي هو مرض تنكسي عصبي ناتج عن التأثيرات الدماغية للتصلب العديدي، وهو مرض مزيل للميالين. تظهر الأعراض بشكل مختل، ولا يتعلق بالتدهور أو الضعف الوظيفي الذي يعزى إلى المرض الأساسي (مثل التصلب اللويجي). تتنوع العيوب المعرفية وفقاً لموقع زوال الميالين ولكنها تشمل عادةً أوجه قصور في سرعة المعالجة والذاكرة والانتباه وجوانب الأداء التنفيذي.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن التصلب اللويجي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

8A40 تصلب لويجي

8A40.0 تصلب اللويجي ناكس – متردد

8A40.1 تصلب لويجي مُتَدَرِّج أولي

8A40.2 تصلب لويجي مُتَدَرِّج ثانوي

8A40.Y تصلب لويجي محدد آخر

تصلّب لويجي، غير محدد 8A40.Z

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجوّل في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن داء بريون 6D85.5

الوصف:

الخرف الناتج عن داء بريون هو مرض تنكسي عصبي أولي ينتج عن مجموعة من الاعتلالات الدماغية الإسفنجية الناتجة عن تراكم بروتين بريون غير طبيعي في الدماغ، ويمكن أن تكون متفرقة أو وراثية (ناجمة عن طفرات في جين بروتين البريون) أو قابلة للانتقال (مكتسبة من فرد مصاب). البداية مخاتلة وهناك تطور سريع للأعراض والضعف الذي يتسم بقصور معرفي، ترنح، وأعراض حركية (رمع عضلي، رقص، أو خلل التوتر العضلي). يتم التشخيص عادةً على أساس دراسات تصوير الدماغ أو وجود بروتينات مميزة في السائل الشوكي أو تخطيط كهربية الدماغ أو الاختبارات الجينية.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن داء بريون

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن استسقاء الدماغ مع الضغط الطبيعي 6D85.6

الوصف:

ينتج الخرف الناجم عن استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي عن التراكم الزائد للسائل النخاعي في الدماغ نتيجة لأسباب مجهولة وغير انسدادية ولكن يمكن أن يكون أيضاً ثانوياً للزيف أو العدوى أو الالتهاب. تطور الحالة تدريجي ولكن التداخل (مثل التحويلة، الشنط) يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في الأعراض. عادةً ما تشمل العيوب المعرفية انخفاض سرعة المعالجة، والعجز في الأداء التنفيذي والانتباه، فضلاً عن تغيرات الشخصية. عادة ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بخلل في المشي وسلس البول. غالباً ما يكون تصوير الدماغ للكشف عن حجم البطين وانزياح الدماغ ضرورياً لتأكيد التشخيص.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون

الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي 8D64.04

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخَرَف الناتج عن إصابة الرأس 6D85.7

الوصف:

الخَرَف الناتج عن إصابة الرأس ينجم عن ضرر يلحق بأنسجة الدماغ كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لقوة خارجية. من المعروف أن الأذيات التي تلحق بالدماغ تؤدي إلى فقد الوعي وفقد الذاكرة والتخليط وعدم التوجه، أو علامات عصبية. يجب أن تظهر الأعراض المميزة للخرف بسبب إصابة في الرأس فور حدوث الصدمة أو بعد استرداد الفرد للوعي ويجب أن تستمر إلى ما بعد الفترة الحادة للإصابة. يختلف العجز المعرفي اعتماداً على مناطق الدماغ المحددة المتأثرة وشدة الإصابة، ولكن يمكن أن يشمل ضعف الانتباه والذاكرة والوظيفة التنفيذية والشخصية وسرعة المعالجة والمعرفة الاجتماعية والقدرات اللغوية.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف الناتج عن إصابة الرأس

لديه حالة مسببة (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

متر افق مع (استعمال رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَّبلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن البلاجرا 6D85.8

الوصف:

يحدث الخرف الناتج عن البلاجرا بسبب النقص المستمر في فيتامين B3 (النياسين) أو التربتوفان إما في النظام الغذائي أو بسبب سوء الامتصاص في الجهاز الهضمي بسبب المرض (مثل داء كرون) أو بسبب تأثيرات بعض الأدوية (على سبيل المثال، أيزونيايد). تشمل العلامات الأساسية للبلاجرا التغيرات الجلدية (الحساسية لأشعة الشمس والآفات والثعلبة والوذمة) والإسهال. مع استمرار سوء التغذية لفترات طويلة قد تظهر الأعراض المعرفية والتي تشمل العدوانية والاضطرابات الحركية (الرنح والقلق) والتخليط والضعف. عادةً ما يؤدي العلاج بالمكملات الغذائية (مثل النياسين) إلى عكس الأعراض.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن البلاجرا

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

البلاجرا 5B5C.0

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن متلازمة داون 6D85.9

الوصف:

الخرف الناتج عن متلازمة داون هو اضطراب تنكسي عصبي مرتبط بتأثير زيادة غير طبيعية في إنتاج وتراكم سلائف بروتين الأميلويد (APP) مما يؤدي إلى تكوين لويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو. يزداد التعبير الجيني APP بسبب موقعه على الكروموسوم 21، والذي يتضاعف ثلاث مرات بشكل غير طبيعي في متلازمة داون. تتشابه أوجه القصور المعرفي والسمات المرضية العصبية مع تلك التي لوحظت في الزهايمر. يبدأ المرض عادة بعد العقد الرابع من العمر مع انخفاض تدريجي في الأداء الوظيفي.

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن متلازمة داون

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

متلازمة داون LD40.0

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الخرف الناتج عن داء محدد آخر مضمن في مكان آخر 6D85.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخرف الناتج عن داء محدد آخر مضمن في مكان آخر

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التبدُّل في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف 6D86

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن اضطرابات سلوكية أو نفسية مهمة سريرياً.

الاستثناءات:

- المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة باضطرابات أو أمراض مصنفة في مكان آخر (6E60-6E6Z)

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الأعراض الذهانية في الخرف 6D86.0

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أوهاماً أو هلاوس مهمة سريرياً.

الاستثناءات:

- الفصام أو الاضطرابات الذهانية الأولية الأخرى (6A20-6A2Z)
- المتلازمة الذهانية الثانوية (6E61).

أعراض المزاج في الخرف 6D86.1

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أعراض مزاج هامة سريرياً مثل المزاج المكتئب أو المزاج المرتفع أو المزاج العصبي.

الاستثناءات:

- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)
- متلازمة المزاج الثانوية (6E62)

أعراض القلق في الخرف 6D86.2

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أعراض قلق أو توجس هامة سريرياً.

الاستثناءات:

- القلق أو الاضطرابات المرتبطة بالخوف (6B00-6B0Z)
- متلازمة القلق الثانوية (6E63)

التبُّدُّ في الخرف 6D86.3

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن عدم اكتراث كبير أو عدم اهتمام هام سريرياً.

الاستثناءات:

- اضطرابات المزاج (6A60-6A8Z)
- متلازمة المزاج الثانوية (6E62)

الهيـاج أو العدوانية في الخرف 6D86.4

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تشمل: (1) فرط نشاط حركي نفسي مهم سريريّاً يصحبه زيادة التوتر. أو (2) السلوك العدائي أو العنيف.

التحلل في الخرف 6D86.5

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، يتجلى الافتقار إلى ضبط النفس في تجاهل الأعراف الاجتماعية والاندفاع وضعف تقييم المخاطر.

التجول في الخرف 6D86.6

الوصف:

بالإضافة إلى الاضطرابات المعرفية المميزة للخرف، فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن تجوالاً هاماً سريريّاً يعرض الشخص للخطر.

الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف المحددة الأخرى 6C86.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف المحددة الأخرى

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف، غير محددة 6C86.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف، غير محددة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

خَرَف، غير معروف أو غير محدد السبب 6D8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

ملاحظة للترميز:

يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقاً في الجدولة الأولية. يتم توفير الرموز للاستخدام كرموز تكميلية أو إضافية عندما يكون مطلوباً تحديد وجود الخرف في الأمراض المصنفة في مكان آخر. عندما يكون الخرف ناتجاً عن مسببات مرضية متعددة، اكتب كل ما ينطبق.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الخَرَف، غير معروف أو غير محدد السبب

متر افق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

6D86 الاضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف

6D86.0 الأعراض الذهانية في الخرف

6D86.1 الأعراض المزاجية في الخرف

6D86.2 أعراض القلق في الخرف

6D86.3 التَبَلُّد في الخرف

6D86.4 الهياج أو العدوانية في الخرف

6D86.5 التحلل في الخرف

6D86.6 تجول في الخرف

6D86.Y اضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف

6D86.Z اضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

متلازمة تتضمن سمات معرفية مهمة لا تفي بالمتطلبات التشخيصية لأي من الاضطرابات العصبية المعرفية المحددة ويُحكم عليها بأنها نتيجة مباشرة لفيزيولوجية مرضية بسبب حالة صحية أو إصابة غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية (على سبيل المثال، التغيرات المعرفية بسبب ورم في المخ)، بناءً على دليل من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج المخبرية. يجب استخدام هذه الفئة بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض المعرفية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماماً سريرياً محدداً.

الاستثناءات:

- اضطرابات مع ضعف معرفي عصبي كسمة رئيسية (8A20-8A2Z)

مضمنة في مكان آخر:

- هذيان (6D70)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى المتلازمة المعرفية العصبية الثانوية

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الهذيان 6D70

يمكن العودة للتفاصيل في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتامفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المستنشقات الطيارة (6C4B.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أولاً يمكن تحديدها 6D70.3

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

اضطراب معرفي عصبي محدد أخرى 6E0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب معرفي عصبي، غير محدد 6E0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس

الوصف:

المتلازمات المرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون 6 أسابيع بعد الولادة) والتي تنطوي على سمات عقلية وسلوكية مهمة. إذا كانت الأعراض تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب عقلي معين، فيجب أيضاً تحديد هذا التشخيص.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطراب نفسي مرتبط بناسور الولادة (GC04.1Y)

الوصف:

متلازمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون 6 أسابيع بعد الولادة) التي تنطوي على سمات عقلية وسلوكية هامة، حيث أعراض الاكتئاب الأكثر شيوعاً. لا تشمل المتلازمة أوهام أو هلاوس أو أعراض ذهانية أخرى. إذا كانت الأعراض تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب عقلي معين، فيجب أيضاً تحديد هذا التشخيص. لا ينبغي استخدام هذا التعيين لوصف أعراض اكتئابية خفيفة وعابرة لا تلي متطلبات التشخيص لنوبة اكتئاب، والتي قد تحدث بعد الولادة بفترة وجيزة (ما يسمى كآبة ما بعد الولادة).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اكتئاب ما بعد الولادة 6E20.0 NOS

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اكتئاب ما بعد الولادة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية محدد آخر

6E20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية محدد آخر

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محدد
6E20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولادة أو النفاس، دون أعراض ذهانية، غير محدد

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية
6E21

الوصف:

متلازمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون 6 أسابيع بعد الولادة) التي تنطوي على سمات عقلية وسلوكية هامة، وتشمل المتلازمة الأوهام أو الهلاوس أو الأعراض الذهانية أخرى. عادة ما تظهر أعراض مزاج (الاكتئاب و / أو الهوس). إذا كانت الأعراض تفي بالمتطلبات التشخيصية لاضطراب عقلي معين، فيجب أيضاً تحديد هذا التشخيص.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، مع أعراض ذهانية

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، غير المحددة 6E2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى الاضطرابات العقلية أو السلوكية المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس، غير المحددة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر 6E40

الوصف:

العوامل النفسية والسلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر هي تلك التي قد تؤثر سلباً على العرض السريري أو علاج أو مسار حالة مصنفة في فصل آخر ضمن التصنيف الدولي للأمراض. قد تؤثر هذه العوامل سلباً على العرض السريري أو علاج أو مسار حالة مصنفة في فصل آخر من خلال: التدخل في علاج الاضطراب أو المرض من خلال التأثير على الالتزام بالعلاج أو طلب الرعاية؛ تشكل مخاطر صحية إضافية؛ أو التأثير على الفيزيولوجيا المرضية الكامنة مما يجعل الأعراض أو يفاقمها أو يتطلب عناية طبية. يجب وضع هذا التشخيص فقط عندما تزيد العوامل من خطر المعاناة أو الإعاقة أو الوفاة وتمثل بؤرة الاهتمام السريري، ويجب وضعه جنباً إلى جنب مع تشخيص الحالة الأخرى ذات الصلة.

مُشمِلات:

- العوامل النفسية التي تؤثر على الحالات الجسدية

الاستثناءات:

- الصداع التوتر (8A81)
- الاضطرابات العقلية أو السلوكية المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس (E20-66E2Z)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في

مكان آخر

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر

6E40.0

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر. يتم تشخيص الفرد باضطراب عقلي أو سلوكي أو نمائي عصبي يؤثر سلباً على العرض السريري أو علاج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر.

العوامل النفسية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر 6E40.1

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر. يُظهر الفرد أعراضاً نفسية لا تلبي المتطلبات التشخيصية للاضطراب العقلي أو السلوكي أو النمائي العصبي الذي يؤثر سلباً على مظهر أو علاج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر.

سمات الشخصية أو أسلوب التأقلم الذي يؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر

6E40.2

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر. يُظهر الفرد سمات شخصية أو أنماط تكيف لا تفي بالمتطلبات التشخيصية للاضطراب العقلي أو السلوكي أو النمائي العصبي الذي يؤثر سلباً على مظهر أو علاج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر.

السلوكيات الصحية سيئة التكيف التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر

6E40.3

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر. يُظهر الفرد سلوكيات صحية غير قادرة على التكيف تؤثر سلباً على مظهر أو علاج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر (على سبيل المثال، الإفراط في تناول الطعام، وعدم ممارسة الرياضة).

الاستجابة الفسيولوجية المرتبطة بالإجهاد والتي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر

الاستجابة الفيزيولوجية المرتبطة بالكرب والتي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في
مكان آخر 6E40.4

الوصف:

تم استيفاء جميع المتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر. يُظهر الفرد استجابات فيزيولوجية مرتبطة بالكرب تؤثر سلباً على مظهر أو علاج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر (على سبيل المثال، تفاقم القرحة أو ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب أو الصداع التوتر).

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر
المحددة الأخرى 6E40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر، غير
محددة 6E40.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر

الوصف:

تشمل هذه المجموعة المتلازمات التي تتميز بوجود أعراض نفسية أو سلوكية بارزة يُحكم عليها على أنها عواقب فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الاضطرابات العقلية والسلوكية، بناءً على أدلة من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج المخبرية. لا تُفسر الأعراض بالهذيان أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر، وهي ليست استجابة نفسية وسيطة لحالة طبية خطيرة (على سبيل المثال، اضطراب التأقلم أو أعراض القلق استجابة لتشخيص بمرض يهدد الحياة). يجب استخدام هذه الفئات بالإضافة إلى تشخيص الاضطراب أو المرض الأساسي المفترض عندما تكون الأعراض النفسية والسلوكية شديدة بما يكفي لتبرير اهتمام سريري محدد.

مضمن في مكان آخر:

- هذيان ناتج عن مرض مصنف في مكان آخر (6D70.0)

متلازمة النماء العصبي الثانوية 6E60

يمكن العودة للتفاصيل في القسم المخصص

متلازمة الكلام أو اللغة الثانوية 6E60.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة النماء العصبي الثانوية المحددة أخرى 6E60.Y

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة النماء العصبي الثانوية، غير محددة 6E60.Z

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية 6E61

يمكن العودة للتفاصيل في القسم المخصص

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع هلاوس 6E61.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام 6E61.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أوهام وهلاوس 6E61.2

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة الاضطراب الذهاني الثانوية، مع أعراض غير محددة 6E61.3

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة مزاج ثانوية 6E62

يمكن العودة للتفاصيل في القسم المخصص

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض اكتئابية 6E62.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض هوس 6E62.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض مختلطة 6E62.2

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة مزاج ثنائية، مع أعراض غير محددة 6E62.3

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة قلق ثانوية 6E63

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة وسواس قهري ثانوية أو متلازمة ذات صلة 6E64

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة تفارق ثانوية 6E65

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة معرفية عصبية ثانوية 6E67

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان 6D70

يمكن العودة للتفاصيل في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفسي متضمناً الأدوية 6D70.1

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الحشيش (6C41.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصناعي (6C42.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الأفيون (6C43.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهدئات والمنومات ومضادات القلق (6C44.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكوكايين (6C45.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المنشطات متضمناً الأمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون (6C46.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصناعي (6C47.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المهلوسات (6C49.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن المستنشقات الطائرة (6C4B.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن MDMA والمواد ذات الصلة متضمناً (MDA 6C4C.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان المُحدث بالعقاقير المُفارقة متضمناً PCP والكيثامين (6C4D.4)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك الأدوية (6C4E.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفسي (6C4G.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفسي بما في ذلك الأدوية (6C4F.5)

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غير معروفة أو لا يمكن تحديدها 6D70.3

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

تغير الشخصية الثانوي 6E68

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

متلازمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69

يمكن مراجعة الاضطراب في القسم المخصص

المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر
محددة أخرى 6E6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة
في مكان آخر محددة أخرى

لديه حالة مسببة (رمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة في مكان آخر،
غير محددة 6E6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى المتلازمات العقلية أو السلوكية الثانوية المرتبطة بالاضطرابات أو الأمراض المصنفة
في مكان آخر، غير محددة

لديه حالة مسببة (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطرابات النوم واليقظة

اضطراب الأرق

الوصف:

يتسم اضطراب الأرق بالشكوى من الصعوبة المستمرة في بدء النوم أو مدته أو تصلُّده أو جودته التي تحدث بالرغم من الفرص والظروف الملائمة للنوم، وتؤدي إلى شكل من أشكال الضعف النهاري. تشمل الأعراض النهاري عادة الإرهاق، وانخفاض المزاج أو التهيج، والضييق العام، والضعف المعرفي. الأفراد الذين يَصِفون أعراضاً متعلقة بالنوم في غياب الضعف النهاري لا يُنظر إليهم على أنهم يعانون من اضطراب الأرق.

اضطراب الأرق المزمن 7A00

الوصف:

اضطراب الأرق المزمن هو صعوبة متكررة ومستمرة في بدء النوم أو الحفاظ عليه، ويحدث على الرغم من الفرص والظروف الملائمة للنوم، ويؤدي إلى عدم الرضا عن النوم بشكل عام وبعض أشكال الضعف النهاري. تشمل الأعراض النهارية عادة الإرهاق، وانخفاض المزاج أو التهيج، والضييق العام، والضعف المعرفي. تحدث اضطرابات النوم والأعراض النهارية المصاحبة لها عدة مرات على الأقل في الأسبوع

وترتبط بالأعراض النهارية التي وجدت لعدة أشهر على الأقل. قد يظهر بعض الأفراد الذين يعانون من الأرق المزمن مساراً أكثر نوبية، مع نوبات متكررة من مصاعب النوم / اليقظة والتي تستمر عدة أسابيع في كل مرة على مدى عدة سنوات. الأفراد الذين يشكون من أعراض متعلقة بالنوم في غياب الضعف النهاري لا يُنظر إليهم على أنهم يعانون من اضطراب الأرق. إذا كان الأرق ناتجاً عن اضطراب آخر في النوم واليقظة، أو اضطراب عقلي، أو حالة طبية أخرى، أو مادة أو دواء، فلا ينبغي تشخيص الأرق إلا إذا كان الأرق محور اهتمام طبي مستقل. يجب تشخيص الأرق الناتج عن استعمال المواد أو الأدوية على أنه أرق مُحدث بمادة وفقاً للمادة المحددة المعنية.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الأرق المزمن

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطراب الأرق قصير الأمد 7A01

الوصف:

يتسم اضطراب الأرق قصير الأمد بصعوبة النوم أو الحفاظ عليه، والذي يحدث على الرغم من الفرص والظروف الملائمة للنوم والذي استمر لمدة تقل عن 3 أشهر مما يؤدي إلى عدم الرضا العام عن النوم وبعض أشكال الضعف النهاري. تشمل الأعراض النهارية عادة الإرهاق، وانخفاض المزاج أو التهيج، والضيق العام، والضعف المعرفي. الأفراد الذين يشكون من أعراض متعلقة بالنوم في غياب الضعف النهاري لا يُنظر إليهم على أنهم يعانون من اضطراب الأرق. إذا كان الأرق ناتجاً عن اضطراب آخر في النوم واليقظة، أو اضطراب عقلي، أو حالة طبية أخرى، أو مادة أو دواء، فلا ينبغي تشخيص الأرق إلا إذا كان

محور اهتمام طبي مستقل.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الأرق قصير الأمد

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطرابات الأرق، غير محددة 7A0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطرابات الأرق، غير محددة

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطرابات فرط النعاس

النَّوم الانْتِيَايِي 7A20

النَّوم الانْتِيَايِي، النمط I 7A20.1

النَّوم الانْتِيَايِي، النمط II 7A20.0

الوصف:

النَّوم الانْتِيَايِي دون الجُمْدَة هو اضطراب في النوم يتميز بالنعاس المفرط أثناء النهار المرتبط بدوافع النوم التي لا يمكن السيطرة عليها وأحياناً الشلل أثناء النوم والهلاوس في مُقْتَبِلِ النَّوم والسلوك التلقائي.

النَّوم الانْتِيَابِي، غير محدد 7A20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

فرط النوم مجهول السبب 7A21

الوصف:

فرط النوم مجهول السبب هو اضطراب في النوم يصنف إلى شكلين: فرط النوم مجهول السبب مع فترة نوم طويلة وفرط النوم مجهول السبب دون فترة نوم طويلة.

متلازمة كلاين ليفين 7A22

الوصف:

متلازمة كلاين ليفين هي اضطراب عصبي نادر مجهول المنشأ يتميز بنوبات فرط النوم المتكررة المصاحب للاضطرابات المعرفية والسلوكية.

مُشمَلات:

- فرط النعاس المتكرر

فرط النوم بسبب حالة طبية 7A23

فرط النوم بسبب دواء أو مادة 7A24

مُشمَلات:

- فرط النوم بسبب المواد بما في ذلك الأدوية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى فرط النوم بسبب دواء أو مادة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

فرط النوم المُصاحب لاضطراب عقلي 7A25

متلازمة النوم غير الكافي 7A26

مُشمِلات:

- فرط النوم المُعرض بالسلوك

الاستثناءات

- النَّوْم الانْتِيَابِي، النمط II 7A20.1

- النَّوْم الانْتِيَابِي 7A20.1

اضطرابات فرط النوم محددة أخرى 7A2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات فرط النوم، غير محدد 7A2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم

مُشمِلات:

- وقف التنفس عند حديثي الولادة (KB2A)
- مضمنة في مكان آخر:
- اضطرابات النوم ذات الصلة بتنفس تشاين ستوكس (MD11.4)

انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي 7A40.0

استثناءات:

- انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي لحديثي الولادة (7A40.1)
- انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي للخدج (7A40.2)

انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي لحديثي الولادة 7A40.1

وصف:

حالة مرضية عند الأطفال تتسم بنوبة غير مفسرة من توقف التنفس لمدة 20 ثانية أو أكثر، أو توقف تنفسي أقصر مصاحباً لبطء القلب، والزرقاء، والشحوب، و / أو نقص التوتر الملحوظ عند الرضيع.

استثناءات:

- انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي للخدج (7A40.2)

انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي للخدج 7A40.2

مُشمّلات:

- انقطاع النفس خلال النوم المركزي الأولي للخدج

انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب حالة طبية مع تنفس تشاين ستوكس 7A40.3

مُشمّلات:

- بعض حالات توقف التنفس أثناء النوم المركزية المحددة مع تنفس تشاين ستوكس
- انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب التنفس الدوري على ارتفاعات عالية

انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب حالة طبية دون تنفس تشاين ستوكس 7A40.4

مُشمّلات:

- بعض حالات توقف التنفس أثناء النوم المركزية المحددة دون تنفس تشاين ستوكس

انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب التنفس الدوري على ارتفاعات عالية 7A40.5

انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب دواء أو مادة 7A40.6

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب دواء أو مادة

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

انقطاع النفس خلال النوم المركزي الناشئ عن علاج 7A40.7

انقطاع النفس خلال النوم المركزي محدد آخر 7A40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

7A40.Z انقطاع النفس خلال النوم المركزي، غير محدد

هذه الفئة هي فئة متبقية "غير محددة"

انقطاع النفس خلال النوم الانسدادي 7A41

وصف:

يتسم بنوبات متكررة من (انقطاع النفس) الكامل أو الجزئي (نقص النفس) بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي أثناء النوم. غالباً ما تؤدي هذه الأحداث إلى انخفاض في تشبع الدم بالأكسجين وعادة ما تنتهي باستيقاظ وجيز من النوم.

استثناءات:

- انقطاع النفس الانسدادي عند حديثي الولادة (KB2A.1)

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى انقطاع النفس خلال النوم الانسدادي

مترافق مع (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

الأمراض المزمنة في اللوزتين أو اللحمية CA0F

تضخم اللوزتين CA0F.0

تضخم اللحمية CA0F.1

أمراض مزمنة أخرى محددة في اللوزتين أو اللحمية CA0F.Y

أمراض مزمنة في اللوزتين أو اللحمية غير محددة CA0F.Z

اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم 7A42

وصف:

تتسم اضطرابات نقص التهوية ذات صلة بالنوم بزيادة غير طبيعية في PCO_2 الشرياني ($PaCO_2$) أثناء النوم.

متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة 7A42.0

وصف:

السمنة المفرطة المرتبطة بنقص التهوية السنخية. المتلازمة البيكوكيكية [1] هي اضطراب في التنفس يصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. يؤدي ضعف التنفس إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون (نقص التهوية) وقلة الأكسجين في الدم (نقص تأكسج الدم). يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل وذمة الساق، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، والقلب الرئوي، وكثرة الكريات الحمر الثانوية (متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة: OHS). إذا تركت هذه المتلازمة دون علاج، يمكن أن تكون مميتة. يصاب العديد من الأشخاص الذين يعانون من OHS أيضاً بانقطاع النفس الانسدادي خلال النوم. [2] السمات الرئيسية لمتلازمة OHS، كما هو مقبول حالياً، تشمل السمنة (مؤشر كتلة الجسم > 30 كجم / م²)، ونقص التهوية السنخية المزمن الذي يؤدي إلى فرط ثنائي أكسيد الكربون أثناء النهار ونقص الأكسجة ($PaCO_2 > 45$ mm Hg and $PaO_2 < 70$ mm Hg)، والتنفس المضطرب أثناء النوم. من الضروري للتشخيص استبعاد الأسباب الأخرى لنقص التهوية السنخية مثل داء الانسداد الرئوي الشديد أو داء الرئة المقيد أو ميلان فقري جانبي حاد أو قصور الغدة الدرقية الحاد أو الأمراض العصبية العضلية أو متلازمات نقص التهوية المركزية الأخرى. [3]

مُشمّلات:

- المتلازمة البيكوكيكية

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة

لديه تظاهرات (رّمز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نقص التهوية المرتبط بالنوم السنخي المركزي الخلقي 7A42.1

البداية المتأخرة لنقص التهوية المركزية مع تشوهات تحت المهاد 7A42.2

نقص التهوية السنخي المركزي مجهول السبب 7A42.3

نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب دواء أو مادة 7A42.4

نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5

وصف:

يُعتقد أن نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب أمراض الرئة أو مجرى الهواء أو أمراض الأوعية الدموية الرئوية أو اضطراب جدار الصدر أو الاضطراب العصبي أو ضعف العضلات هو السبب الرئيسي لنقص التهوية. لا يرجع نقص التهوية بشكل أساسي إلى متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة أو استخدام الأدوية أو متلازمة نقص التهوية السنخية المركزية الخلقية معروفة.

استثناءات:

- متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة 7A42.0
- نقص التهوية المرتبط بالنوم السنخي المركزي الخلقي 7A42.1

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية
لديه تظاهرات (رَمَز أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحالة

نقص الأكسجة المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.6

وصف:

يتميز نقص تأكسج الدم المرتبط بالنوم بانخفاض مستمر في SpO2 (>88٪ لمدة > 5 دقائق) أثناء النوم. لا يُفسر وجود نقص تأكسج الدم بشكل أفضل من خلال اضطراب تنفس مرتبط بالنوم آخر (على سبيل المثال، انقطاع النفس خلال النوم الانسدادي). على الرغم من احتمال وجود قدر من انقطاع النفس الانسدادي أو المركزي، إلا أنه لا يُعتقد أن هذه الاضطرابات مسؤولة بشكل أساسي عن نقص الأكسجة في الدم أثناء النوم. بعض المرضى الذين يعانون من نقص تأكسج الدم المرتبط بالنوم يظهرون أيضاً نقص تأكسج الدم أثناء اليقظة. إذا تم إثبات وجود فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم، فيجب إجراء تشخيص لنقص التهوية المرتبط بالنوم، بدلاً من نقص الأكسجة المرتبط بالنوم.

اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A42.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات نقص التهوية أو نقص الأكسجة ذات صلة بالنوم، غير محددة 7A42.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

نقص التهوية المرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5

وصف:

يتميز التنفس الدوري، وهو أحد أشكال تنفس تشاين - ستوكس، بدورات منتظمة ومتكررة من النَّفَس المَدَّي المتغير حيث يكون أقل حجم للنَّفَس أقل من نصف حجم النَّفَس الأقصى في تلك الدورة. وهو النمط التنفسي غير الطبيعي الأكثر شيوعاً والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسكتة الدماغية وليس المرض الجهازي الأساسي، ويحدث في حوالي 25 بالمائة من المرضى. قد يكون التنفس الدوري أكثر شيوعاً بين المرضى الذين يعانون من نزيف تحت العنكبوتية.

استثناءات:

- انقطاع النفس خلال النوم المركزي بسبب حالة طبية مع تنفس تشاين ستوكس 7A40.3

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A4Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم، غير محددة 7A4Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي

الوصف:

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي هي اضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ (تظهر عادةً على شكل أرق، أو نعاس مفرط، أو كليهما) بسبب تغييرات في نظام حفظ الوقت اليومي، أو آليات الانجراف، أو اختلال الإيقاع اليومي الداخلي مع البيئة الخارجية.

مُشمَلات:

- متلازمة مرحلة النوم المتأخر
- نمط النوم واليقظة غير المنتظم

اضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر 7A60

الوصف:

اضطراب مرحلة النوم المتأخر هو نمط متكرر من اضطراب جدول النوم واليقظة يتميز بالتأخير المستمر في فترة النوم الرئيسية مقارنة بأوقات النوم التقليدية أو المرغوبة. ينتج عن الاضطراب صعوبة في النوم وصعوبة الاستيقاظ في الأوقات المطلوبة أو المرغوبة. عندما يُسمح بالنوم وفقاً للجدول الزمني المتأخر، فهو طبيعي بشكل أساسي من حيث الجودة والمدة. تؤدي الحالة إلى ضائقة كبيرة أو تدهور عقلي أو جسدي أو اجتماعي أو مهني أو أكاديمي.

اضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتقدم 7A61

الوصف:

اضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتقدم هو نمط متكرر من اضطراب جدول النوم والاستيقاظ يتميز بالتقدم المستمر (إلى وقت مبكر) في فترة النوم الرئيسية مقارنة بأوقات النوم التقليدية أو المرغوبة. ينتج عن الاضطراب النعاس في المساء (قبل موعد النوم المرغوب) والاستيقاظ في وقت أبكر من الأوقات المرغوبة أو المطلوبة. عندما يُسمح بالنوم وفقاً للجدول الزمني المتقدم، فهو طبيعي بشكل أساسي من حيث الجودة والمدة. تؤدي الحالة إلى ضائقة كبيرة أو تدهور عقلي أو جسدي أو اجتماعي أو مهني أو أكاديمي.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير المنتظم 7A62

الوصف:

يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير المنتظم بغياب دورة محددة بوضوح من النوم والاستيقاظ. يتوزع النوم على نوب متعددة ذات مدة متغيرة على مدار 24 ساعة. يشكو المرضى عادة من الأرق و / أو النعاس المفرط أثناء النهار نتيجة لهذه الحالة.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير نموذج 24 ساعة 7A63

الوصف:

يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير نموذج 24 ساعة بفترات من الأرق و / أو النعاس أثناء النهار، بالتناوب مع فترات من النوم الطبيعي نسبياً، وذلك بسبب عدم توافق الإيقاع اليومي الداخلي مع نموذج 24 ساعة للبيئة الخارجية. قد تكون الفترة الزمنية للدورة اليومية / دورة النوم واليقظة أقصر أو أطول من 24 ساعة. تحدث الأعراض على شكل نوبات الميل للنوم والاستيقاظ التي يتم التحكم فيها بالإيقاع الداخلي دون توافق مع دورة الليل والنهار البيئية.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة بنمط ورديات العمل 7A64

الوصف:

يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة بنمط ورديات العمل بشكاوى الأرق و / أو النعاس المفرط الذي يحدث نتيجة ورديات العمل التي تتداخل مع كل أو جزء من فترات النوم الليلي التقليدية. عادةً ما يرتبط الاضطراب أيضاً بانخفاض إجمالي وقت النوم.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة، نمط تواني الطيران 7A65

الوصف:

اضطراب وتيرة النوم واليقظة، نمط تواني الطيران بعدم التوافق المؤقت بين توقيت دورة النوم واليقظة الناتجة عن الساعة البيولوجية الذاتية وتلك الخاصة بنمط النوم والاستيقاظ الذي يتطلبه تغيير المنطقة الزمنية. يشكو الأفراد من اضطراب النوم والنعاس والإرهاق وضعف الأداء أثناء النهار. تعتمد شدة الأعراض ومدتها على عدد المناطق الزمنية التي يتم السفر إليها، والقدرة على النوم أثناء السفر، والتعرض لإشارات الأوقات اليومية المناسبة في البيئة الجديدة، والتسامح مع اختلال التوازن اليومي عند الاستيقاظ أثناء الليل البيولوجي، واتجاه السفر.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة، غير محدد 7A6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم

الوصف:

هذه مجموعة من اضطرابات الحركة التي تحدث عادة في الليل عندما يكون المريض في حالة راحة و / أو أثناء النوم. تتضمن هذه الاضطرابات حركات بسيطة نسبياً وغير هادفة وعادة ما تكون نمطية.

مضمنة في مكان آخر:

- اضطراب نوم حركة العين السريعة (7B01.0)

متلازمة تلمل الساقين 7A80

اضطراب حركة الطرف الدورية 7A81

الوصف:

اضطراب حركة يتسم بنوبات متكررة من حركات الأطراف المتكررة بسبب تقلصات العضلات أثناء النوم. ما يصل إلى 90٪ من مرضى متلازمة تلمل الساقين لديهم حركات نمطية بسيطة غير إرادية للأطراف السفلية أثناء النوم. تخطيط النوم مع تخطيط كهربية العضل السطحي هو المعيار الذهبي للتشخيص.

اضطراب تشنجات الساق ذا الصلة بالنوم 7A82

الوصف:

تشنجات الساق هي تقلصات مؤلمة في عضلات الساق أو القدم ينتج عنها ضيق أو صلابة. تحدث بشكل متكرر في الليل، مما يؤدي إلى إيقاظ المريض من النوم ويتم مساعدته بشكل عام عن طريق مد العضلات المصابة، غالباً بالوقوف.

صرير الأسنان ذا الصلة بالنوم 7A83

الوصف:

في صرير الأسنان ذا الصلة بالنوم، هناك تقلص نشط للعضلات الماضغة لمدة ثانيتين على الأقل، أو سلاسل من تقلص العضلات الإيقاعي عند التواتر حوالي 1 هرتز. والذي يظهر بشكل متكرر في النوم الخفيف (NREM) ولكنه قد يحدث في أي مرحلة. قد تشمل العواقب تلف الأسنان أو الانزعاج في الفك أو التعب أو الألم أو الصداع الصدغي عند الاستيقاظ.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى صرير الأسنان ذا الصلة بالنوم

الشدة (استعمل رمزاً اضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطراب الحركة الإيقاعي ذا الصلة بالنوم 7A84

الوصف:

تتكون حركات اضطراب الحركة الإيقاعي (RMD) من تقلصات نمطية لمجموعات العضلات الكبيرة عند 0.5 هرتز إلى 2 هرتز أثناء النعاس أو النوم. من أجل تصنيف الحركات على أنها اضطراب، يجب أن تسبب في تداخل مع النوم الطبيعي، أو ضعف في الأداء أثناء النهار، أو إصابة جسدية. (RMD) شائع في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.

رمع النوم الحميد في الطفولة 7A85

الوصف:

رمع النوم الحميد في الطفولة هو اضطراب في النوم الهادئ، يحدث من اليوم الأول من الحياة حتى سن 3 سنوات. سماته الرئيسية هي الهزات الرمعية الإيقاعية عند النعاس أو النوم، والتي تتوقف عند إيقاظ الطفل، وتخطيط الدماغ الطبيعي أثناء النوبات أو بعدها.

الرمع العضلي النخاعي عند بداية النوم 7A86

اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب حالة طبية 7A87

الوصف:

من المعروف أن اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم تحدث بشكل ثانوي للعديد من الحالات الطبية مثل نقص الحديد والحمل وأمراض الكلى النهائية والاعتلال العصبي. تحدث هذه عادةً في وقت لاحق من الحياة وفي غياب تاريخ عائلي لاضطراب الحركة المرتبط بالنوم.

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب حالة طبية

لديه حالة مسببة (رمزاً أيضاً):

يرجى البحث في ICD-11 عن هذه الحال

اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب مادة أو دواء 7A88

اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.0

الوصف:

يتميز اضطراب سلوك النوم RBD خلال حركة العين السريعة (REM) بفقدان التوتر العضلي الطبيعي أثناء نوم حركة العين السريعة والنشاط الحركي المرتبط بمحتوى الأحلام. يشكل RBD خطراً متزايداً

للإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل الضمور الجهازي المتعدد (MSA)، ومرض باركنسون (PD)، والخرف مع أجسام ليوي (DLB).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم محددة أخرى 7A8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم، غير محددة 7A8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

حالات النوم المضطرب (خَطَلٌ نَوْمِي)

الوصف:

الأحداث أو التجارب الجسدية غير المرغوب فيها التي تحدث أثناء الدخول في النوم أو أثناء النوم أو أثناء الاستيقاظ من النوم.

اضطرابات التَّيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة 7B00

7B00.0 التَّيقُّظ التخليطي

اضطراب المشي أثناء النوم 7B00.1

الوصف:

حالة من الوعي المُشَوَّه يتم فيها الجمع بين ظاهرتي النوم واليقظة. أثناء نوبة المشي أثناء النوم، ينهض الفرد من السرير، عادةً خلال الثلث الأول من النوم الليلي، ويتجول، مُظهرًا مستويات منخفضة من الوعي والتفاعل والمهارة الحركية. عند الاستيقاظ، عادة لا يكون هناك تذكر للحدث.

رعب النوم 7B00.2

الوصف:

نوبات رعب وذعر شديد ليلية مرتبطة بصياح وحركة ومستويات عالية من التدفق اللاإرادي. قد يجلس الفرد أو ينهض، عادة خلال الثلث الأول من نومه الليلي، صارخاً ذعراً. غالباً ما يندفع إلى الباب كما لو كان يحاول الهروب، على الرغم من أنه نادراً ما يغادر الغرفة. إن تذكر الحدث، إن وجد، محدود للغاية (عادةً صورة ذهنية واحدة أو صورتين متشظيتين).

اضطراب الأكل ذا الصلة بالنوم 7B00.3

اضطرابات التيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة محددة أخرى 7B00.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات التيقُّظ من نوم حركة العين غير السريعة، غير محددة 7B00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة 7B01

اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.0

الوصف:

يتميز اضطراب سلوك النوم RBD خلال حركة العين السريعة (REM) بفقدان التوتر العضلي الطبيعي أثناء نوم حركة العين السريعة والنشاط الحركي المرتبط بمحتوى الأحلام. يشكل RBD خطراً متزايداً للإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل الضمور الجهازي المتعدد (MSA)، ومرض باركنسون (PD)، والخرف مع أجسام ليوي (DLB).

التنسيق اللاحق:

أضف تفاصيلاً إلى اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة

الشدة (استعمل رمزاً إضافياً عند الرغبة):

XS5W خفيف

XS0T معتدل

XS25 شديد

شلل النوم المعزول المتكرر 7B01.1

اضطراب سلوك النوم خلال حركة العين السريعة 7B01.2

الوصف:

تجارب أحلام مليئة بالقلق أو الخوف. هناك تذكر مفصل للغاية لمحتوى الحلم. تجربة الحلم حية للغاية وعادة ما تتضمن موضوعات تتضمن تهديدات للبقاء أو الأمن أو تقييم الذات. غالباً ما يكون هناك تكرار لنفس الموضوعات المرعبة أو قد تكون متشابهة. خلال نوبة نموذجية هناك درجة من التدفق اللاإرادي ولكن لا يوجد نطق ملحوظ أو حركة للجسم. عند الاستيقاظ يصبح الفرد يقظاً ومتوجهاً بسرعة.

مُشمِلات:

- حلم اضطراب القلق

حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة محددة أخرى 7B01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

7B01.Z حالات النوم المضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة، غير محددة

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

حالات النوم المضطرب الأخرى 7B02

مضمنة في مكان آخر:

- سلس البول الليلي 6C00.0

متلازمة تفجر الرأس ما قبل النوم 7B02.0

المشتملات:

- اضطراب حواسي ما قبل النوم

هلاوس ذات صلة بالنوم 7B02.1

حالات النوم المضطرب بسبب حالة طبية 7B02.1

7B02.2 حالات النوم المضطرب بسبب مادة أو دواء

6C00.0 سلس البول الليلي

7B0Y حالات النوم المضطرب محددة أخرى

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

7B0Z حالات النوم المضطرب، غير محددة

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي محددة أخرى 7B2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي محددة أخرى

لديه درجة تفاعل الحدقة (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC5Y لا يتفاعل أي من الحدقتين

XC16 حدقة واحدة متفاعلة

XC5K كلا الحدقتان متفاعلتان

XC85 البيانات غير متوفرة

لديه درجة عين حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC87 لا يوجد فتح للعين حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

XC3W إحدى العينين أو كلتاها تفتحان تلقائياً

XC3 عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان لتحفيز مؤلم أو مزعج

XC5L عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان للتحفيز اللفظي

لديه درجة حركية حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC8H استجابة بسط للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC8W استجابة الانثناء غير الطبيعية للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC8Q استجابة سحب للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC6J استجابة موضعية للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC34 لا توجد حركة حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

لديه درجة للفظ حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC7U نطق لا لغوي (أصوات غير مفهومة) لتحفيز المؤلم أو المزعج

XC4A نطق اللغة

XC4Y كلام مرتبك ومشوش

XC8U لا يوجد إخراج لفظي حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

XC2X الكلام العادي المتوجه

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي، غير محددة 7B2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي، غير محددة

لديه درجة تفاعل الحدقة (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC5Y لا يتفاعل أي من الحدقتين

XC16 حدقة واحدة متفاعلة

XC5K كلا الحدقتان متفاعلتان

XC85 البيانات غير متوفرة

لديه درجة عين حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC87 لا يوجد فتح للعين حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

XC3W إحدى العينين أو كليهما تفتحان تلقائياً

XC3 عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان لتحفيز مؤلم أو مزعج

XC5L عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان للتحفيز اللفظي

لديه درجة حركية حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC8H استجابة بسط للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC8W استجابة الانثناء غير الطبيعية للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC8Q استجابة سحب للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC6J استجابة موضعية للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC34 لا توجد حركة حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

لديه درجة للفظ حسب مقياس غلاسكو (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

XC7U نطق لا لغوي (أصوات غير مفهومة) للتحفيز المؤلم أو المزعج

XC4A نطق اللغة

XC4Y كلام مرتبك ومشوش

XC8U لا يوجد إخراج لفظي حتى مع التحفيز المؤلم أو المزعج

XC2X الكلام العادي المتوجه

الاختلالات الجنسية

الوصف:

الاختلالات الجنسية هي متلازمات تشمل الطرق المختلفة التي قد يواجه بها الأشخاص البالغون صعوبة في تجربة أنشطة جنسية مُرضية شخصياً وغير قسرية. الاستجابة الجنسية هي تفاعل معقد من العمليات النفسية والشخصية والاجتماعية والثقافية والفيزيولوجية وقد يؤثر واحد أو أكثر من هذه العوامل على أي مرحلة من مراحل الاستجابة الجنسية. من أجل تشخيص الخلل الوظيفي الجنسي، يجب أن: (1) يحدث بشكل متكرر، على الرغم من أنه قد يكون غائباً في بعض المناسبات؛ (2) موجودة منذ عدة أشهر على الأقل؛ (3) يترافق مع ضائقة كبيرة سريرياً.

مضمن في مكان آخر:

خلل جنسي مرتبط بهُبوط أعضاء الحوض (GC42)

اختلال تدني الرغبة الجنسية HA00

الوصف:

يتسم اختلال تدني الرغبة الجنسية بالغياب أو الانخفاض الملحوظ في الرغبة أو الدافع للانخراط في النشاط الجنسي كما يتجلى في أي مما يلي: (1) انخفاض أو غياب الرغبة التلقائية (الأفكار الجنسية أو التخيلات)؛ (2) انخفاض أو غياب الرغبة المستجيبة للإشارات المثيرة والتحفيز؛ أو (3) عدم القدرة على الحفاظ على الرغبة أو الاهتمام بالنشاط الجنسي بمجرد البدء. لقد حدث نمط تناقص أو غياب الرغبة

التلقائية أو الاستجابة أو عدم القدرة على الحفاظ على الرغبة أو الاهتمام بالنشاط الجنسي بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريراً.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، معمم HA00.0

الوصف:

لطالما عانى الشخص من تدني الرغبة الجنسية منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، ظرفي HA00.1

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من تدني الرغبة الجنسية منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، معمم HA00.2

الوصف:

جاء ظهور اختلال تدني الرغبة الجنسية بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، ظرفي HA00.3

الوصف:

جاء ظهور اختلال تدني الرغبة الجنسية بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| HA40 | الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |
| HA40.0 | مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي |
| HA40.1 | مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية |
| HA40.2 | مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء |
| HA40.3 | مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة |
| HA40.4 | المرتبط بعوامل العلاقة |
| HA40.5 | المرتبط بالعوامل الثقافية |
| HA40.Y | اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |

اختلال تدني الرغبة الجنسية، غير محدد HA00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال تدني الرغبة الجنسية، غير محدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية HA01

الوصف:

تتضمن اختلالات الاستثارة الجنسية صعوبات في الجوانب الفيزيولوجية أو الذاتية للاستثارة الجنسية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي HA01.0

الوصف:

يتسم اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي بالغياب أو الانخفاض الملحوظ في الاستجابة للتحفيز الجنسي لدى النساء، كما يتضح من أي مما يلي: (1) غياب أو انخفاض ملحوظ في استجابة الأعضاء التناسلية، بما في ذلك تزييت الفرج والمهبل واحتقان الأعضاء التناسلية وحساسية الأعضاء التناسلية؛ (2) غياب أو انخفاض ملحوظ في الاستجابات غير التناسلية مثل تصلب الحلمتين، احمرار الجلد، زيادة معدل ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل التنفس؛ (3) غياب أو انخفاض ملحوظ في مشاعر الاستثارة الجنسية (الإثارة الجنسية والمتعة الجنسية) من أي نوع من أنواع الاستثارة الجنسية. يحدث الغياب أو الانخفاض الملحوظ في الاستجابة للتحفيز الجنسي على الرغم من الرغبة في النشاط الجنسي والتحفيز الجنسي الكافي، وقد حدث بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريراً.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، معمم HA01.00

الوصف:

لطالما عانى الشخص من اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، ظرفي HA01.01

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، معمم HA01.02

الوصف:

جاء ظهور اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| HA40 | الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |
| HA40.0 | مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي |
| HA40.1 | مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية |
| HA40.2 | مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء |
| HA40.3 | مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة |
| HA40.4 | المرتبط بعوامل العلاقة |
| HA40.5 | المرتبط بالعوامل الثقافية |
| HA40.Y | اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، ظرفي HA01.03

الوصف:

جاء ظهور اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، غير محدد HA01.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الأنثوي، غير محدد

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري HA01.1

الوصف:

يتسم اختلال الاستثارة الجنسية الذكري بالغياب أو الانخفاض الملحوظ في الاستجابة للتحفيز الجنسي لدى النساء، كما يتضح من أي مما يلي: (1) غياب أو انخفاض ملحوظ في استجابة الأعضاء التناسلية، بما في ذلك تزييت الفرج والمهبل واحتقان الأعضاء التناسلية وحساسية الأعضاء التناسلية؛ (2) غياب أو انخفاض ملحوظ في الاستجابات غير التناسلية مثل تصلب الحلمتين، احمرار الجلد، زيادة معدل ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل التنفس؛ (3) غياب أو انخفاض ملحوظ في مشاعر الاستثارة الجنسية (الإثارة الجنسية والمتعة الجنسية) من أي نوع من أنواع الاستثارة الجنسية. يحدث الغياب أو الانخفاض الملحوظ في الاستجابة للتحفيز الجنسي على الرغم من الرغبة في النشاط الجنسي والتحفيز الجنسي الكافي، وقد حدث بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريراً.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، معمم HA01.10

الوصف:

لطالما عانى الشخص من اختلال الاستثارة الجنسية الذكري منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، ظرفي HA01.11

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من اختلال الاستثارة الجنسية الذكري منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، معمم HA01.12

الوصف:

جاء ظهور اختلال الاستثارة الجنسية الذكري بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

- | | |
|--------|--|
| HA40 | الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |
| HA40.0 | مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي |
| HA40.1 | مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية |
| HA40.2 | مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء |
| HA40.3 | مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة |
| HA40.4 | المرتبط بعوامل العلاقة |
| HA40.5 | المرتبط بالعوامل الثقافية |
| HA40.Y | اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي |

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، ظرفي HA01.13

الوصف:

جاء ظهور اختلال الاستثارة الجنسية الذكري بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، غير محدد HA01.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية الذكري، غير محدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية محدد أخرى HA01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية محدد آخر

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال الاستثارة الجنسية، غير محدد HA01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال الاستثارة الجنسية، غير المحدد

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

الوصف:

تشير اختلالات النشوة الجنسية إلى الصعوبات المتعلقة بالتجربة الذاتية للنشوة الجنسية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلالات النشوة الجنسية

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

فقد النشوة HA02.0

الوصف:

يتميز فقد النشوة بغياب أو ندرة ملحوظة لتجربة النشوة أو انخفاض ملحوظ في شدة أحاسيس النشوة الجنسية. عند النساء، يشمل هذا تأخيراً ملحوظاً في النشوة الجنسية، أما عند الرجال فتشخص على أنها تأخر في القذف عند الذكور. يحدث نمط الغياب أو التأخير أو تناقص تكرار أو شدة النشوة على الرغم من التحفيز الجنسي الكافي، بما في ذلك الرغبة في النشاط الجنسي والنشوة الجنسية، بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريرياً.

مُشمَلات:

- فقد النشوة نفسي المنشأ

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

الوصف:

لطالما عانى الشخص من فقد النشوة منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

فقد النشوة، دائم، ظرفي HA02.11

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من فقد النشوة منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

فقد النشوة، مكتسب، معمم HA02.02

الوصف:

جاء ظهور فقد النشوة بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

فقد النشوة، مكتسب، ظرفي HA02.03

الوصف:

جاء ظهور فقد النشوة بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

فقد النشوة، غير محدد HA02.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى فقد النشوة، غير محدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال النشوة الجنسية محدد أخرى HA02.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال النشوة الجنسية محدد آخر

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال النشوة الجنسية، غير محدد HA02.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال النشوة الجنسية، غير المحدد

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلالات القذف HA03

الوصف:

تشير اختلالات القذف إلى صعوبات القذف لدى الرجال، بما في ذلك فترات القذف التي تكون قصيرة جداً (القذف المبكر للذكور) أو طويلة جداً (تأخر القذف عند الذكور).

مضمن في مكان آخر:

- القذف الراجع (MF40.3)

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلالات القذف

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المبكر عند الذكر HA03.0

الوصف:

يتسم القذف المبكر عند الذكر بالقذف الذي يحدث قبل أو في غضون فترة قصيرة جداً من بدء الإيلاج في المهبل أو أي تحفيز جنسي آخر ذي صلة، مع عدم وجود سيطرة ملحوظة على القذف أو ضعفها. حدث نمط القذف المبكر بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريرياً.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المبكر عند الذكر، دائم، معمم HA03.00

الوصف:

لطالما عانى الشخص من القذف المبكر منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المبكر عند الذكر، دائم، ظرفي HA03.01

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من القذف المبكر منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA03.02 القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، معمم

الوصف:

جاء ظهور القذف المبكر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، ظرفي HA03.03

الوصف:

جاء ظهور القذف المبكر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المبكر عند الذكر، غير محدد HA03.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المبكر عند الذكر، غير محدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر HA03.1

الوصف:

يتسم تأخر القذف عند الذكر بعدم القدرة على تحقيق القذف أو زيادة كمون القذف أو زيادة تأخره، على الرغم من التحفيز الجنسي الكافي والرغبة في القذف. حدث نمط القذف المتأخر بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة لا تقل عن عدة أشهر، ويرتبط بضائقة كبيرة سريرياً.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر، دائم، معمم HA03.10

الوصف:

لطالما عانى الشخص من القذف المتأخر منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر، دائم، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر، دائم، ظرفي HA03.11

الوصف:

يعاني الشخص دائماً من القذف المتأخر منذ وقت بدء النشاط الجنسي ذي الصلة حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر، دائم، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، معمم HA03.12

الوصف:

جاء ظهور القذف المتأخر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في جميع الظروف، بما في ذلك العادة السرية.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، معمم

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، ظرفي HA03.13

الوصف:

جاء ظهور القذف المتأخر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خلالها، حيث الاستجابة المرغوبة غائبة حالياً أو تتضاءل في بعض الظروف، مع بعض الشركاء، أو استجابة لبعض المحفزات، ولكن ليس في مواقف أخرى.

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر، مكتسب، ظرفي

مترافق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40	الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي
HA40.0	مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي
HA40.1	مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية
HA40.2	مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء
HA40.3	مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة
HA40.4	المرتبط بعوامل العلاقة
HA40.5	المرتبط بالعوامل الثقافية
HA40.Y	اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

القذف المتأخر عند الذكر، غير محدد HA03.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى القذف المتأخر عند الذكر، غير محدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلالات القذف المحددة الأخرى HA03.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلالات القذف المحددة الأخرى

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلالات القذف، غير محددة HA03.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلالات القذف، غير المحددة

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

الخلل الجنسي المرتبط بهبوط أعضاء الحوض GC42

الوصف:

حالة تصيب النساء وتتميز بالصعوبات التي تعاني منها في الأحاسيس أو وظيفة الجهاز التناسلي أثناء النشاط الجنسي الطبيعي. ترتبط هذه الحالة بانزياح غير طبيعي لأنسجة المهبل أو الفوهة المهبليّة أو قاع الحوض.

تناقص الإحساس بسبب الرخاوة المهبليّة أو الداخلية GC42.0

الوصف:

حالة تتميز بتناقص الشعور أو غيابه بسبب نقص توتر العضلات في المهبل أو عند فتحة المهبل.

الجماع المعوق GC42.1

الوصف:

حالة في الجهاز التناسلي ناتجة عن عقبة أو انسداد في قناة المهبل أو فرط توتر عضلات المهبل. تتميز هذه الحالة بعدم القدرة على ممارسة الجنس المهبلي.

اختلال جنسي محدد آخر HA0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال جنسي محدد آخر

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

اختلال جنسي، غير محدد HA0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

التنسيق اللاحق:

أضف التفاصيل إلى اختلال جنسي، غير المحدد

متر افق مع (استخدم رمزاً إضافياً، إذا رغبت في ذلك):

HA40 الاعتبارات المسببة للأمراض في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

HA40.0 مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العلاج الإشعاعي

HA40.1 مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية

HA40.2 مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفسي أو دواء

HA40.3 مرتبط بنقص المعرفة أو الخبرة

HA40.4 المرتبط بعوامل العلاقة

HA40.5 المرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.Y اعتبارات مسببة للأمراض محددة أخرى في الاختلالات الجنسية واضطرابات الألم الجنسي

لا توافق الجندر

الوصف:

يتسم لا توافق الجندر بلا توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره، والجنس المحدد. تغيرات الجندر وسلوك الجندر وحدها ليست أساساً لتحديد التشخيصات في هذه المجموعة.

الاستثناءات:

- اضطرابات الولع الجنسي (6D30-6D3Z)

لا توافق الجندر عند المراهقة والبلوغ HA60

يتسم لا توافق الجندر في سن المراهقة والبلوغ بلا توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره، والجنس المحدد. مما يؤدي غالباً إلى الرغبة في "التحول"، من أجل الحياة والقبول كشخص ينتمي للجندر الذي يختبره، من خلال العلاج الهرموني أو الجراحة أو خدمات الرعاية الصحية الأخرى لجعل جسم الفرد متوافقاً، بقدر ما هو مرغوب وإلى الحد الممكن، مع الجندر الذي يختبره. لا يمكن تحديد التشخيص قبل بداية سن البلوغ. السلوك والتفضيلات المتغيرة بين الجنسين وحدها ليست أساساً لتعيين التشخيص.

الاستثناءات:

- اضطرابات الولع الجنسي (6D30-6D3Z)

لا توافق الجندر عند الأطفال HA61

الوصف:

يتسم لا توافق الجندر في سن الطفولة بلا توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره، والجنس المحدد عند الأطفال ما قبل البلوغ. يتضمن رغبة قوية في أن يكون من جندر مختلف عن الجنس المحدد؛ وكره قوي من جانب الطفل لتشريحه الجنسي أو الخصائص الجنسية الثانوية المتوقعة و / أو رغبة قوية في الخصائص الجنسية الأولية و / أو الثانوية المتوقعة التي تتطابق مع الجندر الذي يختبره؛ واللعب التخيلي أو الألعاب أو الأنشطة ورفاق اللعب التي تكون نموذجية للجندر الذي يختبره بدلاً من الجنس المحدد. يجب أن يكون اللا توافق قد استمر لمدة عامين تقريباً. السلوك والتفضيلات المتغيرة بين الجنسين وحدها ليست أساساً لتعيين التشخيص.

الاستثناءات:

- اضطرابات الولع الجنسي (6D30-6D3Z)

لا توافق الجندر، غير محدد HA6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية المحددة الأخرى 6E8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

الاضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية غير المحددة 6E8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

